



WHAT THE PAPER SAYS · WHAT IT DOESN'T · WHY IT MATTERS

## Tři mladí pacienti žili roky bez známek onemocnění po podání experimentálních T buněk. Studie fáze 1 nemůže ukázat, co tyto výsledky způsobilo

*ReMIND podala 33 dětem a mladým dospělým s vysoce rizikovými mozkovými nádory laboratorně vypěstované T buňky vyrobené z vlastní krve každého pacienta. Buňky byly namnoženy tak, aby reagovaly na tři proteiny, které mohou být přítomny v nádorových buňkách. Tři pacienti měli od první infuze intervaly bez známek onemocnění delší než 31,8, 41,2 a 51,6 měsíce, včetně jedné úplné odpovědi podle zobrazovacích kritérií. Ve skupině agresivních nádorů mozkového kmene neukázal žádný snímek dostatečné zmenšení nebo vymizení ke splnění předem stanoveného prahu odpovědi. Tatáž časná studie bezpečnosti a dávky zaznamenala jedno úmrtí natolik závažné, že se podle jejích pravidel započítalo proti zvyšování dávky. Bez srovnávací skupiny nemůže studie ukázat, zda tři výsledky způsobily T buňky.*

---

Written by Cinzia Vaglio · Cross-checked by Laura Nesso and Matteo · Edited by Laura Nesso and Michele Renda  
· Figures by Cinzia Vaglio and Nova Vela · AI-assisted, human-reviewed

Paper: *Multi-antigen-targeting T cells in pediatric central nervous system tumors: a phase 1 trial*, Stephanie Gomez, Rachel A. DiCioccio, Ashley E. Geiger, Melanie L. Grant, Emily Reynolds, Anushree Datar, Chase D. McCann, Jay Tanna, Divyesh Kukadiya, Fahmida Hoq, Anqing Zhang, Patrick J. Hanley, Jennifer L. Webb, Lindsay B. Kilburn, Brian R. Rood, Adriana Fonseca, Holly J. Meany, L. Gilbert Vezina, Roger J. Packer, Conrad Russell Y. Cruz, Catherine M. Bollard & Eugene I. Hwang, *Nature Medicine* 32, 2481-2493 (2026) · DOI: 10.1038/s41591-026-04449-9

**Author Correction**

Nature Medicine vydal 22. července 2026 opravu autorů upřesňující formulaci prohlášení o střetech zájmů. Zde je použit opravený článek; klinická data a závěry se nezměnily.

Author Correction →

## Tři mladí pacienti žili roky bez známek onemocnění po podání experimentálních T buněk. Studie fáze 1 nemůže ukázat, co tyto výsledky způsobilo

**Více než 31,8 měsíce. Více než 41,2 měsíce. Více než 51,6 měsíce.**

To jsou tři intervaly bez známek onemocnění zaznamenané od první infuze experimentální léčby T buňkami. První patřil čtrnáctiletému pacientovi, jehož meduloblastom se opakovaně vrátil; sledování skončilo, když pacient studii opustil. Druhý patřil osmiletému dítěti se vzácným astroblastomem a v okamžiku uzávěrky článku stále pokračoval. Třetí patřil čtrnáctiletému pacientovi s návratem glioblastomu a rovněž pokračoval.

Počet měsíců může znít klinicky a vzdáleně. Zde je jediným poctivým způsobem, jak neztratit ze zřetele lidskou skutečnost. Článek nám neříká, jak tyto roky prožívali. Říká však, že tři mladí pacienti s vysoce rizikovými mozkovými nádory žili po podání buněk bez zdokumentovaného onemocnění po dobu měřenou v letech.

**Neříká**, že tyto výsledky způsobily podané buňky.

Toto rozlišení je páteří celého příběhu. ReMIND byla otevřená studie, takže rodiny i lékaři věděli, jaká léčba byla podána. Byla také nerandomizovaná: neexistovala přidělená srovnávací skupina. A šlo o fázi 1, tedy časnou studii vytvořenou především k testování, zda lze víceúčelové T buňky vyrobit, podat a zkoumat v tolerovatelné dávce — nikoli zda zlepšují přežití. Zaznamenala tři výjimečné klinické průběhy. Zároveň v agresivní skupině nádorů mozkového kmene nezaznamenala žádný snímek s dostatečným zmenšením nebo vymizením, aby splnil předem stanovený práh odpovědi; zaznamenala dvě závažné příhody s otokem nádoru, které mohly souviset s léčbou, a jednu smrtelnou příhodu natolik závažnou, že se podle pravidel studie započítala proti zvýšení dávky.

Ty roky jsou skutečné. Příčinné připsání je nejisté. Obě pravdy patří do hlavního příběhu.

## Léčba vyrobená z krve každého pacienta

Léčba se nazývá **terapie TAA-T**, zkratka pro T buňky specifické pro antigeny spojené s nádorem. T buňky jsou imunitní buňky schopné rozpoznávat určité molekulární fragmenty. Výzkumníci odebrali krev každému účastníkovi a poté v laboratoři množili jeho vlastní T buňky za současného vystavení

fragmentům tří proteinů spojených s nádory: **WT1** (Wilmsův nádor 1), **PRAME** (preferenčně expri-movaný antigen v melanomu) a **survivin**, protein zapojený do přežívání a dělení buněk. Tyto proteiny mohou být přítomny v dětských mozkových nádorech a sloužit jako orientační značky pro imunitní buňky, nejsou však výlučné pro rakovinu.

Nešlo o **CAR-T buňky**, tedy T buňky geneticky upravené tak, aby nesly laboratorně navržený receptor — nový senzor pro vybraný cíl. ReMIND použila jiný přístup: bez genetické úpravy vybrala a namnožila přirozeně se vyskytující T buňky reagující na fragmenty tří cílových proteinů. Buňky byly otestovány, zmrazeny a později podány do žíly. Zaměřením na tři cíle namísto jednoho chtěli výzkumníci snížit pravděpodobnost, že nádor složený z různých typů buněk unikne proto, že jediný cíl nesou jen některé buňky.

#### Jak se to liší od CAR-T?

Při výrobě CAR-T dostanou T buňky nový umělý receptor, aby mohly přímo rozpoznat vybraný marker. Výroba TAA-T žádný receptor nepřidává. Množí smíšenou populaci neupravených T buněk, jejichž existující receptory reagují na proteinové fragmenty spojené s WT1, PRAME nebo survivinem. Jde o odlišné způsoby výroby léčby imunitními buňkami; důkaz, že jeden přístup funguje u určitého nádoru, nelze přenést na druhý.

Je to věrohodná strategie, nikoli prokázaný klinický mechanismus. Studie neukázala, že podané buňky vstoupily do konkrétního nádoru, přetrvaly v něm nebo jej zabily. Její hlavní otázky byly základnější: lze vyrobit použitelný přípravek, lze jej podat, která dávka má postoupit dál a jaké toxicity se objeví?

ReMIND zařadila v Children's National Hospital tři skupiny. **Rameno A** zahrnovalo nově diagnostikovaný **difúzní intrinsický pontinní gliom (DIPG)**, agresivní nádor prorůstající mostem, částí mozkového kmene, který se obtížně chirurgicky odstraňuje. **Rameno B** zahrnovalo nádory mozku a míchy mimo mozkový kmen, které se vrátily, odolávaly léčbě nebo se zhoršovaly. Ani jedna skupina nepodstoupila lymfodepleci, krátký cyklus chemoterapie, který před infuzí imunitních buněk dočasně sníží počet některých stávajících imunitních buněk v těle. **Rameno C** bylo rozšířením o čtyři pacienty s návratem nádorů mimo mozkový kmen a přidalo tuto chemoterapii před infuzí pomocí fludarabinu a cyklofosfamidu.

## Three arms, two disease settings, two starting points for survival

*The groups provide different kinds of information.*

### ARM A | 11 infused

Newly diagnosed aggressive brainstem tumor (DIPG)

No pre-infusion  
immune-cell-reducing chemo  
Survival counted  
from diagnosis

### ARM B | 18 infused

Returned / resisted treatment /  
worsened outside the brainstem

No pre-infusion  
immune-cell-reducing chemo  
Survival counted  
from first infusion

### ARM C | 4 infused

Returned outside  
the brainstem

Immune-cell-reducing  
chemo before first infusion  
Survival counted  
from first infusion

DO NOT COMPARE THE SURVIVAL ESTIMATES DIRECTLY

- arm A starts at diagnosis; arms B/C start at first infusion

Original diagram - The Clean Paper - CC BY 4.0

ReMIND používala tři ramena s různými onemocněními a odlišným použitím chemoterapie před infuzí. Přežití v rameni A se měřilo od diagnózy; v ramenech B a C od první infuze TAA-T, takže odhady nelze přímo porovnávat.

The Clean Paper CC BY 4.0

## Souhlas dalo 51 pacientů; infuzi dostalo 33

Počet pacientů se zužoval v každém praktickém kroku.


**Souhlas dalo 51 pacientů.** Čtyřiceti osmi byla odebrána krev. U 41 z těchto 48, tedy 85,4 %, byl vyroben přípravek TAA-T v první plánované dávce studie nebo vyšší. Alespoň jednu infuzi dostalo 33 pacientů: 11 v rameni A, 18 v rameni B a 4 v rameni C.

Někteří pacienti přestali splňovat podmínky nebo zemřeli ještě před léčbou. Sedm pacientů, jimž byla odebrána krev, nedosáhlo použitelného přípravku na první plánované dávkové úrovni studie: u šesti se buňky v laboratoři nedostatečně množily a u jednoho přípravek neprošel povinnou kontrolou kvality. Devět pacientů s nedostatečným prvním výtěžkem muselo být přerazeno na nižší dávku.

Proces se během studie zlepšil. Po odběru většího množství krve a změnách způsobu množení buněk vytvořilo všech 14 pacientů, jimž byla krev odebrána po těchto změnách, alespoň jednu léčebnou dávku na první plánované úrovni nebo výše. To je skutečný důkaz o schopnosti léčbu vyrábět. Není to výsledek týkající se patientského prospěchu.

## The treated group was smaller than the consented group

*Every step tests whether the treatment can be made and delivered.*



Original diagram - The Clean Paper - CC BY 4.0

Studie začala s 51 pacienty, kteří dali souhlas, a infuzi podala 33. Chybějících 18 je součástí důkazů: odběr krve, výroba léčby, trvající splnění pravidel studie i zhoršující se zdravotní stav ovlivnily, kdo se k léčbě dostal.

The Clean Paper CC BY 4.0

Pomocí statistického modelu dávky a bezpečnosti studie vybrala cíl **80 milionů buněk na dávku na každý čtvereční metr odhadovaného tělesného povrchu ( $8 \times 10^7$  buněk/m<sup>2</sup>)**. Tělesný povrch je klinický odhad celkové velikosti těla vypočtený z výšky a hmotnosti; neznamená, že lékaři měřili kus kůže, mozek nebo nádor. Onkologické a pediatrické studie jej používají ke škálování plánované dávky mezi pacienty různé velikosti — například pacient s odhadovaným tělesným povrchem 1,2 m<sup>2</sup> by měl cílovou dávku 96 milionů buněk v jedné infuzi. Model také označil dávku 80 milionů buněk na m<sup>2</sup> za odhadovanou maximální tolerovanou dávku — nejvyšší dávku, u níž se očekává, že zůstane pod prahem nepřijatelné toxicity studie. Na formulaci záleží: skutečně léčení pacienti nikdy nedosáhli pozorovaného toxického stropu. Šlo o doporučení založené na modelu pro studii fáze 2, nikoli o důkaz, že je dávka obecně bezpečná.

## Většina zaznamenaných nežádoucích příhod byla mírná nebo střední. Jedna smrtelná příhoda splnila pravidlo toxicity limitující dávku

Nežádoucí příhoda je jakýkoli zdravotní problém zaznamenaný během studie; není automaticky způsoben léčbou. Stupně 1 a 2 znamenají mírnou nebo střední závažnost, stupeň 3 závažnou, stupeň 4 život ohrožující a stupeň 5 úmrtí. V celé ReMIND bylo 293 z 332 zaznamenaných nežádoucích příhod,

tedy 88 %, stupně 1 nebo 2. Mezi běžné příhody patřily bolesti hlavy, únava nebo letargie, nevolnost a zvracení. Tři z 33 pacientů, kteří dostali infuzi, měli příhody stupně 3 nebo vyšší, jež se objevily nebo zhoršily po léčbě a byly považovány alespoň za možná související s terapií TAA-T. Dva pacienti měli možná související závažné příhody zahrnující edém — otok v mozku, kolem něj nebo v nádoru.

Jedním z nich byl **P27**, pacient s DIPG. Deset dní po infuzi se u P27 rozvinul hydrocefalus, nebezpečné hromadění tekutiny uvnitř mozku, společně s otokem nádoru a dechovou tísní. Stav se nezlepšil ani poté, co lékaři zavedli drenážní trubici zvanou shunt a zvýšili dávku steroidů ke zmírnění otoku. Smrtelná příhoda byla klasifikována jako **toxická limitující dávku stupně 5**: podle protokolu byla dostatečně závažná, aby se započítala proti dalšímu zvyšování dávky.

Vlastní bezpečnostní záznam studie současně zachovává dvě hodnocení příčinné souvislosti: příhoda byla považována za možná související s terapií TAA-T a pravděpodobně související se základním onemocněním. Zobrazení odpovídalo progresi nádoru. Studie nemůže vybrat jedinou příčinu a neměl by to dělat ani článek, který ji popisuje.

Úmrtí vedlo k pozastavení náboru. Protokol byl změněn tak, aby vyžadoval delší období neurologické stability a kratší interval mezi ozařováním a první infuzí. Poté bylo ve stejné nebo vyšší plánované dávce léčeno dalších pět pacientů v rameni A bez další příhody splňující pravidlo limitující dávku.

Druhá závažná příhoda nastala u **P42**, který měl zhoršující se difuzní středočárový gliom v thalamu, hluboké části mozku. Šestnáct dní po infuzi ukázala magnetická rezonance (MRI) otok mozku doprovázený bolestí hlavy a dalšími neurologickými příznaky. Po podání bevacizumabu, léku schopného omezit otok související s nádorem, se příznaky vrátily na předchozí úroveň. Tato příhoda nesplnila pravidlo limitující dávku.

U všech čtyř pacientů v rameni C se objevily dočasné cytopenie stupně 3 — nízké počty krvinek — očekávané po chemoterapii před infuzí; tyto příhody byly z kombinované bezpečnostní analýzy TAA-T vyloučeny. Jeden účastník celé studie zpětně splnil kritéria mírného syndromu z uvolnění cytokinů, celotělové zánětlivé reakce, která může vzniknout při aktivaci imunitních buněk.

Přiměřeně formulovaný závěr zní, že léčba TAA-T byla v této malé kohortě fáze 1 obecně tolerovatelná. Neomezené slovo **bezpečná** by vymazalo velikost studie, dvě závažné příhody s otokem a smrtelnou toxicitu limitující dávku.

## Co se stalo napříč kohortami

Obě klinické populace je nutné držet odděleně.

V rameni A, skupině s DIPG, činil medián přežití bez progresu — doba do zhoršení nádoru nebo úmrtí pacienta — **10,5 měsíce od diagnózy**. Medián celkového přežití — doba, po kterou pacienti zůstali naživu — činil **13,7 měsíce od diagnózy**. Deset pacientů mělo snímky hodnotitelné podle předem stanovených pravidel odpovědi protokolu: šest mělo stabilní onemocnění, tedy ani dostatečné zmenšení pro odpověď, ani dostatečný růst pro progresi, a čtyři progresivní onemocnění. **Žádný snímek neukázal dostatečné zmenšení nebo vymizení, aby splnil předem stanovený práh objektivní odpovědi studie.**

Ramena B a C sdružila několik nádorů mimo mozkový kmen, které se vrátily, odolávaly léčbě nebo se zhoršovaly, protože rameno C bylo příliš malé na samostatné smysluplné porovnání. Zde se přežití počítalo od **první infuze**, nikoli od diagnózy. Medián doby do zhoršení nádoru nebo úmrtí byl **5,0 měsíce** a medián doby přežití **12,7 měsíce**, obojí měreno od infuze. Tyto odhady nelze přímo porovnávat s hodnotami ramene A počítanými od diagnózy.

Mezi deseti pacienty v ramenech B a C s měřitelným onemocněním — alespoň jednou oblastí nádoru, jejíž velikost bylo možné na snímcích spolehlivě určit — mělo pět stabilní a pět progresivní onemocnění. U jednoho z pěti pacientů klasifikovaných jako stabilní, P37, se léze zmenšila o více než 90 %, ale stav se zhoršil dříve, než mohl druhý snímek výsledek potvrdit. Částečná odpověď vyžadovala dostatečné zmenšení nad předem stanovený práh protokolu a potvrzení pozdějším snímkem, takže protokol výsledek P37 jako částečnou odpověď neklasifikoval.

Dalších pět pacientů mělo neměřitelné, ale hodnotitelné onemocnění: lékaři mohli posoudit změnu na snímcích, žádná oblast nádoru však nesplňovala podmínky pro spolehlivé měření velikosti. Jejich nejlepšími odpověďmi byly jedna úplná odpověď, tři stabilní onemocnění a jedno progresivní onemocnění. Úplná odpověď patřila P41. Podle zobrazovacích pravidel protokolu znamenala „úplná odpověď“, že viditelné necílové onemocnění zmizelo; neznamenal důkaz vyléčení. Nešlo o spolehlivé procentní zmenšení měřitelné cílové léze a výsledek nepatří do desetipacientského souboru měřitelného onemocnění.

#### Jak radiologové klasifikují odpověď?

Před léčbou radiologové určují „cílové“ léze, které jsou dostatečně velké a zřetelné pro opakované měření. Jiné viditelné onemocnění lze sledovat jako „necílové“, aniž by mu bylo přiřazeno spolehlivé procento změny. Částečná odpověď vyžaduje dostatečné zmenšení měřených cílových lézí a obvykle potvrzení pozdějším snímkem. Úplná odpověď vyžaduje vymizení podle příslušných zobrazovacích kritérií. Tyto názvy popisují snímky v určitých okamžicích; samy o sobě nedokazují vyléčení ani neurčují, která léčba změnu způsobila.

## Tři životy, tři odlišné příběhy důkazů

Tři dlouhé intervaly lze nejspíše špatně vyložit, když se stlačí do jediné věty. Jejich léčebná historie a omezení měření nebyly stejné.

## Three documented intervals, three different histories

Not to scale. Sequence is shown; attribution is not.

### P41 | age 8 | rare astroblastoma

Before: surgery, radiation,  
re-irradiation, low-dose chemo

3 TAA-T infusions +  
pre-infusion chemo

Complete response on scan  
~1 year after final infusion

>41.2 months disease-free  
ONGOING at cutoff

### P35 | age 14 | medulloblastoma returned 3 times

Before: tumor returned 3 times,  
17 disease-directed treatments

TAA-T infusion

No later antitumor  
treatment reported

>31.8 months disease-free  
FOLLOW-UP ENDED off-study

### P36 | age 14 | pediatric glioblastoma that returned

Before: repeat surgery +  
temozolomide

TAA-T infusion

After: 7 months of a  
CDK4/6 cell-division blocker

>51.6 months disease-free  
ONGOING at cutoff

No line here says the infused cells caused an outcome

Original diagram - The Clean Paper - CC BY 4.0

P41, P35 a P36 měli po první infuzi každý dlouhý zdokumentovaný interval bez známek onemocnění, jejich předchozí a pozdější léčba, měřitelnost na začátku i stav sledování se však lišily. Časové osy ukazují posloupnost, nikoli příčinnost.

The Clean Paper CC BY 4.0


## P41: úplná odpověď s obtížně hodnotitelným výchozím stavem

P41 vstoupil do studie ve věku osmi let s **navraceným astroblastomem nesoucím genovou přestavbu EWSR1-BEND2**, vzácným znakem nádoru, při němž se spojily dva geny. Nádor zasahoval třetí komoru, jeden z prostorů naplněných tekutinou hluboko v mozku. Dítě podstoupilo chirurgické odstranění a cílené ozařování, poté druhý cyklus ozařování přibližně sedm měsíců před TAA-T a nízkodávkovou chemoterapii dokončenou asi dva měsíce před infuzí. P41 byl zařazen do ramene C, dostal lymfodepleční chemoterapii před infuzí a následně tři infuze TAA-T.


Po opětovném odborném vyhodnocení snímků mozku bylo výchozí onemocnění klasifikováno jako **neměřitelné, ale hodnotitelné**: dostatečně viditelné k posouzení, avšak nevhodné pro spolehlivé měření velikosti. Přibližně rok po poslední infuzi podpořilo vymizení necílové léze autorskou klasifikaci úplné odpovědi na zobrazování. Zdrojová data ukazují interval bez známek onemocnění delší než **41,2 měsíce od první infuze**, který k uzávěrce 1. ledna 2026 stále pokračoval.

**e**

Pre-infusion (P41)



Post therapy year 1 (P41)



Tyto T1-vážené snímky MRI po podání kontrastu ukazují mozek P41 před infuzí a jeden rok po poslední infuzi. Oranžové čtverce přidané autory studie označují oblast, kde byla před infuzí přítomna kontrastně se zvýrazňující léze a po roce chyběla; autoři výsledek klasifikovali jako úplnou odpověď. Vymizení je skutečným a nadějným pozorováním, tento jediný případ však nemůže říci, co je způsobilo: výchozí onemocnění P41 bylo hodnotitelné, ale ne spolehlivě měřitelné, dítě před TAA-T dostalo opakované ozařování a chemoterapii, odpověď byla opožděná a studie neměla kontrolní skupinu.

Gomez et al. / Nature Medicine CC BY-NC-ND 4.0

Jde o nejvýraznější pozorování studie a zároveň její nejkřehčí příčinný příběh. Přirozený průběh nádoru není úplně popsán. Množství životaschopného nádoru na začátku bylo obtížné potvrdit. Opakované ozařování a chemoterapie předcházely buněčné léčbě. Odpověď byla opožděná a neexistovala kontrolní skupina.

Imunitní důkazy tuto mezeru neuzavírají. Studie použila **test ELISpot**, laboratorní test detekující signály uvolňované jednotlivými T buňkami při reakci na zvolený cíl. Vyrobené buňky P41 byly podle původních analytických pravidel studie negativní. Pozitivní výsledek se objevil pouze při méně přísné opakované analýze a později byl odstraněn kvůli obavám z falešné positivity; testovací destička byla prasklá, mohlo dojít k úniku a žádný přípravek nezůstal k opakovanému testování. Výzkumníci také nedokázali sledovat podané buňky podle jejich jedinečných otisků receptorů T buněk, nazývaných **klonotypy**. Žádný přípravek nezůstal k určení, které otisky patřily infuzi, a pozdější smíšené vzorky imunitních buněk z krve byly použity pouze v široké analýze, nikoli k přímému párování přípravku s krví. Dostupné vzorky proto nemohly přímo prokázat dlouhodobé přetrvávání nebo expanzi buněk z infuzního přípravku.

#### Co mohou tyto imunitní testy ukázat?

ELISpot zjišťuje, zda T buňky při laboratorním vystavení vybranému cíli uvolňují určitý signál.

Sledování receptorových otisků zkoumá, zda lze stejné rodiny T buněk nalezené v infuzním přípravku později nalézt a změřit v krvi nebo tkáni. Přesvědčivý výsledek by mohl podpořit řetězec od rozpoznání cíle k přetrvávání, stále by však nedokazoval, že buňky způsobily klinickou odpověď. Zde technické problémy a chybějící párované vzorky ponechaly neúplný i tento podpůrný řetězec.

Studie tedy neprokázala, že podané buňky P41 rozpoznávaly zamýšlené cíle, zůstaly v těle nebo způsobily úplnou odpověď.

### P35: více než 31,8 měsíce, poté sledování skončilo

P35 vstoupil do studie ve věku 14 let s meduloblastomem stupně 4, vysoce maligním nádorem mozku poprvé diagnostikovaným v sedmi letech. V době zařazení se onemocnění třikrát vrátilo a pacient podstoupil **17 protinádorových léčebných zásahů**.

Po TAA-T článek uvádí dlouhodobou stabilitu na snímcích bez další protinádorové léčby. Zdrojová data dokumentují interval bez známek onemocnění delší než **31,8 měsíce od první infuze**. V tomto okamžiku P35 studii opustil. Ve statistice studie bylo pozorování **cenzorováno**: sledování zde skončilo, aniž by se předpokládalo, co se stalo později. Interval nelze prodlužovat až k závěrečné uzávěrce článku.

Na začátku nebylo možné onemocnění spolehlivě změřit ani na snímcích dostatečně dobře posoudit ke klasifikaci odpovědi. Rozsáhlá léčebná historie a absence randomizovaného srovnání znemožňují přiřadit interval jedinému zásahu.

### P36: operace a chemoterapie předtím, cílená léčba potom

P36 vstoupil do studie ve věku 14 let s dětským glioblastomem, který se vrátil po progresi při standardní chemoterapii s ozařováním a experimentálním **inhibitoru PARP**, léku určeném k zablokování jedné z cest, jimiž nádorové buňky opravují poškozenou DNA. Nádor progredoval asi tři měsíce před první infuzí; před TAA-T následovala další operace a chemoterapie temozolomidem.

Během aktivní léčby TAA-T nebyla podávána žádná léčba zaměřená na onemocnění, ale po poslední infuzi dostával P36 sedm měsíců **inhibitor CDK4/6**, cílený lék určený ke zpomalení buněčného dělení. Zdrojová data dokumentují interval bez známek onemocnění delší než **51,6 měsíce od první infuze**, který při uzávěrce studie stále pokračoval.

Je to nejdelší ze tří intervalů. Zároveň leží uvnitř posloupnosti zahrnující operaci, chemoterapii, TAA-T a pozdější cílenou léčbu. Studie nedokáže jejich účinky oddělit.

## Proč se „po“ nemůže změnit na „protože“

Tyto příběhy jsou důležité právě tehdy, když se jejich omezení drží hned vedle nich.

ReMIND nebyla randomizovaná, neměla souběžnou kontrolní skupinu a nebyla dost velká ani navržena k testování účinnosti léčby. Ramena B a C spojovala různé diagnózy, množství onemocnění, předchozí léčby a očekávané průběhy; jejich sloučení bylo popisnou volbou učiněnou poté, co výzkumníci viděli data. Rameno C přidalo před infuzí lymfodepleční chemoterapii, zatímco rameno B nikoli. Někteří pacienti po TAA-T podstoupili další léčbu. Lidé, kteří zůstali bez progresu, měli na začátku viditelně jen velmi malé množství nádoru, což může samo ovlivnit výsledek.

ClinicalTrials.gov a článek počítají účast odlišně. Registr v současnosti uvádí 33 zařazených osob a hlavní bezpečnostní ukazatel zaměřuje na prvních 42 dní. Článek a protokol začínají 51 lidmi, kteří dali souhlas, uvádějí 33 pacientů s infuzí a své hlavní otázky popisují jako bezpečnost, možnost léčbu vyrobit a podat a výběr dávky pro další zkoumání. Tento text používá definice článku a protokolu, místo aby oba způsoby počítání směřoval.

Žádná z těchto výhrad nedělá tři intervaly nedůležitými. Určují, jaký druh významu mohou důkazy nést.

Výsledkem je **předběžný signál**: důvod otestovat strategii ve studii navržené k odhadu přínosu, s jasnějšími biologickými měřeními a srovnávací skupinou schopnou oddělit léčbu od výběru pacientů, načasování a další péče. Není to důkaz, že T buňky vyléčily tři děti. Není to důkaz, že buňky překročily hematoencefalickou bariéru — ochrannou hranici mezi cirkulující krví a mozkovou tkání — a nádory zabily. Nejde o léčbu, o níž mohou rodiny v současnosti žádat mimo výzkum.

## Co bude následovat

Praktická otázka ReMIND — bylo možné léčbu vyrobit a podat? — vyžaduje dvě čísla. Přípravek TAA-T na první plánované dávce studie nebo vyšší byl vyroben pro 41 ze 48 pacientů, jimž byla odebrána krev, zatímco alespoň jednu infuzi dostalo 33 z 51 pacientů, kteří dali souhlas. Proces výroby léčby se během studie také zlepšil. Klinické průběhy odůvodňují další práci, další studie však musí položit jinou otázku.

Výzkumníci budou muset zjistit, zda buňky spolehlivě rozpoznávají zamýšlené cíle, kam putují, jak dlouho přetrvávají a zda se výsledky zlepšují ve srovnání s jinou péčí. Větší studie budou potřebné také k charakterizaci neobvyklých škod. Budoucí studie navržená k testování přínosu musí zachovat rozdíly, které tato fáze 1 nedokázala rozlišit: typ nádoru, množství onemocnění, chemoterapii před infuzí, předchozí léčbu a léčbu podanou poté.

Pro rodiny čelící dětským mozkovým nádorům není nejistota totéž co prázdnota. Tři dlouhé intervaly mohou zasloužit pozornost, aniž by se proměnily v příslib. Nejúčtyhodnější podoba naděje je ta, která pravdivě říká, kolik toho stále nevíme.

**Redakční poznámka: co čísla nedokážou unést**

Je přirozené přát si, aby tento příběh skončil vyléčením každého dítěte. Nekončí. ReMIND probíhala u nemocí, při nichž mohou rodiny čelit strašlivým volbám a lékaři musejí jednat bez jistoty, zda experimentální léčba pomůže, nebude mít účinek, nebo uškodí.

Studie zaznamenala dlouhé intervaly bez známek onemocnění. Zaznamenala také závažné nežádoucí příhody a úmrtí P27. Výzkumníci vyhodnotili smrtelnou příhodu jako možná související s TAA-T a pravděpodobně související se základním onemocněním; snímky odpovídaly progresi. Tuto nejistotu nelze zpětně vyřešit a nesmí se proměnit v obviňování.

Kód P27 chrání soukromí dítěte. Neměl by z dítěte dělat abstrakci. Za každým číslem pacienta byl mladý člověk, rodina rozhodující se pod tlakem a klinický tým odpovědný za péči v podmínkách, kdy žádná možnost nepřinášela jistotu. Účast nikoho z nich nezavazovala k vytvoření nadějného nebo „hrdinského“ výsledku a úmrtí se nestává přijatelnou cenou jen proto, že se z něj může pozdější výzkum něco naučit.

Lékařský pokrok nevzniká pouze léčbou, která vyléčí. Studie fáze 1 může také určit, co lze vyrobit a podat, vybrat dávku pro další testování, ukázat, kterým rizikům je třeba věnovat pozornost, a naznačit, jak se musí změnit protokol. Tyto poznatky nevykupují utrpení. Vytvářejí povinnost podat o něm poctivou zprávu, využít je k bezpečnějším budoucím studiím a pamatovat na lidi, kteří je umožnili.

## Stručné shrnutí

ReMIND byla časná studie fáze 1 s T buňkami vypěstovanými z vlastní krve každého účastníka a v laboratoři namnoženými tak, aby reagovaly na tři proteiny, které mohou být přítomny v nádorových buňkách. Z 51 dětí a mladých dospělých s vysoce rizikovými nádory mozku nebo míchy, kteří dali souhlas, byla 48 odebrána krev, pro 41 byl vyroben přípravek na první plánované dávce nebo vyšší a 33 dostalo alespoň jednu infuzi. Většina zaznamenaných zdravotních problémů byla mírná nebo střední, ale tři pacienti s infuzí měli závažné nebo horší příhody považované alespoň za možná související; dva měli možná související závažné otoky mozku nebo nádoru, včetně jednoho úmrtí splňujícího pravidlo studie pro toxicitu limitující dávku. Ve skupině agresivních nádorů mozkového kmene neukázal žádný snímek dostatečné zmenšení nebo vymizení ke splnění předem stanoveného prahu odpovědi. Ve skupinách mimo mozkový kmen měli tři mladí pacienti intervaly bez známek onemocnění delší než 31,8, 41,2 a 51,6 měsíce od první infuze, včetně jedné úplné odpovědi podle zobrazovacích kritérií. Sledování jednoho pacienta skončilo při odchodu ze studie; další dva intervaly při uzávěrce pokračovaly. Studie neměla kontrolní skupinu, nebyla navržena k prokázání přínosu a nemůže ukázat, že tyto výsledky způsobila experimentální terapie T buňkami.

## Kontrola bez příkras

**Co článek ukazuje:** Personalizovaný přípravek T buněk zaměřený na tři proteiny spojené s nádory byl vyroben na první plánované dávce studie nebo vyšší pro 41 ze 48 pacientů, jimž byla odebrána krev; alespoň jednu infuzi dostalo 33 z 51 pacientů, kteří dali souhlas. Statistický model vybral dávku pro pozdější testování. Studie zdokumentovala vzniklé zdravotní problémy a zaznamenala tři dlouhé intervaly bez známek onemocnění po infuzi.

**Co je slibné, ale neprokázané:** Že experimentální T buňky přispěly ke kontrole onemocnění u některých pacientů, zvláště těch s velmi malým množstvím nádoru viditelným na začátku, a po kontrolovaném testování by se mohly stát klinicky užitečnými.

**Co článek neukazuje:** Že léčba vyléčila tři děti; že způsobila úplnou odpověď nebo prodloužené intervaly; že bylo prokázáno rozpoznání zamýšlených cílů podanými buňkami P41 nebo jejich přetrvávání v těle; že přístup funguje u tohoto agresivního nádoru mozkového kmene; ani že je léčba dostupná nebo obecně bezpečná.

**Hlavní omezení:** Šlo o časnou studii bezpečnosti a dávky, v níž všichni znali podanou léčbu a nikdo nebyl náhodně přiřazen ke srovnávací skupině; infuzi dostalo 33 pacientů s různými diagnózami; časné známky přínosu nebyly hlavní otázkou; přežití se mezi skupinami měřilo od různých výchozích bodů; rameno C zahrnovalo pouze čtyři pacienty s infuzí a používalo před ní lymfodepleční chemoterapii; někteří pacienti dostali další léčbu; tři výjimečné případy nezačínaly s oblastí nádoru, kterou by bylo možné spolehlivě měřit na snímcích — P41 stále měl viditelné onemocnění, které mohli lékaři sledovat, zatímco P35 a P36 nebylo možné dostatečně dobře vyhodnotit ke klasifikaci odpovědi; laboratorní důkazy nedokázaly přímo propojit podané buňky s pozdějšími výsledky; a jedna smrtelná příhoda splnila nejzávažnější pravidlo studie pro toxicitu.

**Jak velkou důvěru by měl mít běžný čtenář?** Vysokou důvěru v úzké výsledky týkající se výroby a podání léčby a zdravotních problémů zaznamenaných v této skupině. Vysokou důvěru, že tři zdokumentované intervaly nastaly po infuzi. Nízkou důvěru, že tyto výsledky způsobila experimentální terapie T buňkami, protože studie nebyla navržena k zodpovězení této otázky.

---

## Zdroje

Gomez et al., Multi-antigen-targeting T cells in pediatric central nervous system tumors: a phase 1 trial, *Nature Medicine* 32, 2481-2493 (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41591-026-04449-9>

Author Correction, *Nature Medicine* (22 July 2026), DOI 10.1038/s41591-026-04593-2

<https://www.nature.com/articles/s41591-026-04593-2>

ClinicalTrials.gov, NCT03652545

<https://clinicaltrials.gov/study/NCT03652545>