




The CLEAN PAPER

WHAT THE PAPER SAYS · WHAT IT DOESN'T · WHY IT MATTERS

Kylmien atomien koe testaa kvanttigravitaation ”ajan ongelmaa” — laboratorioanalogina, ei vastauksena

Kanonisessa kvanttigravitaatiossa Wheeler–DeWittin yhtälössä ei ole ulkoista kelloa tapahtumien järjestämiseksi: tämä on ”ajan ongelma”. Yhden kirjoittajan kokeessa Bose–Einstein-kondensaatti eristetään, jaetaan ohuella optisella esteellä havaitsemattomaan ja havaittuun sektoriin ja niiden välillä virtaavasta entropiasta rakennetaan sisäinen kello. Tämä ”entrooppinen aika” järjestää havaitun sektorin laajenemisen ja uudelleen luhistumisen, ja efektiivinen yhtälö toistaa mitatun datan tarkastellussa matalan esteen tapauksessa. Kyse on hallitusta testialustasta relationaalisen ajan ideoille: ”alkuräjähdyks”, ”loppurysäys” ja ”pienoismaailmankaikkeus” ovat ansaan suljetun kaasun analogisia nimikkeitä, eivät todellista kosmologiaa, eikä työ väitä ratkaisevansa ajan ongelmaa tai kvanttigravitaatiota.

Written by Vera Rubin · Cross-checked by Lucio Vaglio · Edited by Michele Renda · Figures by Nova Vela · AI-assisted, human-reviewed

Paper: *Testing the problem of time with cold atoms*, Giovanni Barontini, Physical Review Research 8, L022047 (2026) · DOI: 10.1103/1h9j-df4k

Entropiasta rakennettu kello ansan sisällä

Kanonisessa kvanttigravitaatioissa on outo ja sitkeä pulma: keskeisessä yhtälössä ei ole aikaa. Wheeler–DeWittin yhtälö, lähin vastine koko maailmankaikkeuden Schrödingerin yhtälölle, sanoo yksinkertaisesti, että tietyn operaattorin vaikutus tilaan antaa nollan. Ei ole ulkoista parametria, joka tikittäisi, ei mitään, mikä järjestäisi ”ennen” ja ”jälkeen” — ja silti koemme selvästi ajan kuluvaan. Tämä on **ajan ongelma**, eikä sitä ole ratkaistu yli puoleen vuosisataan.

Yhden kirjoittajan artikkeli *Physical Review Research* -lehdessä ei ratkaise sitä. Se tekee jotain hiljaisempaa ja omalla tavallaan hyödyllisempää: rakentaa pienen, hyvin hallitun laboratoriojärjestelmän, jossa yhtä ehdotettujen ratkaisujen perhettä voidaan **testata oikeaa dataa vasten**. Birminghamin yliopiston Giovanni Barontini ottaa Bose–Einstein-kondensaatin — ultrakylmien atomien pilven, joka käyttäytyy yhtenä kvanttioliona — ja tekee siitä analogin, jossa ”sisäisen”, relationaalisen ajan ideaa voidaan mitata sen sijaan, että siitä vain väiteltäisiin. Tempu on rakentaa kello ei ulkoisesta sekuntikellosta vaan entropiasta, jota järjestelmä siirtelee sisällään.

Etäisyys ”ajan ongelman hallitun analogin” ja ”fyysikot ratkaisivat ajan” välillä on koko tarinan ydin — ja se on pitkä etäisyys.

Mitä tutkija teki

Laitteistona on noin **24 000 rubidium-87-atomista** koostuva kondensaatti, joka pidetään konservatiivisessa optisessa dipoliansassa ja pannaan värähtelemään — koko atomipilvi liikkuu edestakaisin ansan poikki. **Ohut optinen este** — noin 8 mikrometriä leveä, 675 nm:n valolla digitaalisen mikropeililaitteen avulla ”maalattu” — jakaa ansan kahteen puoliskoon. Toista puoliskoa tarkkaillaan (**”kirkas sektori”**), toista ei (**”pimeä sektori”**). Kokeen noin 100 millisekunnin ikkunassa järjestelmässä ei havaita mitattavaa hiukkashäviötä tai dissipaatiota, joten se on hyvällä approksiimaatiolla suljettu järjestelmä, jonka Hamiltonin funktio ei itsessään riipu ajasta.

[figure_pair pending]

Vasemmalla magneto-optinen ansa tuottaa kylmän rubidiumatomipilven lasikennon sisään: tämä on kondensaatin valmistusta edeltävä varhainen jäähtytysvaihe. Oikealla Giovanni Barontini seisoo optisen laitteiston vieressä. Kuvat esittävät kokeen laboratoriojärjestelmää, eivät kirjaimellista pienoismaailmankaikkeutta.

Tavallisella laboratoriokellolla katsottuna — absorptiokuva joka 2 ms — kirkas sektori tekee jotain mielikuvia herättävää. Atomeja virtaa esteen yli ja sektori kasvaa tyhjästä (Barontini kutsuu hetkeä **”alkuräjähdykseksi”**), saavuttaa maksimikokonsa, supistuu sitten ja tyhjenee takaisin pimeälle puolelle (**”loppurysäys”**). Esteen korkeudesta riippuen tämä voi toistua sykleissä.

Sitten tullaan varsinaiseen asiaan. Laboratoriokello on järjestelmän *ulkopuolinen* — juuri sellaista Wheeler–DeWitt-asetelma ei salli. Niinpä Barontini kysyy: voidaanko kirkkaan sektorin historia **järjestää käyttämällä vain järjestelmän sisäisiä suureita**? Hänen vastauksensa on kello nimeltä

entrooppinen aika, joka luetaan samoista kuvista kolmella suoralla vaiheella. Ensin jokaisesta absorptiokuvasta poimitaan kirkkaalle sektorille neljä lukua: atomimäärä, tiheysprofiilin massakeskipiste (joka toimii analogisena ”skalaarikenttänä”), leveys ja entropia — entropia atomia kohti standardimenetelmällä arvioituna ja kerrottuna atomimäärällä. Toiseksi atomien ylittäessä estettä entropia nousee ja laskee. Kolmanneksi kello seuraa entropiagradianttia mitattua massakeskipisteen reittiä pitkin ja laskee kunkin siirtymän suuruuden, ei sen suuntaa. Kun entropia ja massakeskipiste nousevat tai laskevat yhdessä, jokainen askel vie kelloa eteenpäin myös pilven kääntyessä. Datassa tämä antaa lähes kaikkialla yhden järjestyksen sektorin ”alkuräjähdyksestä” sen ”loppurysäykseen”, vain muutamilla pienillä heilahteluilla siellä, missä karkea näytteenotto saa nämä kaksi muutosta poikkeamaan toisistaan.

Lopuksi hän johtaa efektiivisen ”**entrooppisen ajan Schrödingerin yhtälön**” — kirkkaan sektorin evoluutioyhtälön, joka kirjoitetaan tämän sisäisen kellon eikä ulkoisen ajan suhteen — ja ratkaisee sen numeerisesti nähdäkseen, toistaako se kameran todella tallentaman kehityksen.

Mitä löytyi

Kolme tulosta, kasvavassa kunnianhimossa.

- **Sisäinen kello toimii järjestyksenä.** Entrooppinen aika kasvaa lähes kaikkialla monotonisesti, ja sen nopeus määräytyy sen mukaan, kuinka nopeasti entropiaa kulkee esteen yli: se käy nopeammin entropian vaihtuessa ja **pysähtyy kokonaan, kun vaihtoa ei ole**. Palautuvassa, matalan esteen tilanteessa *sisäistä aikaa ei kulu lainkaan* loppurysäyksen ja seuraavan alkuräjähdyksen välillä — koska entropiaa ei vaihdeta — vaikka laboratoriokello jatkaa tikittämistä. Koko aineistossa molempien sektorien kokonaisentropia pysyi virherajojen sisällä vakiona, kuten suljetulta järjestelmältä odotetaan.
- **Eri toimintatilat tuottavat erilaisia ”aikoja”.** Esteen korkeutta nostettaessa entropianvaihto pienenee, joten sisäinen kello käy hitaammin. Kun este nostetaan pisteeseen, jossa sektorit tuskin ovat yhteydessä, kirkas sektori asettuu kohti sitä, mitä artikkeli kutsuu ”**lämpökuolemaksi**”: stationaarista tilaa, jossa entrooppinen aika yksinkertaisesti pysähtyy.
- **Efektiivinen yhtälö toistaa datan.** Kokeellisilla parametreilla syötetty entrooppisen ajan Schrödingerin yhtälö palauttaa numeerisesti pilven mitatun leveyden kehityksen; artikkeli raportoi erinomaisen vastaavuuden matalan esteen tapauksessa, jossa entropiaa ajava termi hallitsee. Numeerinen vertailu tehdään nimenomaan tälle tapaukselle.

Mitä ”ajan ongelma” ja ”entrooppinen aika” tarkoittavat tässä

Ajan ongelma tarkoittaa, että kanonisen kvanttigravitaation pääyhtälössä, Wheeler–DeWittin yhtälössä, ei ole ulkoista aikamuuttujaa. Yksi tavallinen vastaus on *relationalainen*: valitaan jokin järjestelmän sisäinen fysikaalinen suure ”kelloksi” ja kuvataan kaikki muu suhteessa siihen. Toistuva vaikeus on, etteivät luonnolliset kelloehdokkaat aina ole monotonisia — uudelleen luhistuvassa järjestelmässä kellomuuttuja kulkee ensin eteen ja sitten taakse — eikä

se siten voi nimetä yhtä selkeää suuntaa alusta loppuun.

Entrooppinen aika on Barontinin ratkaisu tähän. Sen sijaan, että kello luettaisiin sijainnin kaltaisesta muuttujasta, se rakennetaan havaitun ja havaitsemattoman sektorin välillä siirtyvästä *entropiasta* niin, ettei kello käänny. Ajatus muistuttaa hengeltään vanhempia ”termisen ajan” ehdotuksia, mutta tässä se määritellään operationaalisesti mitattavasta entropiavirrasta abstraktin matemaattisen rakenteen sijasta — juuri siksi sitä voidaan testata oikeassa laitteistossa.

Ratkaisevaa on, että kosmologiset sanat — ”alkuräjähdyks”, ”loppurysäys”, ”skaalaustekijä”, ”skalaarikenttä”, ”pienoismaailmankaikkeus” — ovat **analogisia nimikkeitä**. Ne nimeävät ansaan suljetun atomikaasun piirteitä, jotka ovat *rakenteellisesti samankaltaisia* yksinkertaistettujen kosmologisten mallien yhtälöiden kanssa. Ne eivät ole väitteitä todellisesta maailmankaikkeudesta.

Mitä tämä ei todista

Tässä varovaisuus on tärkeintä, koska sanasto houkuttelee ylilyönteihin.

- **Se ei ratkaise ajan ongelmaa eikä väitä ratkaisevansa sitä.** Artikkelin oma kehystys on, että se ”luo hallitun kokeellisen ympäristön, jossa relationaalisen ajan konstruktioita voidaan testata kvantitatiivisesti”. Testialusta ei ole teoreema. Se, onko relationaalinen tai entrooppinen aika *oikea* kuvaus ajasta kvanttigravitaatioissa, jää yhtä avoimeksi kuin ennenkin.
- **Se on analogi, ei maailmankaikkeus.** Kosmologiaa ei havaita. Havaitaan ansassa oleva Bose–Einstein-kondensaatti, jonka redusoitu kuvaus on *matemaattisesti samankaltainen* yksinkertaistetun minisuperspace-kosmologisen mallin kanssa. Samankaltaisuus on kokeen tarkoitus ja samalla sen raja. Mikään tässä ei osoita, että varhainen maailmankaikkeus koki tämänkaltaisen alkuräjähdyksen, että aika-avaruus koostuisi atomeista tai että ”aikaa ei ole olemassa”.
- **Se ei osoita, että aika olisi ”todella” entropiaa.** Entrooppinen kello on yksi rakennettu järjestys, joka toimii hyvin tässä järjestelmässä. Artikkelin huomauttaa käsitteellisestä sukulaisuudesta termisen ajan hypoteesiin mutta jättää nimenomaisesti avoimeksi jopa sen, osuvatko ne yhteen. ”Entropiasta rakennettu sisäinen kello voi järjestää tämän kokeen” on paljon kapeampi väite kuin ”aika on entropiaa”.
- **Efektiivinen yhtälö on mallinnustulos, ei kvanttimekaniikan uudelleenkirjoitus.** Johdettu entrooppisen ajan Schrödingerin yhtälö pelkistyy tavalliseen kvanttimekaniikkaan, kun entropiavirta on hidas, ja on täsmälleen tavallinen unitaarinen teoria vain silloin, kun entropiaa ei virtaa lainkaan. Artikkelin asettaa sen standardiyhtälöä yleisemmäksi *nimenomaan silloin, kun havaittu järjestelmä on termodynaamisesti avoin havaitsemattomaan järjestelmään nähden* — tämä on väite tämänkaltaisista avoimista osajärjestelmistä, ei siitä, että perustava fysiikka pitäisi kirjoittaa näin uudelleen.
- **Kyse on yhdestä kokeesta, yhdestä kirjoittajasta ja yhdestä kellovalinnasta.** Tuloksissa on noin 5 %:n tilastollinen epävarmuus datapistettä kohti, ja ne nojaavat keskimääräiskenttä- ja keskimääräistetytiheyden approksimaatioihin. Kellon valinta ja karkeistus ovat tietoisia

mallinnuspäätöksiä, joita muiden ryhmien kannattaa testata ennen rakenteellisia johtopäätöksiä.

Kuinka vahvaa näyttö on

Siihen vaatimattomaan asiaan, jota artikkeli todella väittää, näyttö on varsin selkeää. Järjestelmä on relevantilla aikaskaalalla aidosti hyvin eristetty, entropiatase sulkeutuu (kokonaisentropia pysyy vakiona virherajojen sisällä), sisäinen kello järjestää datan lähes kaikkialla monotonisesti ja samasta mallista johdettu, datasta päätellyillä parametreilla syötetty efektiivinen yhtälö toistaa mitatun dynamiikan siinä matalan esteen tapauksessa, johon sitä sovellettiin. Data on avoimesti saatavilla. Tämä on oikean hallittavan järjestelmän oikea mittausta, ei ajatuskoe.

Sen kantama on vastaavasti vaatimaton. Kaikki nojaa redusoitua kondensaattimallia ja minisuperspace-kosmologiaa yhdistävään analogiaan, ja analogiat valaisevat ilman että ne todistavat. Yksi alusta, yhden kirjoittajan toteuttamana, osoittamassa että yksi sisäisen ajan resepti toimii, on vahva periaatetodistus ja heikko pohja väitteille siitä, miten aika käyttäytyy luonnossa. Oikea tulkinta on: menetelmä on nyt jotain, mitä voidaan *tehdä* laboratoriossa ja tarkistaa.

Miksi sillä on merkitystä

Ajan ongelmaa koskeva keskustelu on pitkään juuttunut formalismiin, jossa kilpailevia ehdotuksia on vaikea falsifioida, koska ne tekevät vähän konkreettisia, mitattavia ennusteita. Jo pienen osan muuttaminen kokeeksi — jossa sisäinen kello joko järjestää datan tai ei, ja efektiivinen yhtälö joko sopii tai ei — muuttaa keskustelun luonnetta. Se antaa teoreetikoille koelavan, jolla heidän koneistoaan voidaan testata.

Tämä on työn aito panos: ei vastaus ajasta, vaan **paikka, jossa kysymys voidaan esittää kvantitatiivisesti**. Kylmien atomien alustat ovat jo toimineet hallittavina analogeina Hawkingin säteilylle, laajeneville maailmankaikkeuksille ja väärän vakuumin hajoamiselle; nyt relationaalinen aika ja ajan nuoli lisätään työkalupakkiin. Arvo on jatkokokeissa, jotka se mahdollistaa — eri kellovalinnat, pomp-paava versus singulaarinen käyttäytyminen, palautuvuustestit — kukin nyt mittauksena eikä vain laskuna.

Tiivistelmä ilman turhaa koristelua

Fyysikko rakensi Bose–Einstein-kondensaatin, jakoi sen ohuella optisella esteellä havaittuun ja havaitsemattomaan puoliskoon ja rakensi niiden välillä kulkevasta entropiasta sisäisen ”entrooppisen ajan”. Tämä kello järjestää havaitun puoliskon laajenemisen ja uudelleen luhistumisen syklin, käy nopeasti entropian vaihtuessa ja pysähtyy, kun sitä ei vaihdeta, ja tähän sisäiseen aikaan

kirjoitettu efektiivinen yhtälö toistaa mitatun datan tarkastellussa matalan esteen tapauksessa. Asetelma on kanonisen kvanttigravitaation ”ajan ongelman” analogi: ”alkuräjähdyks”, ”loppurysäys” ja ”pienoismaailmankaikkeus” ovat nimityksiä ansassa olevalle kaasulle, joka on matemaattisesti samankaltainen yksinkertaistetun kosmologisen mallin kanssa. Se on hallittu testialusta relationaalisen ajan ideoille — ei ajan ongelman ratkaisu, ei väite todellisesta maailmankaikkeudesta eikä näyttö siitä, että aika olisi ”todella” entropiaa.

Realistinen arvio

Mitä artikkeli osoittaa: Yhdessä hyvin eristetyssä kylmien atomien järjestelmässä entropianvaihdoista määritelty sisäinen kello voi järjestää havaitun dynamiikan lähes monotonisesti, ja efektiivinen ”entrooppisen ajan” yhtälö toistaa mitatun evoluution tarkastellussa matalan esteen tapauksessa.

Mikä on uskottavaa mutta ei osoitettua: Että entrooppinen tai relationaalinen aika olisi hyvä kuvaus ajasta todellisessa kvanttigravitaatiossa. Koe antaa syyn ottaa tällaiset konstruktiot vakavasti, mutta ei vahvista niitä luonnolle.

Mitä se ei osoita: Että ajan ongelma olisi ratkaistu; että kvanttigravitaatio olisi ratkaistu; että maailmankaikkeus alkoi tämänkaltaisessa alkuräjähdyksessä; että aika-avaruus emergentisti syntyy atomeista; tai että ”aikaa ei ole olemassa”.

Tärkeimmät rajoitukset: Yksi alusta, yksi kirjoittaja ja yksi kellovalinta; noin 5 %:n epävarmuus datapistettä kohti; keskimääräiskenttä- ja keskimääräistetyn tiheyden approksimaatiot; ja ennen kaikkea riippuvuus ansaan suljetun kondensaatin ja yksinkertaistetun kosmologisen mallin analogiasta.

Kuinka paljon luottamusta yleislukijan kannattaa antaa? Suuri luottamus siihen, että koe teki omassa järjestelmässään sen, mitä raportoidaan. Pieni luottamus kaikkiin hyppyihin tästä analogista väitteisiin ajan luonteesta todellisessa maailmankaikkeudessa.

Lähteet

Barontini, Testing the problem of time with cold atoms, Physical Review Research 8, L022047 (2026)
<https://doi.org/10.1103/1h9j-df4k>