



The CLEAN PAPER

WHAT THE PAPER SAYS · WHAT IT DOESN'T · WHY IT MATTERS

Divovske kredne hobotnice možda su bile vršni predatori — ali dokazi počinju čeljustima, ne morskim čudovištima

Rad u Scienceu ponovno proučava goleme kredne čeljusti glavonožaca i tvrdi da su dvije vrste Nanaimoteuthis bile rane perajaste hobotnice, s procjenama tjelesne veličine od nekoliko metara i možda do 18.6 m. Snažno trošenje čeljusti upućuje na drobljenje tvrdog plijena; asimetrično trošenje možda na lateralizirano ponašanje. Spektakularna je to fosilna priča, ali čista verzija nije „kraken je bio stvaran”: riječ je o rekonstrukciji iz čeljusti, tragova trošenja, taksonomije i skaliranja.


Written by Laura Nesso · Cross-checked by Lucio Vaglio · Edited by Michele Renda · Figures by Laura Nesso and Nova Vela · AI-assisted, human-reviewed

Paper: *Earliest octopuses were giant top predators in Cretaceous oceans*, Shin Ikegami, Jörg Mutterlose, Kanta Sugiura, Yusuke Takeda, Mehmet Oguz Derin, Aya Kubota, Kazuki Tainaka, Takahiro Harada, Harufumi Nishida, and Yasuhiro Iba, *Science* 392, 406–410 (2026) · DOI: 10.1126/science.aea6285

Priča o krakenu, svedena natrag na fosile

Fosilna čeljust nije životinja. To je tvrdi ostatak mekog tijela, ulomak iz kojeg paleontolozi moraju rekonstruirati anatomiju, ponašanje i ekologiju bez pretvaranja da su životinju vidjeli živu. Zato je ovaj rad istodobno neodoljiv i vrlo lako ga je pretjerano pojednostaviti. Naslovna verzija mami: golemi hobotničasti “krakeni” vladali su krednim oceanima. Pažljivija verzija je bolja: iznimno očuvane fosilne čeljusti upućuju na to da su neke od najranije poznatih perajastih hobotnica bile vrlo veliki mesožderi koji su opetovano drobili tvrdi plijen i možda dosegali najvišu razinu morskih hranidbenih mreža kasne krede.

I to je spektakularno. No treba ga čitati kao rekonstrukciju iz čeljusti, tragova trošenja, taksonomije i skaliranja tjelesne veličine, a ne kao priču o morskom čudovištu.



Umjetnička rekonstrukcija dviju vrsta **Nanaimoteuthis** o kojima govori rad, uz fosilne donje čeljusti prikazane kao izravni dokaz na kojem se temelji rekonstrukcija tjelesne veličine. Slika je rekonstrukcija, ne fotografija fosila: očuvani dokaz čine čeljusti, dok se duljina tijela i uloga vršnog predatora zaključuju iz skaliranja, tragova trošenja i ekologije.

Original hybrid diagram — The Clean Paper CC BY 4.0

Što su autori učinili

Autori su ponovno proučili fosilne čeljusti krednih osmerokrakih glavonožaca — šire skupine koja uključuje hobotnice i njihove srodnike. Petnaest velikih fosilnih čeljusti već je ranije opisano iz Japana i s otoka Vancouver. Tim je digitalnim traženjem fosila pronašao i dvanaest dodatnih čeljusti u pet karbonatnih konkrecija iz Japana.

Ta je metoda spojila visokorezolucijsku tomografiju serijskim brušenjem u punoj boji i AI model za zero-shot učenje, što znači da model nije bio posebno treniran na tim fosilima. Istraživači su svaku konkreciju brusili u intervalima od **50 mikrometara**, fotografirajući svaku novootkrivenu površinu kako bi izgradili velik niz kolor-snimki. Segmentacijski model nazvan DEVA napravio je digitalni obris, odnosno masku čeljusti na svakoj slici. Istraživači su te obrise provjerili prema izvornim slikama, zatim ih složili i spojili u minimalno zaglađene 3D modele u izvornim bojama. Tako su mogli otkriti čeljusti skrivene u stijeni i pregledati sitne okrhline, ogrebotine i druge tragove trošenja na njihovim površinama. Tomografija brušenjem uništila je pet uzoraka stijene, ali su dobivene slike, maske i 3D modeli arhivirani.

Zatim su učinili četiri povezane stvari.

Prvo, revidirali su taksonomiju. Fosilne čeljusti koje su prije bile raspoređene u pet vrsta reorganizirane su u dvije: **Nanaimoteuthis jeletzkyi** i **Nanaimoteuthis haggarti**. Rod, koji se prethodno smatrao srodnikom vampirske lignje, ovdje je smješten unutar **Cirrata**, perajastih hobotnica.

Drugo, produljili su vremenski zapis. Novi materijal pomiče **N. jeletzkyi** unatrag do najranijeg ceno-mana, prije oko **100 milijuna godina**, produljujući poznati zapis perajastih hobotnica za približno 15 milijuna godina, a hobotnica općenito za oko 5 milijuna godina.

Treće, procijenili su tjelesnu veličinu iz veličine čeljusti. Koristeći alometrijske odnose suvremenih dugotijelnih perajastih hobotnica procijenili su duljinu plašta, a zatim ukupnu duljinu. Procjene su široke: **N. jeletzkyi** dosežao je približno **2.8 do 7.7 metara** ukupne duljine, a **N. haggarti** oko **6.6 do 18.6 metara**. Iz tog gornjeg raspona dolazi jezik o “krakenu”.

Dopunske metode izričito opisuju taj lanac skaliranja. Istraživači su po potrebi rekonstruirali obrise istrošenih ili vremenski oštećenih čeljusti, a zatim koristili **12 odnosa specifičnih za vrste** između duljine kapuljače donje čeljusti i duljine plašta. Uračunali su prosječno **39% skupljanje pri fiksaciji** relevantnih suvremenih primjeraka i pretvorili duljinu plašta u ukupnu duljinu omjerom **4.2** dobivenim iz živih dugotijelnih perajastih hobotnica. Ti izbori daju raspon, ne izravno mjerenje fosilnog tijela.

Četvrto, pregledali su tragove trošenja. Najveće čeljusti bile su tupe i zaobljene na mjestima gdje bi juvenilni primjerci imali oštrije elemente čeljusti. Pokazivale su okrhline, ogrebotine, uglačane površine, pukotine i asimetričan gubitak rubova čeljusti. Autori to tumače kao dokaz ponavljano g drobljenja tvrdog plijena i možda lateraliziranog ponašanja.

Što su pronašli

Vjerojatno su bile rane perajaste hobotnice, a ne vampirske lignje. Dopunska taksonomija razdvaja dva povezana koraka. Svaki “bridge” je traka materijala čeljusti koja povezuje kapuljaču s bočnom stijenkom. Kod *Nanaimoteuthis* ti su mostovi potpuno skriveni unutar njom i vanjskom pločom čeljusti, obrazac koji podupire smještanje roda unutar Cirrata. Njegova široka krila čeljusti zatim podupiru pripadnost dugotijelnoj skupini perajastih hobotnica. To je važno jer rad ne govori samo “veliki glavonožac”; mijenja mjesto tih fosila u povijesti hobotnica.

Bile su stare. Novi primjerci smještau perajaste hobotnice prije približno **100 milijuna godina**, u kasnu kredu. Time postaju među najranijim poznatim životinjama iz evolucijske linije hobotnica.

Mogle su biti goleme. Procjene tjelesne veličine nisu pojedinačna mjerenja očuvanih tijela; to su izračuni iz čeljusti. Ali brojke su velike i kada ih se navede oprezno. Manja vrsta, *N. jeletzkyi*, procijenjena je na nekoliko metara ukupne duljine. Veća, *N. haggarti*, procijenjena je do približno **18.6 metara**, razmjera usporedivog s najvećim morskim predatorima toga vremena i najvećim živim glavonošcima.

Čeljusti su bile snažno istrošene. U najvećim primjercima izgubljeni materijal čeljusti dosežao je približno **10% ukupne duljine čeljusti**. Rad tvrdi da trošenje nije posljedica preparacije ili abrazije pri transportu: primjerci dolaze iz naslaga vanjskog šelfa niske energije, okrhline i ogrebotine očuvane su na način koji odgovara uporabi, a fosilne čeljusti lignji pronađene uz njih ne pokazuju isti obrazac. Autori trošenje uspoređuju sa suvremenim durofagnim glavonošcima — životinjama koje jedu tvrdo plijen.

Trošenje je bilo asimetrično. Desni rub čeljusti bio je istrošeniji od lijevog u obje vrste. Autori to tumače kao moguću lateralizaciju ponašanja: sklonost da se jedna strana koristi više od druge. Budući da je lateralizirano ponašanje u suvremenih životinja povezano sa složenim živčanim sustavima, sugeriraju da su te rane hobotnice možda već imale naprednu inteligenciju.

Što to vjerojatno znači

Najjače ekološko tumačenje jest da perajaste hobotnice kasne krede nisu sve bile male pozadinske životinje u ekosustavima kojima su dominirali veliki kralježnjaci. Argument autora za vršne predatore spaja dva nalaza: procijenjenu golemu tjelesnu veličinu i durofagno mesožderstvo — ponavljano obrađivanje tvrdog životinjskog plijena — zaključeno iz trošenja čeljusti. Zajedno ti nalazi podupiru mogućnost da se jedna beskralježnjačka loza pridružila najvišoj razini hranidbene mreže koju inače povezujemo s mosasaurima, plesiosaurima, velikim ribama i morskim psima.

Zanimljiva je i evolucijska priča. Morski kralježnjački predatori i glavonošci iz linije hobotnica krenuli su vrlo različitim putovima prema predatorstvu. Kralježnjaci su stekli čeljusti, hidrodinamična tijela i često smanjili vanjski oklop. Srodnici hobotnica smanjili su ili internalizirali ljuštore, postali mekotijelni i pokretni, a zadržali snažne čeljusti i savitljive krakove. Rad to prikazuje kao konvergentan put prema velikim, inteligentnim morskim predatorima.

Spekulativniji dio odnosi se na ponašanje. Opsežno trošenje podupire hranjenje tvrdim plijenom. Velika veličina podupire ekološku važnost. Asimetrično trošenje podupire moguću lateralizaciju ponašanja. Ali “napredna inteligencija” zaključak je, ne izravno mjerenje fosila. U kontekstu biologije hobotnica to je uvjerljivo, ali ne treba ga učiniti jačim od dokaza.

Što ovo ne dokazuje

- **Ne** čuva cijelo tijelo divovske hobotnice. Rekonstrukcija se uglavnom temelji na čeljustima, a tjelesna veličina zaključuje se iz skaliranja suvremenih perajastih hobotnica.
- **Ne** pokazuje sadržaj želuca ni izravne ostatke plijena. Hranjenje tvrdim plijenom zaključuje se iz trošenja čeljusti, ne iz fosiliziranog obroka.
- **Autorski istraživački članak ne** predlaže da su jele mosasaure, plesiosaure ili bilo koje druge velike morske gmazove. U istraživačkom tekstu te se životinje navode samo kao usporedbe tjelesne veličine i ekološkog položaja.
- **Ne** daje preciznu duljinu tijela. Procjene su rasponi, a najveća tvrdnja gornja je procjena.
- **Ne** mjeri izravno inteligenciju. Lateralizirano trošenje čeljusti tumači se kao moguća lateralizacija ponašanja, koja može upućivati na složeno ponašanje; to je nekoliko koraka zaključivanja udaljeno od znanja o tome što je životinja mogla činiti.
- **Ne** znači da su sve rane hobotnice bile divovske. Tvrdnja se odnosi na ove vrste *Nanaimoteuthis*, osobito *N. haggarti*, ne na svaku ranu lozu hobotnica.

Koliko su dokazi jaki?

Za postojanje vrlo velikih krednih čeljusti iz linije hobotnica dokazi su jaki: rad prikazuje opisane primjerke, digitalne modele, stratigrafski kontekst te usporedbe s čeljustima suvremenih i fosilnih glavonožaca.

Za hranjenje tvrdim plijenom dokazi su također razumno jaki. Obrasci trošenja detaljni su — okrhline, ogrebotine, uglačanost, pukotine, asimetričan gubitak — a autori ulažu trud u isključivanje oštećenja pri preparaciji i abrazije tijekom transporta. Usporedba sa suvremenim durofagnim glavonošcima razuman je most.

Za točnu tjelesnu veličinu i status vršnog predatora povjerenje treba biti umjerenije. Procjene veličine ovise o alometrijskom skaliranju iz živih dugotijelnih perajastih hobotnica. Ekološka uloga zaključuje se iz kombinacije procijenjene veličine i durofagnog mesožderstva, nije izravno opažena. Argument je koherentan, ali riječ je o ekološkoj rekonstrukciji, ne izravnom popisu hranidbene mreže.

Zašto je važno

Ovaj je rad dobar primjer kako paleontologija iz djelomičnih dokaza izvodi snažne tvrdnje bez čarolije. Čeljust je predmet. Trošenje je trag ponašanja. Krivulja skaliranja most je od tvrdog fosila do mekog tijela. Svaki korak dodaje snagu i svaki korak dodaje nesigurnost. To je pouka koju vrijedi sačuvati.

Ispravlja i poznatu sliku. Kredne oceane obično zamišljamo kao svijet velikih kralježnjačkih predatora i manjeg plijena sa školjkama. Ti fosili sugeriraju da neki mekotijelni beskralježnjaci nisu samo živjeli ispod te hranidbene mreže. Možda su se natjecali na njezinim najvišim razinama.

Rezultat je iznimno slikovit, ali čista priča nije “kraken je bio stvaran”. Ona glasi da su velike rane perajaste hobotnice ostavile čeljusti iz kojih su istraživači rekonstruirali divovska tijela i ponavljano hranjenje tvrdim plijenom — kombinaciju koja daje ozbiljan, ali i dalje inferencijski argument za beskralježnjačke vršne predatore u doba morskih gmazova.

Sažetak bez prenaglašavanja

Istraživači su ponovno proučili kredne fosilne čeljusti glavonožaca iz Japana i s otoka Vancouver te tomografijom brušenjem u punoj boji uz zero-shot AI segmentaciju digitalno rekonstruirali skrivene čeljusti iz japanskih stijena kao detaljne 3D primjerke. Više fosilnih svojti reorganizirali su u dvije vrste **Nanaimoteuthis**, koje ovdje tumače kao rane perajaste hobotnice. Fosili produljuju zapis perajastih hobotnica na približno **100 milijuna godina**. Skaliranjem iz veličine čeljusti autori procjenjuju ukupne duljine od približno **2.8–7.7 m** za **N. jeletzkyi** i **6.6–18.6 m** za **N. haggarti**. Snažno trošenje čeljusti — okrhline, ogrebotine, uglaćanost, pukotine i asimetričan gubitak rubova — upućuje na ponavljano drobljenje tvrdog plijena i možda lateralizirano ponašanje. Golema procijenjena veličina uz durofagno mesožderstvo podupire tumačenje da su te hobotnice možda zauzimale najvišu razinu morskih hranidbenih mreža. Dokazi ne uključuju cijela tijela, točne duljine, identificirani plijen ni izravna mjerenja inteligencije. Autorski istraživački članak ne predlaže predaciju na velikim morskim gmazovima.

Provjera bez uljepšavanja

Što rad pokazuje: Velike kredne čeljusti iz linije hobotnica, revidirane kao dvije vrste *Nanaimoteuthis* i smještene među perajaste hobotnice; stariji zapis *Cirrata*; procjene tjelesne veličine od nekoliko metara i možda do 18.6 m; snažno trošenje čeljusti odraslih u skladu s hranjenjem tvrdim plijenom; asimetrično trošenje u skladu s mogućom lateralizacijom ponašanja.

Što je moguće, ali nije dokazano: Da je *N. haggarti* bio među najvećim poznatim beskralježnjacima; da su te životinje doista zauzimale uloge vršnih predatora; da asimetrično trošenje odražava lateralizaciju ponašanja i naprednu kogniciju.

Što ne pokazuje: Fosile cijelog tijela; izravan plijen ili sadržaj želuca; točne duljine tijela; predaciju

na velikim morskim gmazovima; izravan dokaz inteligencije; da su sve rane hobotnice bile divovske.

Glavna ograničenja: Tjelesna veličina zaključuje se višekoračnim modelom skaliranja od čeljusti preko plašta do ukupne duljine; status vršnog predatora zaključuje se iz procijenjene veličine i durofagnog mesožderstva; ponašanje iz asimetričnog trošenja; fosili čuvaju čeljusti, ne cijele životinje ni izravan plijen.

Koliko povjerenja treba imati opći čitatelj? Visoko da ti fosili uključuju vrlo velike čeljusti ranih perajastih hobotnica sa snažnim dokazima trošenja. Srednje da su najveće životinje dosežale gornji kraj procjene od 6.6–18.6 m. Srednje da su bile pravi vršni predatori, a ne samo vrlo veliki mesožderi tvrdog plijena. Nisko da možemo reći mnogo određenog o njihovoj inteligenciji. Primjeren stav: spektakularna fosilna priča, ali izgrađena iz čeljusti i zaključivanja, ne iz potpunog morskog čudovišta.

Ažuriranja nakon objave

- **Ispravak · 2026-07-26**

Nakon povratne informacije dopisnog autora Yasuhiroa Ibe izričito smo naveli da autorski istraživački članak velike morske gmazove koristi kao usporedbe, a ne kao plijen, te razjasnili razliku između autorskog istraživačkog članka i zasebnog Editor's Summaryja u Scienceu u pogledu pripisivanja plijena. Proširili smo i opis digitalnog traženja fosila te dokaza za ulogu vršnog predatora i provjerili cijeli paket dopunskih materijala.

Izvori

Science 392, 406–410 (2026)

<https://doi.org/10.1126/science.aea6285>

Supplementary methods, text, figures S1–S6, and references

https://www.science.org/doi/suppl/10.1126/science.aea6285/suppl_file/science.aea6285_sm.pdf

Supplementary tables S1–S6

https://www.science.org/doi/suppl/10.1126/science.aea6285/suppl_file/science.aea6285_tables_s1_to_s6.zip

MDAR reproducibility checklist

https://www.science.org/doi/suppl/10.1126/science.aea6285/suppl_file/science.aea6285_mdar_reproducibility_checklist.pdf

Fossil lower jaws dataset — Figshare

<https://doi.org/10.6084/m9.figshare.27933759>

Tomographic animations — Figshare

<https://doi.org/10.6084/m9.figshare.27935904>

CPU-enabled AI segmentation code — Zenodo

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15176344>