



The CLEAN PAPER

WHAT THE PAPER SAYS · WHAT IT DOESN'T · WHY IT MATTERS

Vékony, félig olvadt első kéreg: egy modell, amelyben a hadeikumot a becsapódások, nem a belső hő uralta

A Föld első eonja, a hadeikum szinte semmilyen kőzetes nyilvántartást nem hagyott hátra. Ez a modellezési tanulmány azt kérdezi, milyen lehetett a kéreg, ha nem hagyjuk figyelmen kívül a becsapódásokat. Egy sztochasztikus, időben csökkenő becsapódási fluxusmodellt és benchmarkolt kéreg- és köpenyhőáramlási szimulációkat használva a szerzők azt találják, hogy a becsapódási hő a hadeikum nagy részében legalább egy nagyságrenddel meghaladhatta a Föld teljes belső hőtermelését, vékony (<~5 km) kérget hagyva, amely már néhány kilométer mélységben részlegesen olvadt — a szerzők szerint túl gyenge a lemeztektonikához, és hajlamos arra, hogy visszaforgassa önmagát a köpenybe, ami magyarázhatja, miért maradt fenn olyan kevés hadeikumi anyag. Ahogy a becsapódások ~3,9 Ga után gyengültek, tartós kontinentális kéreg alakulhatott ki, éppen akkor, amikor a legidősebb fennmaradt felzikus kőzetek megjelennek — a szerzők óvatos szavaival „valószínűleg nem véletlenül”. Mivel szándékosan konzervatív, alsó korlátot jelentő fűtést használtak, a minőségi eredmény robusztusabb, mint a pontos számok. Erős, koherens modell a Föld gyermekkoráról — nem közvetlen megfigyelése annak.

Written by Lucio Vaglio · Cross-checked by Laura Nesso · Edited by Michele Renda · Figures by Laura Nesso and Nova Vela · AI-assisted, human-reviewed

Paper: *Impact heating and the hidden Hadean*, Tim E. Johnson, Craig O'Neill, Simon Turner, Christopher L. Kirkland, Science (2026), 392:1408–1412 · DOI: [10.1126/science.aeb5402](https://doi.org/10.1126/science.aeb5402)

A földtörténet fejezete, amelyből szinte egyetlen oldal sem maradt meg

A Föld az egyetlen ismert bolygó, amelynek kontinensei vannak — felhajtóerejű, szilícium-dioxidban gazdag szárazföldek, amelyeken élünk. Mégis a kontinensek legelső kialakulása a geológia egyik legrégebbi megoldatlan kérdése, méghozzá kegyetlen okból: a bizonyíték szinte teljesen eltűnt.


A Föld első eonja, a hadeikum a bolygó születésétől nagyjából 4,03 milliárd évvel ezelőttig (Ga) tartott. Ebből az első félmilliárd évből szinte semmi sem maradt fenn. A legidősebb ép, felzikus (kontinentális típusú) kőzetek körülbelül 4,03 Ga évesek. Néhány ritka bazaltos kőzet ~4,2 Ga-ig nyúlik vissza. A legidősebb ismert anyagok elszórtan fennmaradt cirkonkristályok — leghíresebben Nyugat-Ausztrália Jack Hills térségéből —, amelyek kora 4,4 Ga. Ez a Föld gyermekkorának szinte teljes archívuma: néhány lelőhely és homokszem méretű ásványok.

Ez a tanulmány nem ad új kőzetet ehhez az archívumhoz. Valami mást tesz: fizikai modellt épít arról, hogyan nézhetett ki a hadeikumi kéreg az adott fizikai feltételek mellett, és feltesz egy kérdést, amelyet a korai Föld legtöbb modellje kihagy. Mi történik, ha nem hagyjuk többé figyelmen kívül azt, hogy a fiatal Földet folyamatosan becsapódások bombázták?

A szerzők válasza feltűnő. A hadeikum nagy részében a becsapódások által bevitt hő elnyomhatta a Föld teljes belső hőtermelését, vékony és részben olvadt kéregt hagyva maga után — a szerzők szerint túl gyengét bármihez, ami a modern lemeztektonikához hasonlít. Ez modell, nem emlék. De olyan modell, amely végre megpróbál számot vetni azzal az erőszakos környezettel, amelyről beszél.

A model of the Hadean, not a memory of it

The logic is thermal: impacts heat, crust melts, the archive erases itself.



A modell energiamérlegét a becsapódási hő uralja; a vékony, sekélyen olvadt kéreg önmagát újrahasznosítja;

tartós kontinentális kéreg csak a 4,0–3,9 Ga átmenet körül jelenik meg. Ez a hadeikum modellje, nem közvetlen emléke.

The Clean Paper CC BY 4.0

Mit csináltak a szerzők

A csapat három olyan összetevőt kapcsolt össze, amelyeket általában külön kezelnek.

Először egy **sztochasztikus becsapódási fluxusmodellt** — az aszteroidák és nagyobb égitestek hadeikumon és korai archaikumon át tartó becsapódási „esőjét” a belső Naprendszerben. Lényeges, hogy ez nem a régi, egyetlen „késői nagy bombázási” csúcs elképzelése. A fluxus korán erős, majd **idővel csökken**, a nagy becsapódások pedig véletlenszerűen, sztochasztikusan érkeznek, nem menetrend szerint. A modellt holdi és belső-naprendszeri becsapódási statisztikákból skálázták át, és úgy választották meg, hogy összhangban legyen a cirkonkor-eloszlásokkal és a rendelkezésre álló paleomágneses bizonyítékokkal.

Másodszor **geodinamikai szimulációkat** használtak arra, hogyan terjed a hő a kéregben és a felső köpenyben. Egy benchmarkolt lattice-Boltzmann kódot (Planet_LB) futtattak, egyszerű 1D hőmérséklet–mélység számításokkal és a köpeny 4,1 Ga kori teljes 2D konvekciós pillanatképeivel. Ezek tartalmazzák a szokásos belső hőforrásokat — radioaktív bomlást és a magból érkező hőt —, valamint egy fontos összetevőt: a **magmás advekciót**, vagyis a felfelé emelkedő olvadék által szállított hőt, amelyet a legtöbb kéregtermikus modell kihagy.

Harmadszor **fázisegyensúly-modellezéssel** vizsgáltak egy valóságghú korai kérget — a Nuvvuagittuq zöldkőövből származó hidratált hadeikumi metabazaltot —, hogy meghatározzák, milyen hőmérsékleten és mélységben kezdhetett az ilyen kőzet olvadni.

Egy módszertani döntés az egész tanulmány értelmezését befolyásolja: a szerzők szándékosan saját következtetésük *ellen* torzították a feltételeket. „Nem-kondritos” köpenyt feltételeztek, amely kevesebb hőtermelő radioaktív anyagot tartalmaz, mint a kondritos referencia, így belső hőtermelése a standard modell felénél is kisebb; konzervatív fűtési rátákat használtak, és figyelmen kívül hagyták a fiatal, közeli Hold árapályfűtését. Emiatt a számított kéreg-hőmérsékletek **minimumok**, alsó korlátok. Ha valami, a valódi hadeikumi Föld melegebb lehetett a modellenél.

Mit találtak

A hadeikumi energiamérleget a becsapódások, nem a belső hő uralta. A becsapódási hőt időben integrálva az a hadeikum nagy részében legalább egy nagyságrenddel meghaladja a belső hozzájárulást. Ebben a képben a korai tektonizmus fő hajtóereje a becsapódási hő, nem a radioaktív bomlás, és csak körülbelül **3,9 Ga** után válik másodlagossá.

Ez a hő vékonyan és sekélyen olvadtan tartotta a kérget. Becsapódások és olvadék-advekció nélkül

a modell szerint a hadeikumi kéreg csak nagyjából 10–15 km alatt részlegesen olvadt. A becsapódási hő hozzáadásával az olvadási zóna drámaian feljebb kerül: a kéreg már **néhány kilométeres mélységben** (körülbelül 2–5 km alatt) részben olvadt. Mintegy 5 km mélyen a modellek több mint 30% olvadékot jósolnak — ilyen állapotban a kőzet túl gyenge ahhoz, hogy merev lemezként viselkedjen. 5–10 km között a ~1000–1100 °C-os hőmérséklet azt jelenti, hogy a kéreg összetételétől szinte függetlenül nagymértékben olvadt. A megmaradó szilárd kéreg **vékony, 5 km-nél kisebb** lehetett.

A félig olvadt kéreg eltörli önmagát. A kiterjedt olvadás lehetővé teszi, hogy a sűrű, vasban és magnéziumban gazdag anyag lesüllyedjen és elkülönüljön, miközben a könnyebb, szilícium-dioxidban gazdag olvadékok felemelkednek. Idővel ez a kéreg átlagos összetételét fejlettebb, szilícium-dioxidban gazdagabb irányba tolja — és olyan felzikus olvadékot hoz létre, amelyből cirkon kristályosodhat. A vékony kéreg szinte egésze ezután visszaforgott volna a konvektáló köpenybe, ami összhangban áll a kémiai, izotópos nyilvántartással. Ebben a modellben a hadeikumi kőzetek majdnem teljes hiánya nem egyszerű hézag az adatokban — hanem *előrejelzés*. A 4,2 Ga éves kőzetek és a 4,4 Ga éves cirkonok annak a kéregnek ritka túlélői, amely nagyrészt olyan gyorsan pusztult el, ahogy létrejött.

A bombázás hanyatlása egybeesik az első tartós kontinensekkel. Ahogy a becsapódási fluxus a 4,0–3,9 Ga átmenetben csökkent, a kéreg végre megvastagodhatott és fennmaradhatott. A legidősebb fennmaradt kontinentális kőzetek nagyjából ugyanebben az időszakban jelennek meg. A szerzők óvatosan fogalmaznak: hogy a tartós kontinentális kéreg ekkor jelent meg, „valószínűleg nem véletlen”.

Fő következtetésük: ilyen feltételek mellett — néhány kilométeres mélységben már olvadt, vékony kéreggel — a **hadeikumi lemeztektonika valószínűtlen**.

Azt is megmutatják, miért jutottak korábbi munkák ellentétes eredményre. A sztochasztikus becsapódásokat vizsgáló előző tanulmányok csak kis hatást találtak, egyszerre a kéreg kevesebb mint 2,5%-át olvadtnak becsülve. Ezek azonban két olyan tényezőt hagytak ki, amely itt szerepel: a nagy becsapódások globális hatását a mély köpeny olvadására, illetve ennek a hőnek a felfelé szállítását az emelkedő magma révén. Ha ezeket visszatesszük, a termikus kép gyökeresen megváltozik.

Miért nem emlékszel egy modellre?

A fentiek mind szimulációk eredményei, nem hadeikumi kőzetekből kiolvasott mérések — mert ilyen kőzetek szinte egyáltalán nem maradtak fenn. Ez nem teszi gyengévé az eredményt, de meghatározza, milyen típusú eredményről van szó.

A lánc így fut: a becsapódási fluxus *modellje* táplálja a köpeny- és kéreg-hőáramlás *modelljét*, amelyet egy adott kőzet olvadásának *modelljével* vetnek össze. Minden láncszem fizikailag indokolt és ahol lehet, benchmarkolt — de az egész egy koherens érv arról, hogyan *kellett* kinéznie a hadeikumnak valószínű fizika mellett, nem mérés arról, hogyan *nézett ki ténylegesen*.

Ezért fontosak a szerzők konzervatív feltételezései. Mivel alsó korlátot jelentő fűtést választottak, és

még így is széles körben olvadt sekély kérget kaptak, a minőségi következtetés — hogy a hadeikumi kéreg forró és gyenge volt — viszonylag robusztus a választásokkal szemben. Ami viszont nincs precízen rögzítve: az exact geotermikus gradiens, az olvadákhányad és a kéregvastagság. Az eredmény irányát érdemes erősnek, a tizedesjegyeket ideiglenesnek tekinteni.

Mit *nem* bizonyít

- **Nem** figyeli meg közvetlenül a hadeikumi kérget. E korszakból szinte nincs kőzet; ez modellezési eredmény arról, mit követel a fizika, nem mérés.
- **Nem** egy „késői nagy bombázásra” épül. A használt becsapódási fluxus csökkenő és sztochasztikus — a modellnek nincs szüksége hirtelen bombázási csúcsra, és nem is használ ilyet.
- **Nem** zárja le a lemeztektonikai vitát. A „valószínűtlen” itt erős, fizikailag megalapozott következtetés egy forró, stagnáló vagy „puha” fedelű korai Föld mellett — de a hadeikum tektonikai módja továbbra is valódi vita tárgya.
- **Nem** bizonyítja, hogy a becsapódások *okozták* a kontinensek megjelenését a 4,0–3,9 Ga átmenet körül. Az időbeli egyezés erős kapcsolat, amelyet a szerzők „valószínűleg nem véletlennek” neveznek — ez óvatos nyelv egy meggyőző korrelációra, nem bizonyított ok-okozatra.
- A Jack Hills cirkonjai **nem** fennmaradt kontinensek. Ritka túlélő szemcsék, amelyek azt mutatják, hogy korán létezett felzikus anyag és víz; a modell lényege éppen az, hogy az őket létrehozó kéreg nagy része visszaforgott.
- **Nem** rekonstruálja a korai Föld teljes történetét. A szimulációk idealizáltak — 1D profilok és 2D egyenlítői metszetek, az egyenlítő közelére korlátozott becsapódásokkal, időbeli pillanatképekként —, nem a bolygó teljes négydimenziós modelljei.

Mennyire erős a bizonyíték?

A központi állításhoz — hogy a becsapódási hő elsőrendűen szabályozta a hadeikumi kérget, vékonyan és sekélyen olvadtan tartva azt — az érvelés koherens és fontos értelemben konzervatív. Benchmarkolt geodinamikai kódot, fizikailag ésszerű bemeneteket és alsó korlátot jelentő feltételezéseket használ, miközben integrál egy olyan hőforrást, amelyet a korábbi modellek többsége egyszerűen kihagyott. Hitelességét növeli, hogy egyszerre magyaráz két makacs tény: miért nem maradt fenn szinte semmilyen ~4 Ga-nál idősebb kőzet (közel teljes újrahasznosítás), és miért éppen a bombázás csökkenésekor jelenik meg tartós kéreg.



Jack Hills, Nyugat-Ausztrália, a NASA ASTER műszerének felvételén. Az innen származó cirkonok között vannak a Föld korai kérgének legidősebb ismert fennmaradt anyagai — apró nyomok egy olyan eonból, amelynek kőzetei szinte teljesen eltűntek.

NASA/GSFC/METI/ERSDAC/JAROS, and U.S./Japan ASTER Science Team fair-use

A korlátok ugyanolyan világosak, és minden ilyen mélyidő-modell korlátai: modellek épülnek modellekre, nagyon szegényes kőzetes nyilvántartáshoz rögzítve, és a leginkább idézhető következtetés — „a lemeztektonika valószínűtlen” — következtetés, nem megfigyelés. Helyesebb erős, jól megindokolt hipotézisként kezelni, amely új keretbe helyezi a hadeikumot, és amelynek feltételezéseit — különösen a becsapódási fluxus választását — mások most tesztelhetik, nem pedig lezárt ügyként.

A leghasznosabb összefoglalás sem az, hogy „ilyen volt a hadeikum”, sem az, hogy „ez csak szimuláció”. Inkább ez: valószínű, konzervatív fizika mellett egy erősen bombázott korai Föld kérge vékony, félig olvadt és önmagát újrahasznosító lett volna — és ez az egyetlen gondolat meglepően sokat megmagyaráz abból a kevésből, amit ténylegesen látunk.

Miért fontos

A korai Föld népszerű képe két véglet között ingadozik: egy nyugodt, lemeztektonikus vízvilág, amely majdnem olyan, mint a mai, vagy egy pokoli lávabolygó. Ez a munka konkrét, fizikailag motivált köztes képet rajzol: néhány kilométer mélységtől újra és újra megolvadó vékony kérget, amely folyamatosan elpusztul és újjáépül, miközben a feltételeket elsősorban a becsapódások, nem a belső hő szabják meg.

Ez az új keret valódi magyarázó munkát végez. Egyetlen mechanizmust kínál a Föld gyermekkorának két nagy tényére — a kőzetes nyilvántartás majdnem teljes hiányára és az első tartós kontinensek időzítésére —, miközben a történet középpontjába egy gyakran elhanyagolt folyamatot, a becsapódási fűtést helyezi. Ha megállja a helyét, megváltoztatja, hogyan gondolkodunk arról, mikor vált a Föld egyáltalán stabil kontinensekkel rendelkező bolygóvá, és következményei más sziklás világokra is átvihetők, amelyek saját bombázási korszakukban alakultak ki.

Ehhez nem kell, hogy a modell legyen az utolsó szó. Elég jó hipotézisnek kell lennie ahhoz, hogy tesztelni lehessen — és a fennmaradt cirkon- és izotópos nyilvántartáshoz kötve az. A cím „rejtett hadeikum” pontosan erről szól: egy korszakról, amelyhez többnyire csak modellezéssel férhetünk hozzá, mert maga a korszak törölte el saját bizonyítékait.

Röviden

A Föld első eonja, a hadeikum (~4,03 Ga előtt) szinte semmilyen kőzetes nyilvántartást nem hagyott hátra. Ez a modellezési tanulmány azt kérdezi, milyen lehetett a kéreg, ha figyelembe vesszük egy rendszerint kihagyott hőforrást: a becsapódásokat. Egy sztochasztikus, időben csökkenő becsapódási fluxusmodellt benchmarkolt 1D és 2D kéreg- és köpenyhőáramlási szimulációkkal összekapcsolva — beleértve az emelkedő olvadék által szállított hőt — a szerzők azt találják, hogy az időben összegzett becsapódási hő a hadeikum nagy részében legalább egy nagyságrenddel meghaladhatta a Föld teljes belső hőtermelését. Ennek következménye egy vékony (<~5 km) kéreg, amely már néhány kilométerrel a felszín alatt részlegesen olvadt, ~5 km mélységben pedig több mint 30%-ban olvadékból állt — túl gyenge a lemeztektonika fenntartásához, amelyet a szerzők a hadeikumban valószínűtlennek neveznek. Az ilyen kéreg nagyrészt visszaforgott volna a köpenybe, ami magyarázhatja a hadeikumi anyag ritkaságát; ahogy a becsapódások a 4,0–3,9 Ga átmenetben csökkentek, tartós kontinentális kéreg jelenhetett meg, nagyjából akkor, amikor a legidősebb fennmaradt felzikus kőzetek is — a szerzők szerint „valószínűleg nem véletlenül”. Mivel szándékosan konzervatív, alsó korlátot jelentő fűtést használtak, a minőségi eredmény robusztusabb, mint a pontos számok. Ez erős, koherens modell a Föld gyermekkoráról — nem közvetlen megfigyelése annak.

Tárgyilagos mérleg

Mit mutat a tanulmány: Fizikailag megalapozott, becsapódási fűtést és magmás hőszállítást is tartalmazó szimulációkban a hadeikumi kéreg vékony, néhány kilométer mélységtől részben olvadt, energiamérlegét a becsapódások uralják a belső hő helyett, nagyrészt visszaforgódik a köpenybe, és – ebben a modellben – nem képes lemeztektonikát fenntartani.

Mi hihető, de nincs bizonyítva: Hogy a becsapódások hanyatlása az oka a tartós kontinensek ~3,9 Ga körüli megjelenésének; hogy a hadeikumi Föld stagnáló vagy „puha fedelű” világ volt, nem korai lemeztektonikus; hogy szinte kizárólag az olvadt kéreg újrahasznosítása miatt nem maradt fenn hadeikumi kőzet.

Mit nem mutat: A hadeikumi kéreg közvetlen mérését; a lemeztektonikai vita lezárt válaszát; bizonyított ok-okozati kapcsolatot a bombázás hanyatlása és az első kontinensek között; azt, hogy a Jack Hills cirkonjai fennmaradt kontinensek; vagy a korai bolygó teljes modelljét.

Fő korlátok: A hadeikumi kőzetes nyilvántartás szinte nem létezik, így az eredmény nagyon kevés adathoz kötött modell; modelleket rétegez egymásra (becsapódási fluxus → geodinamika → fázis-egyensúly); maga a becsapódási fluxus is reprezentatív, bizonytalan választás; a szimulációk idealizáltak (1D és 2D egyenlítői metszetek, időbeli pillanatképek). A konzervatív alsókorlát-feltételezések erősítik a minőségi következtetést, de nem teszik pontossá a konkrét geotermikus profilokat.

Mennyire bízhat benne egy általános olvasó? Nagy bizalommal abban, hogy valószínű fizika mellett egy erősen bombázott korai Föld kérge forró, vékony és sekélyen olvadt lehetett. Közepes bizalommal abban, hogy ez valószínűtlenné teszi a hadeikumi lemeztektonikát és magyarázza a hiányzó kőzetes nyilvántartást. Alacsony bizalommal minden olyan állításban, hogy ez *bizonyítja* a kontinensek kialakulásának módját vagy pontos idejét – erős, konzervatív modelltől van szó, amely új keretbe helyezi a hadeikumot, nem közvetlen bepillantásról.

Források

Johnson, O'Neill, Turner & Kirkland, Science 392:1408-1412 (2026)
<https://doi.org/10.1126/science.aeb5402>