




The CLEAN PAPER

WHAT THE PAPER SAYS · WHAT IT DOESN'T · WHY IT MATTERS

Halastjarna frá annarri stjörnu — og fingrafarið í vatninu hennar

ALMA mælingar setja neðri mörk á hlutfall deuteríums og vetnis í vatni millistjörnuhalastjörnunnar 3I/ATLAS og benda til mun meiri deuteríumauðgi en í höfum jarðar eða dæmigerðum halastjörnum sólkerfisins. HDO greindist en venjulegt H₂O ekki beint, þannig að D/H-gildið er líknanháð neðri mörk. Niðurstaðan segir frá köldum myndunarskilyrðum, ekki lífi eða tækni.

Written by Lucio Vaglio · Cross-checked by Laura Nesso · Edited by Michele Renda · Figures by Laura Nesso and Nova Vela · AI-assisted, human-reviewed

Paper: *Water D/H in 3I/ATLAS as a Probe of Formation Conditions in Another Planetary System*, L. E. Salazar Manzano, T. Paneque-Carreño et al., *Nature Astronomy* (2026) · DOI: 10.1038/s41550-026-02850-5



DV-59-loftnetið í forgrunni og fleiri ALMA-lofnet að fylgjast með tunglupplýstum næturhimni. Mynd: Alex Pérez / ALMA Observatory.

Alex Pérez / ALMA Observatory CC BY 4.0

Halastjarna frá annarri stjörnu — og fingrafarið í vatninu hennar

Öðru hverju fer eitthvað í gegnum sólkerfið sem hefur aldrei tilheyrt því. Ekki flökkusteinn úr smá-stirnabeltinu og ekki halastjarna á löngum sporbrautarsveig úr Oortskýinu, heldur fyrirbæri á opinni, ofurbólubraut — það kom úr millistjörnurýminu, fer eina ferð um sólina og hverfur síðan aftur út. Við höfum nú séð þrjú slík fyrirbæri. Fyrsta var ‘Oumuamua árið 2017 og var næstum horfið áður en menn voru sammála um hvað það væri. Annað var 2I/Borisov árið 2019, greinilega halastjarna. Þriðja, sem fannst í júlí 2025, er 3I/ATLAS — og hún kom með nógu virkt hjúp- og gufuský til að gera raunverulega efnafræði mögulega.

Það mikilvægasta er einfalt. Millistjörnuhalastjarna er bókstaflega brot úr öðru plánetukerfi: ís og ryk sem þéttist við aðra stjörnu, var líklega kastað út fyrir löngu með þyngdarkrafti, reikaði um Vetrarbrautina og fór svo nógu nærri sólinni okkar til að ísinn tók að gufa upp þar sem sjónaukarnir okkar gátu fylgst með. Það er í sjálfu sér merkilega staðreynd og þarf enga hjálp frá æsingi.

Hún fær þó oft slíka hjálp. Millistjörnu fyrirbæri draga að sér ákveðna tegund fyrirsagna — dauf ljós,

dramatík og „en hvað ef einhver byggði þetta?“ — og 3I/ATLAS fékk sinn skerf. Hreina svarið er hið leiðinlega og um leið áhugaverðara: þetta er halastjarna. Raunverulega spurningin var aldrei hvort einhver smíðaði hana. Hún var rólegri: ef hægt væri að lesa efnafræði efnis sem myndaðist við aðra stjörnu, hvað myndi það segja um fjölskyldu þeirrar stjörnu? Og hvernig væri hægt að lesa það?

Lestrartækið hér er **vatn**. Vatn er tvö vetnisatóm og eitt súrefnisatóm, en lítið brot vetnisins er **deuteríum** — þyngri samsæta vetnis með einni aukaniðfæðing. Hlutfall þungs vetnis og venjulegs vetnis í vatni, skrifað **D/H**, er ekki tilviljanakennt. Efnafræðin setur það að miklu leyti eftir því hversu kalt var þar sem vatnið myndaðist: því kaldara og kyrrara sem umhverfið er, þeim mun meira deuteríum festist í vatninu. Halastjarna er í raun djúpfrystir sem getur varðveitt ís í milljarða ára. D/H-hlutfall vatnsins getur því varðveitt fingrafar af aðstæðunum sem vatnið varð til við.

Við þekkjum fingraför sólkerfisins nokkuð vel: hafvatn jarðar og mismunandi fjölskyldur sólkerfishalastjarna liggja innan tiltölulega þröngs bils. Það sem enginn hafði áður náð að mæla með góðum hætti var sama fingrafarið í vatni sem myndaðist **við aðra stjörnu**. Það er það sem þessi rannsókn reyndi að lesa úr 3I/ATLAS.

Hvað gerðu höfundarnir?

Þeir beindu ALMA — stóru fylkingu útvarpsloftneta í eyðimörk Chile — að 3I/ATLAS **4. nóvember 2025**, sex dögum eftir að halastjarnan fór um sólánáð. Tækið var stillt til að nema dauða millimetrageislun þriggja sameinda í gufuhjúpunum: venjulegs vatns (H_2O), **þungs vatns** (HDO, þar sem eitt vetnisatóm er deuteríum) og metanóls (CH_3OH).

D/H-hlutfallið sem þeir vildu finna er í reynd hlutfall þungs vatns og venjulegs vatns. Því þurfti upplýsingar um hvort tveggja. Litrófin voru síðan sett inn í geislaflutningslíkan af útþenjandi gufuhjúp halastjörnu, kóða sem heitir **SUBLIME**, og aðlöguð með svipaðri tölfræðiaðferð og notuð er til að endurheimta samsetningu lofthjúpa fjarreikistjarna. Úr því fengu þeir mat á hita, útstreymi og framleiðsluhraða sameindanna.

Eitt atriði mótar allt sem kemur á eftir: **þeir greindu ekki venjulega vatnið beint**. HDO og metanól komu fram, en H_2O -línan var undir suðinu. Það þýðir ekki að venjulegt vatn hafi verið lítið — það er miklu meira af því en þungu vatni. Hvort lína sé sýnileg ræðst ekki aðeins af magni sameindarinnar heldur líka af því hversu auðvelt er að sjá viðkomandi línu.

Tvö atriði vinna gegn H_2O hér. Fyrst er lofthjúpur jarðar: sú vatnslína sem ALMA gat miðað við, nálægt **183 GHz**, liggur þar sem vatnsgufa í okkar eigin lofthjúpi gleypir mjög sterkt. Að reyna að mæla vatn halastjörnunnar þar frá jörðu er því líkt og að horfa á kerti í gegnum þoku. Höfundarnir taka fram að þessar lágorkuvatnslínur þjáist af mikilli loftgleypni, en HDO-línan nálægt **241 GHz** liggur í mun hreinni glugga. Í öðru lagi var vatnsrásin miklu hávaðasamari — um **500 mJy á geisla** á móti **21 mJy** fyrir HDO. Milli gleypninnar og suðsins gat hið algenga venjulega vatn verið ósýnilegt, á meðan hið mun sjaldgæfara þunga vatn sást skýrt.

Úr geimnum er þetta auðveldara: JWST fann síðar vatn halastjörnunnar í innrauðu eftir sólánáð. Því segir ógreining ALMA aðeins að **þessi tiltekna H_2O -lína í gegnum lofthjúp jarðar** sást ekki, ekki að

vatn væri fjarverandi.


Magn venjulegs vatns varð því að meta **óbeint**, einkum út frá örvun metanóllínanna. Örvunin ræðst meðal annars af því hversu oft metanólsameindir rekast á vatnssameindir. Þetta er raunveruleg mæling, en niðurstaðan er háð líkani og höfundarnir segja það skýrt.

Hvað fundu þeir?

- **Þungt vatn, en ekki venjulega vatnið.** HDO og nokkrar metanóllínur greindust skýrt; H_2O ekki. Þar sem D/H byggist á **efri mörkum** fyrir framleiðslu venjulegs vatns — meðhöndluð þannig viljandi vegna þess að vatnslínan sjálf var undir suðinu — verður D/H-niðurstaðan **neðri mörk**, ekki eitt nákvæmt gildi.
- **Mikil deuteríumauðgun.** Í varfærna sviðsmyndinni er D/H í vatninu **meira en** 6.6×10^{-3} — rúmlega um **40 sinnum** gildi hafinsins á jörðinni og meira en um **30 sinnum** dæmigert gildi sólkerfishalastjörnu. Með báðum matsaðferðum þeirra situr 3I/ATLAS við hæsta enda allra vatns-D/H-mælinga sem gerðar hafa verið.
- **Líklega ekki tilviljun einnar nætur.** Aðalmælingin er frá einu tímabili, en bráðabirgðaskoðun á nálægum ALMA-gögnum sýnir ekki miklar daglegar sveiflur. Óháð JWST-greining meira en mánuði síðar bendir líka í sömu átt — vatnið er deuteríumríkt.

Where 3I/ATLAS's water sits on the deuterium scale

Water D/H ratio — logarithmic scale



Staða vatns 3I/ATLAS á deuteríumkvarðanum: langt við deuteríumríka endann, fyrir ofan hafvatn jarðar og allan þekktan hóp sólkerfishalastjarna (sýndan hér sem nálgað bil). Örin sýnir **neðri mörk** — raunverulega gildið gæti verið hærra. Hátt D/H segir til um **kaldar myndunaraðstæður**, ekki heimilisfang.

Hvað þýðir þetta líklega?

Hátt D/H í vatni er merki um vatn sem fraus við mjög lágan hita — undir um **30 K** — og var ekki mikið endurunnið síðar með hita. Hreinasta túlkunin er því að vatn 3I/ATLAS hafi myndast við **kaldari og mildari aðstæður** en vatnið í halastjörnum sólkerfisins, og þar með að móðurkerfi hennar hafi byggt ísa sína öðruvísi en okkar kerfi.

Næsta skref þarf þó varúð. Tvær leiðir geta gefið svo deuteríumríkt vatn og þessi mæling greinir ekki á milli þeirra: vatnið gæti hafa **erft** auðgunina frá köldu skýinu sem stjarnan og kerfið fæddust úr, eða D/H gæti hafa orðið svona síðar þegar halastjarnan myndaðist í köldum ytri hluta frumreikistjörnuskífu. Í báðum tilvikum stendur meginniðurstaðan: aðstæðurnar sem mótuðu 3I/ATLAS voru ekki þær sömu og mótuðu okkar halastjörnur. En **af hverju** þær voru svona er enn opið.

Þetta er því fyrsta skiptið sem menn lesa þetta vatnsmyndunarfingrafar úr efni frá öðru plánetukerfi — og fingrafarið passar ekki við okkar.

Hvað sýnir þetta ekki?

- Það segir **ekkert** um líf, tækni eða ásetning. „Millistjarna“ lýsir braut, ekki tilbúnum uppruna. Þetta er mæling á vatnsefnafræði.
- Þetta er **ekki nákvæmt D/H-gildi**. Það eru *neðri mörk*, og venjulega vatnið var ekki greint beint; magn þess var metið út frá örvun metanóls, með þeirri forsendu að vatn sé helsti árekstraraðili metanólsameinda.
- Það segir **ekki hvar 3I/ATLAS fæddist**. Ekki er hægt að finna móðurstjörnuna á áreiðanlegan hátt. Hátt D/H segir til um aðstæður, ekki heimilisfang.
- Það leysir **ekki** af hverju vatnið er deuteríumríkt. Bæði „erft úr köldu fæðingarskýi“ og „myndað í köldum skífu“ passa við gögnin.
- Þetta er **eitt** fyrirbæri, mælt á **einu** aðaltímabili. Stuðningsgögn eru hvetjandi, en þetta er ekki löng tímaröð.

Hversu sterk eru gögnin?

Meta þarf tvö atriði sitt í hvoru lagi: **stefnu niðurstöðunnar** og **nákvæma töluna**.

- **Stefnan er traust**. Að vatn 3I/ATLAS sé verulega deuteríumríkt kemur fram sem varfærin neðri mörk, liggur vel yfir öllum sólkerfishalastjörnum og fær stuðning frá óháðri JWST-greiningu. Sá hluti er ekki viðkvæmur.
- **Talan byggir á líkanakeðju**. Þar sem H_2O greindist ekki er vatnsmagnið — og því D/H — metið óbeint út frá metanólörvun. Það gerir ráð fyrir að vatn sé helsti árekstraraðilinn í gufuhjúpnun, sem er trúverðugt nálægt sólnánd en útilokar ekki framlag CO_2 , og notar árekstrarhraða sem eru aðeins nálgaðir og illa þekktir. Höfundarnir segja það sjálfir og gefa niðurstöðuna viljandi sem

mörk fremur en nákvæma mælingu.

- **Túlkunin er vel studd en ekki einstök.** Kaldar myndunaraðstæður eru eðlileg skýring á háu D/H; óljóst er hvort kuldinn var erfður eða kom seinna og móðurkerfið er óþekkt.

Í stuttu máli: að vatnið hafi myndast kalt er á traustum grunni; **hversu** kalt og **af hverju** er enn opið.

Af hverju skiptir þetta máli?

Í áratugi hefur spurningin um hvaðan vatn jarðar kom og hvað setur deuteríumfingrafar vatns í myndandi plánetukerfum aðeins verið rannsökuð með efni úr okkar eigin sólkerfi. Þetta er fyrsta skiptið sem sú mynd er útvíkkuð með efni sem sannanlega myndaðist við aðra stjörnu.

Svarið er ekki „alls staðar er eins og heima“. Þvert á móti: annað kerfi getur myndað ísa við svo kaldar aðstæður að þeir bera fingrafar sem okkar halastjörnur bera ekki. Þetta er lítið og áþreifanlegt gagn fyrir stærri hugmynd: efnafræði og saga þess fasta efnis sem byggir plánetur getur verið mismunandi frá einni stjörnu til annarrar.

Og það þurfti ekki geimfar yfir ljósár til að komast að þessu. Brotabútur úr öðru kerfi rak fram hjá, og við náðum að lesa vatnið hans áður en hann hvarf aftur.

Í stuttu máli

3I/ATLAS er þriðja þekkta millistjörnu fyrirbærið og önnur virk millistjörnuhalastjarnan — efnisbútur úr öðru plánetukerfi sem fer einu sinni í gegnum okkar. Með ALMA nálægt sólánánd greindu stjörnufræðingar þungt vatn (HDO) og metanól í gufuhjúpunum en ekki venjulegt vatn. Út frá því mátu þeir D/H-hlutfall vatnsins. Það er mjög deuteríumríkt: varfærin neðri mörk eru yfir 6.6×10^{-3} , um 40 sinnum hafvatn jarðar og 30 sinnum dæmigerð sólkerfishalastjarna. Það bendir til vatns sem myndaðist við kaldari og minna hitabreyttar aðstæður en vatn okkar halastjarna. Talan er **neðri mörk úr líkani**, ekki bein H₂O-mæling, og hún getur hvorki sagt hvort auðgunin var erfð úr köldu fæðingarskýi eða myndaðist síðar í köldum skífu né hvaða stjarna var móðurstjarnan. Engu að síður er þetta fyrsta mæling þessa tiltekna efnafræðilega fingrafars í vatni frá öðru stjörnukerfi — og það er ekki eins og okkar.

Raunhæf yfirferð

Hvað sýnir greinin? ALMA-gögn af millistjörnuhalastjörnunni 3I/ATLAS nálægt sólánánd gefa varfærin neðri mörk D/H í vatni, $>6.6 \times 10^{-3}$ — um $40\times$ hafvatn jarðar og $30\times$ dæmigerða sólkerfishalastjörnu. Þetta bendir til vatns sem myndaðist við verulega kaldari og minna hitabreyttar aðstæður en vatn okkar halastjarna. Óháð JWST-greining styður sömu stefnu.

Hvað er trúverðugt en ósannað? Að deuteríumauðgunin hafi annaðhvort verið erfð beint úr köldu frumstjörnskýi eða orðið til þegar halastjarnan myndaðist í köldum ytri hluta frumreikistjörnskífu. Bæði passa; gögnin greina ekki á milli.

Hvað sýnir greinin ekki? Ekkert um líf, tækni eða tilbúinn uppruna; ekki eitt nákvæmt D/H-gildi; ekki móðurstjörnu eða fæðingarstað; ekki sérstaka orsök háa D/H; og ekki að ein mæling sé ónæg fyrir breytingum í gufuhjúpunum.

Helstu takmarkanir: H₂O var ekki greint beint, þannig að vatnsmagníð — og þar með D/H — er metið óbeint úr örvun metanóls með forsendu um að vatn sé helsti árekstraraðilinn og með árekstrarhraða sem höfundarnir sjálfir kalla illa þekkta. Niðurstaðan er líkanaháð neðri mörk frá einu aðaltímabili og móðurkerfið er óþekkt.

Hversu mikið traust ætti almennur lesandi að leggja á niðurstöðuna? Mikið traust á að vatn 3I/ATLAS sé raunverulega deuteríumríkt og hafi myndast kaldara en vatn okkar halastjarna — og að það segi nákvæmlega ekkert um geimverur. Miðlungs traust á nákvæma auðgun, sem er líkanaháð neðri mörk. Lítið traust á sérstaka orsök eða fæðingarstað, sem eru enn opin. Rétt afstaðan er róleg undrun yfir efnafræðilegu póstkorti frá öðru stjörnukerfi — ekki ráðgáta og ekki geimskip.

Heimildir

Nature Astronomy (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41550-026-02850-5>

arXiv 2603.07026

<https://arxiv.org/abs/2603.07026>

Independent JWST corroboration (Cordiner et al., arXiv 2603.06911)

<https://arxiv.org/abs/2603.06911>

ALMA data archive (project 2025.A.00002.T)

<https://almascience.nrao.edu/aq/>