




The CLEAN PAPER

WHAT THE PAPER SAYS · WHAT IT DOESN'T · WHY IT MATTERS

Kaldatómatilraun prófar „tímavanda“ skammtaþyngdarfræðinnar — sem rannsóknarstofuhliðstæðu, ekki svar

Í kanónískri skammtaþyngdarfræði hefur Wheeler–DeWitt-jafnan enga ytri klukku sem raðar atburðum: svokallaðan tímavanda. Tilraun eins höfundar einangrar Bose–Einstein-þéttivatn, skip-tir því með þunnri ljóshindrun í ómældan og mældan geira og byggir innri klukku úr óreiðunni sem flæðir á milli þeirra. Sá „óreiðutími“ raðar útpenslu og samdrætti mælda geirans og virk jafna endurskapar mæld gögn í lághindrunartilfellinu. Þetta er stýrður prófunarvettvangur fyrir hugmyndir um afstæðan tíma: „miklihvellur“, „miklahrap“ og „smáalheimur“ eru hliðstæðuheiti fyrir fangað gas, ekki raunveruleg heimsfræði, og greinin segist hvorki leysa tímavandann né skammtaþyngdarfræðina.

Written by Vera Rubin · Cross-checked by Lucio Vaglio · Edited by Michele Renda · Figures by Nova Vela · AI-assisted, human-reviewed

Paper: *Testing the problem of time with cold atoms*, Giovanni Barontini, Physical Review Research 8, L022047 (2026) · DOI: 10.1103/1h9j-df4k

Klukka byggð úr óreiðu, inni í gildru

Í kanónískri skammtaþyngdarfræði er sérkennileg og þrálát ráðgáta: í aðaljöfnunni kemur tími ekki fyrir. Wheeler–DeWitt-jafnan, það sem kemst næst Schrödinger-jöfnu fyrir allan alheiminn, segir einfaldlega að ákveðinn virki sem verkar á ástandið gefi núll. Engin ytri breyta tifar áfram, ekkert raðar „áður“ og „eftir“ — samt upplifum við augljóslega að tími líði. Þetta er **tímavandinn** (*problem of time*) og hann hefur staðið óleystur í meira en hálfa öld.

Grein eins höfundar í *Physical Review Research* leysir hann ekki. Hún gerir eitthvað hljóðlátara og á sinn hátt gagnlegra: hún byggir lítið og vel stjórnað rannsóknarstofukerfi þar sem hægt er að **prófa gegn raunverulegum gögnum** einn flokk fyrirhugaðra svara. Giovanni Barontini við University of Birmingham tekur Bose–Einstein-þéttivatn — ský af ofurköldum atómum sem hegðar sér eins og einn skammtahlutur — og gerir úr því hliðstæðu þar sem hægt er að mæla hugmyndina um „innri“, afstæðan tíma í stað þess að rökræða um hana. Bragðið er að byggja klukku ekki úr ytri skeiðklukku heldur úr þeirri óreiðu sem kerfið flytur til innan sjálfs sín.

Fjarlægðin milli „stýrð hliðstæða tímavandans“ og „eðlisfræðingar leystu tímann“ er öll sagan hér — og hún er löng.

Hvað rannsakandinn gerði

Búnaðurinn er þéttivatn úr um **24.000 rúbidíum-87 atómum** sem haldið er í íhaldssamri ljósdípól-gildru og látið sveiflast — allt atómskýið rennur fram og aftur í gildrunni. **Þunn ljóshindrun** — um 8 míkrometrar á breidd, teiknuð með 675 nm ljósi með stafrænu örspeglataeki — skiptir gildrunni í tvo helminga. Annar helmingurinn er mældur („**bjarti geirinn**“); hinn er ekki mældur („**dökki geirinn**“). Á um það bil 100 millisekúndna tímabili tilraunarinnar sést ekkert mælanlegt agnatap eða orkudreifing, þannig að með góðri nálgun er þetta lokað kerfi með Hamilton-virkja sem sjálfur er ekki háður tíma.

[figure_pair pending]

Til vinstri myndar segul-ljósgildran kalt ský rúbidíumatóma inni í glerfrumunni: snemma kælistig á leiðinni að þéttivatninu. Til hægri stendur Giovanni Barontini við ljósbúnaðinn. Þetta eru ljósmyndir af rannsóknarstofukerfinu á bak við tilraunina, ekki myndir af bókstaflegum smækkuðum alheimi.

Séð með venjulegri rannsóknarstofuklukku — gleypnimynd á 2 ms fresti — gerir bjarti geirinn eitthvað sem minnir á heimsfræði. Atóm flæða yfir hindrunina og geirinn vex úr engu (Barontini kallar þetta augnablik „**miklahvell**“), nær mestu umfangi, dregst síðan saman og tæmist aftur yfir í dökka helminginn („**miklahrap**“). Eftir hæð hindrunarinnar getur þetta endurtekið sig lotubundið.

Þá kemur meginatriðið. Rannsóknarstofuklukkan er ytri kerfinu — nákvæmlega sú tegund tíma sem Wheeler–DeWitt-ramminn leyfir ekki. Barontini spyr því: er hægt að **raða sögu bjarta geirans með stærðum sem allar eru innan kerfisins sjálfs**? Svar hans er klukka sem hann kallar **óreiðutíma** (*entropic time*), lesin beint úr sömu myndunum í þremur einföldum skrefum. Fyrst dregur hann úr hverri

gleypnimynd fjórar tölur fyrir bjarta geirann: fjölda atóma, massamiðju þéttiferilsins (sem gegnir hlutverki hliðstæðu „skalarsviðs“), breidd hans og óreiðu — óreiðu á hvert atóm, fengna með staðlaðri aðferð, margfaldaða með fjölda atóma. Í öðru lagi hækkar og lækkar þessi óreiða þegar atóm fara yfir hindrunina. Í þriðja lagi fylgir klukkan óreiðuhallanum meðfram mældri braut massamiðjunnar og telur stærð hverrar færslu frekar en stefnu hennar. Þegar óreiða og massamiðja hækka eða lækka saman heldur hvert skref klukkunni áfram jafnvel þegar skýið snýr við. Í gögnunum gefur þetta eina röðun frá „miklahvelli“ geirans til „miklahraps“ hans nánast alls staðar, með aðeins fáeinum litlum sveiflum þar sem gróf tímaupplausn veldur ósamræmi milli breytinganna tveggja.

Að lokum leiðir hann út virka „**Schrödinger-jöfnu í óreiðutíma**“ — þróunarjöfnu fyrir bjarta geirann skrifaða með þessari innri klukku í stað þeirrar ytri — og leysir hana tölulega til að sjá hvort hún endurskapi það sem myndavélin skráði í raun.

Hvað hann fann

Þrjár niðurstöður, í vaxandi metnaði.

- **Innri klukkan virkar sem röðun.** Óreiðutíminn vex einátt nánast alls staðar og hraði hans ræðst af því hversu hratt óreiða fer yfir hindrunina: hann gengur hraðar þegar óreiða er skipt og **stöðvast alveg þegar engin er skipt**. Í afturkræfa lághindrunarástandinu líður *enginn innri tími* milli miklahraps og næsta miklahvells — því engin óreiða flyst þar — þótt rannsóknarstofuklukkan haldi áfram að ganga. Yfir allt gagnasafnið hélst heildaróreiða beggja geira saman föst innan skekkjumarka, eins og lokað kerfi krefst.
- **Mismunandi ástand gefur mismunandi „tíma“.** Hækkið hindrunina og óreiðuskiptin minnka, þannig að innri klukkan gengur hægar. Þegar hindrunin er svo há að geirarnir tala varla saman nálgast bjarti geirinn það sem greinin kallar „**varmadauða**“: kyrrstöðu þar sem óreiðutíminn stöðvast einfaldlega.
- **Virk jafna endurskapar gögnin.** Schrödinger-jafnan í óreiðutíma, með tilraunabreytunum settum inn, endurskapar tölulega melda þróun á breidd skýsins; greinin greinir frá mjög góðu samræmi í lághindrunartilfellinu (þar sem óreiðudrifið liðurinn ræður), sem er einnig tilfellið sem beinn tölulegur samanburður er sýndur fyrir.

Hvað „tímavandinn“ er — og hvað „óreiðutími“ er hér

Tímavandinn er sá að aðaljafna kanónískrar skammtaþyngdarfræði (Wheeler–DeWitt) hefur enga ytri tímabreytu. Algengt svar er *afstætt*: ein eðlisfræðileg stærð inni í kerfinu er gerð að „klukku“ og öllu öðru lýst miðað við hana. Endurtekið vandamál er að eðlileg klukkuval eru ekki alltaf einátta — í kerfi sem fellur aftur saman gengur möguleg klukka fyrst áfram og síðan afturábak — þannig að hún getur ekki merkt eina skýra stefnu frá upphafi til enda.

Óreiðutími er leið Barontinis fram hjá þessu. Í stað þess að lesa stöðulíka breytu byggir hann klukkuna úr *óreiðunni* sem skiptist milli melda og ómelda geirans, skilgreinda þannig að hún snúi ekki við. Hugmyndin er náskyld eldri hugmyndum um „varmatíma“, en hér er hún

skilgreind aðgerðalega úr mælanlegu óreiðuflæði fremur en úr óhlutbundinni stærðfræði — og einmitt þess vegna má prófa hana á raunverulegum búnaði.

Mikilvægt er að heimsfræðiorðin — „miklihvellur“, „miklahrap“, „skalapáttur“, „skalarsvið“, „smáalheimur“ — eru **hliðstæðuheiti**. Þau nefna eiginleika gass af fönguðum atómum sem eru *byggingarlega líkir* jöfnum einfaldaðra heimsfræðilíkana. Þau eru ekki fullyrðingar um hinn raunverulega alheim.

Hvað þetta sannar ekki

Hér skiptir nákvæmni mestu, því orðaforðinn býður upp á of túlkun.

- **Það leysir ekki tímavandann og segist ekki gera það.** Greinin lýsir sjálf markmiði sínu sem því að „koma á stýrðu tilraunaumhverfi þar sem afstæðar tímabyggingar má prófa magnbundið“. Prófunarvettvangur er ekki setning. Hvort afstæður eða óreiðutími sé *rétt* lýsingin á tíma í skammtaþyngdarfræði stendur jafn opið og áður.
- **Þetta er hliðstæða, ekki alheimurinn.** Engin heimsfræði er verið að fylgjast með. Fylgst er með Bose–Einstein-þéttivatni í gildru og smækkuð lýsing þess er *stærðfræðilega lík* einfalduðu („minisuperspace“) heimsfræðilíkani. Líkindin eru tilgangur tilraunarinnar; þau eru líka mörk hennar. Ekkert hér sýnir að snemma alheimurinn hafi haft slíkan miklahvell, að tímarúm sé gert úr atómum eða að „tími sé ekki til“.
- **Það sýnir ekki að tími sé „í raun“ óreiða.** Óreiðuklukkan er ein smíðuð röðun sem virkar vel í þessu kerfi. Greinin bendir á hugmyndaleg skyldleika við varmatímatilgátuna en skilur beinlínis eftir opið hvort þessar tvær hugmyndir falli jafnvel saman. „Innri klukka byggð úr óreiðu getur raðað þessari tilraun“ er miklu þrengri fullyrðing en „tími er óreiða“.
- **Virka jafnan er líkananiðurstaða, ekki endurritun skammtafræðinnar.** Afleidda Schrödinger-jafnan í óreiðutíma fellur að venjulegri skammtafræði þegar óreiðuflæðið er hægt og er stranglega venjuleg einingafræði aðeins þegar engin óreiða flæðir. Greinin setur hana fram sem almennari en stöðluðu jöfnuna *sérstaklega þegar mælt undirkerfi er varmafræðilega opið gagnvart ómældu undirkerfi* — fullyrðingu um opin undirkerfi í þessari tegund uppsetningar, ekki að grunnlögmál eðlisfræðinnar þurfi að endurskrifa á þennan hátt.
- **Þetta er ein tilraun, einn höfundur og eitt klukkual.** Niðurstöðurnar hafa um 5% tölfræðilega óvissu á hvern punkt og byggja á meðalsviðsnálgun og meðaltalsþéttni. Val klukkunnar og grófun gagna eru meðvitaðar líkanákvarðanir sem aðrir hópar munu vilja kanna áður en dregnar eru stærri byggingarlegar ályktanir.

Hversu sterk eru gögnin?

Fyrir þá hóflegu fullyrðingu sem greinin setur í raun fram eru gögnin skýr. Kerfið er sannarlega vel einangrað á viðkomandi tímakvarða, óreiðujafnvægið stenst (heildaróreiða stöðug innan skekkju-

marka), innri klukkan raðar gögnunum einátt nánast alls staðar og virk jafna, leidd út af höfundinum úr sama líkani með breytum metnum úr gögnunum, endurskapar mælda hreyfingu í lághindrunar-tilfellinu þar sem hún var prófuð. Gögnin eru opin. Þetta er raunveruleg mæling á raunverulegu, stjórnanlegu kerfi, ekki hugsunartilraun.

Það sem hún getur borið er að sama skapi hóflegt. Allt byggir á hliðstæðunni milli smækkaðs þéttivatnslíkans og minisuperspace-heimsfræði, og hliðstæður geta varpað ljósi án þess að sanna. Einn vettvangur frá einum höfundi sem sýnir að ein innri-tíma uppskrift virkar er sterk sönnun á hugmynd og veikir grunnur fyrir fullyrðingu um hvernig tími hegðar sér í náttúrunni. Réttu lesningin er: nú er hægt að gera þetta á rannsóknarstofu og athuga hvort það virki.

Hvers vegna þetta skiptir máli

Umræður um tímavandann hafa lengi setið fastar á sviði formhyggju, þar sem erfitt er að hrekja samkeppnishugmyndir vegna þess að þær gefa fáar skýrar mælanlegar spár. Að breyta jafnvel litlu horni þeirrar umræðu í tilraun sem hægt er að framkvæma — þar sem innri klukka annaðhvort raðar gögnunum eða ekki og virk jafna annaðhvort passar eða ekki — breytir eðli deilunnar. Það gefur kenningafræðingum tilraunabekk fyrir tækin sín.

Það er hið raunverulega framlag: ekki svar um tíma, heldur **staður til að spyrja spurningarinnar magnbundið**. Kerfi ofurkaldra atóma hafa þegar þjónað sem stjórnanlegar hliðstæður fyrir Hawkingeislun, þenjandi alheima og hrörnun falsks tómarúms; þetta bætir afstæðum tíma og tímaörinni í verkfæraakistuna. Gildið liggur í framhaldstilraununum sem verða mögulegar — önnur klukkuval, skoppandi á móti einsleitri hegðun, próf á afturkræfni — hvert þeirra nú mæling en ekki aðeins útreikningur.

Í stuttu máli

Eðlisfræðingur byggði Bose–Einstein-þéttivatn, skipti því með þunnri ljóshindrun í mældan og ómældan helming og notaði óreiðuna sem flæðir milli helminganna til að smíða innri „óreiðutíma“. Sú klukka raðar útpenslu og samdrætti mælda hlutans, gengur hratt þegar óreiða skiptist og stöðvast þegar hún gerir það ekki, og virk jafna skrifuð í þessum innri tíma endurskapar mæld gögn í lághindrunartilfellinu sem höfundurinn skoðaði. Uppsetningin er hliðstæða „tímavandans“ úr kanónískri skammtaþyngdarfræði: „miklihvellur“, „miklahrap“ og „smáalheimur“ eru heiti á fönguðu gasi sem er stærðfræðilega líkt einfalduðu heimsfræðilíkani. Þetta er stýrður prófunarvettvangur fyrir hugmyndir um afstæðan tíma — ekki lausn á tímavandanum, ekki fullyrðing um hinn raunverulega alheim og ekki sönnun þess að tími sé „í raun“ óreiða.

Raunsætt mat

Það sem greinin sýnir: Í einu vel einangruðu kaldatómakerfi getur innri klukka skilgreind út frá óreiðuskiptum raðað mældri hreyfingu einátt, og virk „óreiðutíma“-jafna endurskapar mælda þróun í lághindrunartilfellinu sem var skoðað.

Það sem er trúverðugt en ekki sýnt: Að óreiðutími eða afstæður tími sé góð lýsing á tíma í raunverulegri skammtaþyngdarfræði. Tilraunin styður að taka slíkar byggingar alvarlega; hún staðfestir þær ekki fyrir náttúruna.

Það sem hún sýnir ekki: Að tímavandinn sé leystur; að skammtaþyngdarfræði sé leyst; að alheimurinn hafi byrjað í slíkum miklahvelli; að tímarúm verði til úr atómum; eða að „tími sé ekki til“.

Helstu takmarkanir: Einn vettvangur, einn höfundur og eitt klukkuval; um 5% óvissa á hvern punkt; meðalsviðsnálgun og meðaltalsþéttni; og umfram allt hliðstæðan milli fangaðs þéttivatns og einfaldaðs heimsfræðilíkans.

Hversu mikið traust ætti almennur lesandi að hafa? Mikið traust á því að tilraunin hafi gert það sem hún greinir frá í sínu eigin kerfi. Lítið traust á öllum stökkum frá þessari hliðstæðu til fullyrðinga um tíma í hinum raunverulega alheimi.

Heimildir

Barontini, Testing the problem of time with cold atoms, Physical Review Research 8, L022047 (2026)
<https://doi.org/10.1103/1h9j-df4k>