



The CLEAN PAPER

WHAT THE PAPER SAYS · WHAT IT DOESN'T · WHY IT MATTERS

Plona, pusiau išsilydžiusi pirmoji pluta: modelis, kuriame Hadėjaus sąlygas lėmė smūgiai, o ne vidinė šiluma

Pirmasis Žemės eonas, Hadėjus, beveik nepaliko uolienų įrašo. Šiame modeliavimo tyrime klausiama, kokia galėjo būti pluta, jei į energijos balansą įtraukiami dažnai ignoruojami kosminių kūnų smūgiai. Taikydami stochastinį, laikui bėgant silpnėjantį smūgių srauto modelį ir patikrintas plutos bei mantijos šilumos pernašos simuliacijas, autoriai nustato, kad didžiąją Hadėjaus dalį smūgių atnešta šiluma galėjo bent viena dydžio eile viršyti visą Žemės vidinę šilumą. Modelyje susidaro plona (mažiau nei ~5 km) pluta, iš dalies išsilydžiusi vos kelių kilometrų gylyje — per silpna plokščių tektonikai ir linkusi būti perdirbama atgal į mantiją. Tai galėtų paaiškinti, kodėl iš Hadėjaus išliko taip mažai medžiagos. Smūgiams silpstant po ~3,9 Ga, galėjo pradėti išlikti ilgalaikė žemyninė pluta, maždaug tuo metu, kai pasirodo seniausios išlikusios felzinės uolienos — autorių atsargiais žodžiais, tai „greičiausiai ne sutapimas“. Kadangi skaičiavimuose sąmoningai naudotos konservatyvios, apatinę šildymo ribą duodančios prielaidos, kokybinė išvada gana tvirta, nors tikslūs skaičiai nėra galutiniai. Tai stiprus ir nuoseklus ankstyvosios Žemės modelis, o ne tiesioginis jos stebėjimas.

Written by Lucio Vaglio · Cross-checked by Laura Nesso · Edited by Michele Renda · Figures by Laura Nesso and Nova Vela · AI-assisted, human-reviewed

Paper: *Impact heating and the hidden Hadean*, Tim E. Johnson, Craig O'Neill, Simon Turner, Christopher L. Kirkland, Science (2026), 392:1408–1412 · DOI: 10.1126/science.aeb5402

Žemės istorijos skyrius, iš kurio beveik neliko puslapių

Žemė yra vienintelė mums žinoma planeta, turinti žemynus — plūdrią, silicio dioksidu turtingą plutą, ant kurios gyvename. Tačiau tai, kaip žemynai pirmą kartą susiformavo, tebėra viena seniausių neišspręstų geologijos problemų. Priežastis negailėstinga: beveik visi įrodymai sunaikinti.


Pirmasis Žemės eonas, Hadėjus, tęsiasi nuo planetos susidarymo iki maždaug 4,03 milijardo metų (Ga) prieš dabartį. Iš pirmojo pusės milijardo metų beveik nieko neišliko. Seniausios vientisos felzinės, žemyninei plutai būdingos uolienos yra maždaug 4,03 Ga senumo. Kelios retos bazaltinės uolienos siekia ~4,2 Ga. Seniausia bet kokia išlikusi medžiaga — pavieniai cirkono kristalai, garsiausi iš Jack Hills Vakarų Australijoje, datuojami 4,4 Ga. Tai beveik visas Žemės kūdikystės archyvas: kelios vietovės ir smėlio grūdėlio dydžio mineralai.

Šis tyrimas į archyvą neprideda naujos uolienos. Jis daro ką kita: kuria fizikinį modelį, kaip Hadėjaus pluta turėjo elgtis pagal tuometines sąlygas, ir užduoda klausimą, kurį daug ankstyvosios Žemės modelių palieka nuošalyje. Kas nutinka, jei nustojame ignoruoti faktą, kad ankstyvąją Žemę nuolat bombardavo kosminiai kūnai?

Autorių atsakymas ryškus. Didžiąją Hadėjaus dalį smūgių atnešta šiluma galėjo nustelbti visą vidinę Žemės šilumą, palikdama plutą ploną ir iš dalies išsilydžiusią — per silpną, autorių teigimu, bet kam panašiam į šiuolaikinę plokščių tektoniką. Tai modelis, o ne išlikęs praeities „prisiminimas“. Tačiau bent jau šis modelis bando įtraukti epochos, kurią aprašo, smurtingumą.

A model of the Hadean, not a memory of it

The logic is thermal: impacts heat, crust melts, the archive erases itself.



Modelio energijos biudžete dominuoja smūgių šiluma, plona ir negiliai išsilydžiusi pluta nuolat perdirbama, o ilgiau išliekanti žemyninė pluta atsiranda tik ties maždaug 4,0–3,9 Ga riba. Tai Hadėjaus modelis, o ne tiesioginis jo įrašas.

Ką padarė autoriai

Komanda sujungė tris dalykus, kurie dažnai nagrinėjami atskirai.

Pirma, **stochastinį smūgių srauto modelį** — asteroidų ir didesnių kūnų kritimą į vidinę Saulės sistemą Hadėjaus ir ankstyvojo Archėjaus metu. Svarbu, kad tai nėra senoji vieno staigaus „vėlyvojo intensyvaus bombardavimo“ (*Late Heavy Bombardment*) piko idėja. Čia smūgių srautas pradžioje intensyvus ir **laikui bėgant mažėja**, o dideli smūgiai įvyksta atsitiktinai, ne pagal tvarkaraštį. Modelis perskaičiuotas iš Mėnulio ir vidinės Saulės sistemos smūgių statistikos ir parinktas taip, kad derėtų su cirkonų amžiaus pasiskirstymu bei turimais paleomagnetiniais duomenimis.

Antra, **geodinamines simuliacijas**, rodančias, kaip šiluma juda per plutą ir viršutinę mantiją. Naudotas patikrintas gardelės Boltzmanno metodas (kodas Planet_LB), atliekant ir paprastus vienmačius temperatūros priklausomybės nuo gylio skaičiavimus, ir pilnas dvimates mantijos konvekcijos būsenų simuliacijas ties 4,1 Ga. Jose įtraukti įprasti vidiniai šilumos šaltiniai — radioaktyvusis skilimas ir branduolio šiluma — bei, svarbiausia, **magminė advekcija**: kylančio lydalo aukštyn pernešama šiluma, kurios daugelyje plutos šiluminių modelių nėra.

Trečia, **fazių pusiausvyros modeliavimą** realistiškai ankstyvajai plutai — hidratuotam Hadėjaus metabazaltui iš Nuvvuagittuq žaliojo akmens juostos — siekiant nustatyti, kokioje temperatūroje ir gilyje tokia uoliena pradėtų lydytis.

Vienas metodinis pasirinkimas svarbus viso straipsnio interpretacijai: autoriai sąmoningai pasirinko prielaidas, kurios *silpnina* jų pačių išvadą. Jie naudojo „nechondritinę“ mantiją, turinčią mažiau šilumą gaminančių radioaktyviųjų elementų nei chondritinis etalonas, todėl jos vidinis šildymas buvo mažesnis nei pusė standartinio modelio; pasirinko konservatyvius šildymo greičius ir ignoravo jauno, tuomet daug arčiau buvusio Mėnulio potvyninį šildymą. Vadinasi, apskaičiuotos plutos temperatūros yra **minimumai** — apatinės ribos. Jei kas, tikrasis Hadėjus galėjo būti dar karštesnis nei jų modelyje.

Ką jie nustatė

Hadėjaus energijos balanse dominavo smūgiai, o ne vidinė šiluma. Integravus smūgių šilumą per laiką, ji gerokai viršija vidinį indėlį — didžiąją Hadėjaus dalį bent viena dydžio eile. Pagal šį vaizdą pagrindinis ankstyvosios tektoninės veiklos energijos šaltinis buvo smūgių šildymas, o ne radioaktyvusis skilimas, ir tik po maždaug **3,9 Ga** jis tampa antraeilu veiksnium.

Ši šiluma išlaikė plutą ploną ir negiliai išsilydžiusią. Be smūgių ir lydalo advekcijos Hadėjaus pluta modelyje dalinai lydosi tik žemiau maždaug 10–15 km. Pridėjus smūgių šilumą, lydalo zona pakyla dramatiškai: pluta iš dalies išsilydžiusi jau vos **kelių kilometrų gilyje** — žemiau maždaug 2–5 km. Ties ~5 km gyliu modelis numato daugiau nei 30 % lydalo, o tokios būsenos uoliena per silpna, kad

išliktų kaip standi plokštė. 5–10 km gylyje ~1000–1100 °C temperatūra reiškia, kad pluta labai išsilydžiusi beveik nepriklausomai nuo sudėties. Išlikusi kieta plutos dalis būtų buvusi **plona — mažiau nei maždaug 5 km**.

Pusiau išsilydžiusi pluta pati naikina savo uolienų įrašą. Intensyviai lydantis tankesnė, geležies ir magnio turtinga medžiaga gali grimzti ir atsiskirti, o lengvesni, silicio dioksidu turtingi lydalai kyla. Laikui bėgant vidutinė plutos sudėtis taip evoliucionuoja link labiau diferencijuotų, silicio dioksidu turtingų uolienų ir gali susidaryti felziniai lydalai, iš kurių kristalizuojasi cirkonas. Tačiau beveik visa tokia plona pluta vėliau būtų perdirbta atgal į konvektuojančią mantiją, o tai dera su cheminiu, ypač izotopiniu, įrašu. Šiame modelyje beveik visiškai nebuvimas Hadėjaus uolienų nebuvimas nėra tiesiog spraga archyve — tai *prognozė*. 4,2 Ga uolienos ir 4,4 Ga cirkonai būtų reti plutos, kuri daugiausia buvo sunaikinama beveik taip pat greitai, kaip susidarydavo, išlikę fragmentai.

Bombardavimo silpnėjimas sutampa su pirmųjų ilgalaikių žemynų atsiradimu. Smūgių srautui mažėjant ties 4,0–3,9 Ga perėjimu, pluta pagaliau galėjo storėti ir išlikti. Maždaug tuo pačiu metu pasirodo seniausios iki šiol išlikusios žemyninės uolienos. Autoriai formuluoja atsargiai: tai, kad ilgalaikė žemyninė pluta atsirado maždaug tada, yra „greičiausiai ne sutapimas“.

Pagrindinė jų išvada: tokiomis sąlygomis — plona pluta, išsilydžiusi vos kelių kilometrų gylyje — **Hadėjaus plokščių tektonika mažai tikėtina**.

Autoriai taip pat paaiškina, kodėl ankstesni darbai priėjo priešiną išvadą. Ankstesniuose stochastinių smūgių tyrimuose poveikis buvo nedidelis: bet kuriuo metu lydėsi mažiau nei 2,5 % plutos. Tuose darbuose trūko dviejų šiame tyrime įtrauktų efektų: didelių smūgių pasaulinio poveikio gilesniam mantijos lydymuisi ir tos šilumos pernašos aukštyn kylančia magma. Juos įtraukus, šiluminis vaizdas pasikeičia iš esmės.

Kodėl modelis nėra praeities atmintis

Visa tai yra simuliacijų rezultatas, o ne matavimai iš Hadėjaus uolienų — beveik visų tokių uolienų nebėra. Tai nereiškia, kad rezultatas silpnas, tačiau aiškiai nusako, kokio tipo jis yra.

Grandinė tokia: smūgių srauto *modelis* pateikia duomenis mantijos ir plutos šilumos pernašos *modeliui*, o šis tikrinamas pagal konkrečios uolienos lydimosi *modelį*. Kiekviena grandis pagrįsta fizika ir, kur įmanoma, patikrinta etalonais, tačiau visa konstrukcija yra nuoseklus argumentas apie tai, kaip Hadėjus *turėjo* atrodyti esant tikėtina fizikai, o ne matavimas, kaip jis *iš tikrųjų* atrodė.

Todėl konservatyvios autorių prielaidos svarbesnės, nei gali pasirodyti. Jie pasirinko apatinę šildymo ribą, bet vis tiek gavo plačiai išsilydžiusią negilią pluta. Dėl to kokybinė išvada — Hadėjaus pluta buvo karšta ir silpna — gana atspari jų pasirinkimams. Ko šis darbas *nenustato tiksliai*, tai skaitinių detalių: konkrečių geotermų, konkrečios lydalo dalies ir tikslaus plutos storio. Rezultato kryptimi galima pasitikėti labiau nei jo skaičiais po kablelio.

Ko tai *neįrodo*

- Tai **tiesiogiai nestebi** Hadėjaus plutos. Šio laikotarpio uolienų beveik nėra; tai modeliavimas, rodantis, ką numano fizika, o ne matavimas.
- Rezultatas **nesiremia** „vėlyvuoju intensyviu bombardavimu“. Naudojamas mažėjantis stochastinis smūgių srautas; modeliui nereikia staigaus bombardavimo piko ir toks pikas neįvedamas.
- Tai **neišsprendžia** diskusijos dėl plokščių tektonikos. „Mažai tikėtina“ čia yra stipri, fizika paremta išvada, palanki karštos ankstyvosios Žemės su sustingusiu arba labai plastišku išoriniu sluoksniu vaizdui, tačiau Hadėjaus tektoninis režimas vis dar realiai ginčijamas.
- Tai **neįrodo**, kad smūgiai *sukėlė* žemynų atsiradimą ties 4,0–3,9 Ga riba. Laiko sutapimas yra stipri sąsaja, kurią patys autoriai vadina „greičiausiai ne sutapimu“ — tai atsargi formuluotė įtikinamai koreliacijai, o ne parodytam priežastiniam ryšiui.
- Jack Hills cirkonai **nėra** išlikę žemynai. Tai reti išlikę grūdėliai, rodantys, kad felzinė medžiaga ir vanduo egzistavo labai anksti; visa modelio esmė ta, kad juos sukūrusi pluta daugiausia buvo perdirbta.
- Tai **neatkuria** visos ankstyvosios Žemės istorijos. Simuliacijos idealizuotos — vienmačiai profilai ir dvimatės pusiaujo pjūvio sritys, smūgius telkiant netoli pusiaujo, pateikiamos kaip atskirų momentų būsenos, o ne pilnas keturmatės planetos modelis.

Kiek tvirti yra įrodymai?

Pagrindiniam teiginiui — kad smūgių šildymas buvo pirmos eilės veiksnys, kontroliavęs Hadėjaus plutą ir išlaikęs ją ploną bei negiliai išsilydžiusią — argumentas yra nuoseklus ir svarbia prasme konservatyvus. Naudojamas patikrintas geodinamikos kodas, fiziškai pagrįsti pradiniai dydžiai ir apatinės ribos prielaidos, o į energijos balansą įtraukiamas šilumos šaltinis, kurį daug ankstesnių modelių tiesiog ignoravo. Modelio patikimumą didina ir tai, kad viena schema paaiškina du atkaklius faktus: kodėl beveik nėra senesnių nei ~4 Ga uolienų — dėl beveik visiško perdirbimo — ir kodėl ilgalaikė pluta pasirodo maždaug tada, kai bombardavimas silpsta.



Jack Hills Vakarų Australijoje, NASA ASTER instrumento vaizde. Šio regiono cirkonai yra viena seniausių žinomų išlikusių medžiagų iš ankstyvosios Žemės plutos — mažytės užuominos iš eono, kurio uolienos beveik visos buvo ištrintos.

NASA/GSFC/METI/ERSDAC/JAROS, and U.S./Japan ASTER Science Team fair-use

Apribojimai lygiai taip pat aiškūs ir būdingi bet kokiam labai gilaus laiko modeliui: čia modeliai statomi ant kitų modelių, o jų atrama — itin skurdus uolienų įrašas. Labiausiai cituojama išvada — kad „plokščių tektonika mažai tikėtina“ — yra išvada iš modelio, ne stebėjimas. Tinkamiausia laikysena — laikyti šį darbą stipria, gerai pagrįsta hipoteze, kitaip suformuluojančia Hadėjaus vaizdą ir kviečiančia kitus tikrinti jos prielaidas, ypač pasirinktą smūgių srauto modelį, o ne uždaryta byla.

Naudingiausia santrauka nėra nei „taip atrodė Hadėjus“, nei „tai tik simuliacija“. Tikslesnė ji būtų tokia: pagal tikėtiną ir konservatyvią fiziką stipriai bombarduojama ankstyvoji Žemė būtų turėjusi ploną, pusiau išsilydžiusią ir nuolat save perdirbančią plutą — o viena ši idėja paaiškina stebėtinai daug iš to nedaugelio, ką iš tiesų galime pamatyti.

Kodėl tai svarbu

Populiarus ankstyvosios Žemės vaizdas dažnai svyruoja tarp dviejų kraštutinių: ramus vandens pasaulis su plokščių tektonika, beveik kaip šiandien, arba pragariška lavos planeta. Šis darbas pateikia konkretų, fizika paremtą tarpinį variantą: plona pluta, kuri vos kelių kilometrų gylyje nuolat vėl išsilydo, yra ardoma ir kuriama iš naujo, o sąlygas daugiausia nustato smūgiai, ne vidinė šiluma.

Toks perrėminimas iš tikrųjų daug ką paaiškina. Jis siūlo vieną mechanizmą dviem svarbiausiems ankstyvosios Žemės faktams — beveik visiškam uolienų įrašo nebuvimui ir pirmųjų ilgai išliekančių žemynų atsiradimo laikui — ir į istorijos centrą perkelia dažnai ignoruotą procesą, smūgių šildymą. Jei modelis atlaikys tolesnius bandymus, jis keis mūsų samprotavimą apie tai, kada Žemė apskritai tapo stabilias žemynines mases turinčia planeta, ir galės būti taikomas kitoms uolinėms planetoms, susidariusioms per savus bombardavimo laikotarpius.

Tam nereikia, kad šis modelis būtų paskutinis žodis. Pakanka, kad jis būtų pakankamai gera, patikrinama hipotezė — ir, susiedamas save su išlikusiu cirkonų bei izotopų įrašu, toks jis yra. Pavadinime minimas „paslėptas Hadėjus“ ir yra esmė: epochą daugiausia galime pasiekti tik modeliuodami, nes ji pati sunaikino didžiąją savo įrodymų dalį.

Trumpa santrauka

Pirmasis Žemės eonas, Hadėjus (iki ~4,03 Ga), beveik nepaliko uolienų įrašo. Šis modeliavimo tyrimas klausia, kokia galėjo būti pluta įtraukus dažnai ignoruojamą šilumos šaltinį — kosminių kūnų smūgius. Naudodami stochastinį, laikui bėgant mažėjantį smūgių srauto modelį kartu su patikrintomis vienmatėmis ir dvimatėmis plutos bei mantijos šilumos pernašos simuliacijomis, įskaitant kylančio lydalo pernešamą šilumą, autoriai nustato, kad per laiką integruota smūgių šiluma didžiąją Hadėjaus dalį galėjo bent viena dydžio eile viršyti visą vidinę Žemės šilumą. Modelio pasekmė — plona, mažesnio nei ~5 km storio pluta, dalinai išsilydžiusi vos kelių kilometrų gylyje, o ties ~5 km lydalo dalis viršija 30 %. Tokia pluta per silpną plokščių tektoniką, kurią autoriai Hadėjaus sąlygomis vadina mažai tikėtina. Didžioji plutos dalis būtų perdirbta atgal į mantiją, todėl būtų paaiškinama, kodėl Hadėjaus medžiagos išliko tiek mažai; smūgiams silpstant ties 4,0–3,9 Ga riba, galėjo pradėti formuotis ilgai išliekanti žemyninė pluta, maždaug tada, kai pasirodo seniausios išlikusios felzinės uolienos — „greičiausiai ne sutapimas“. Kadangi autoriai sąmoningai naudojo konservatyvias, apatinę šildymo ribą nustatančias prielaidas, kokybinė išvada gana tvirta, nors tikslūs skaičiai nėra fiksuoti. Tai stiprus ir nuoseklus ankstyvosios Žemės modelis — ne tiesioginis jos stebėjimas.

Be pagražinimų

Ką straipsnis parodo: fiziškai pagrįstose simuliacijose, į kurias įtrauktas smūgių šildymas ir magnetinė šilumos pernaša, Hadėjaus pluta gaunama plona ir dalinai išsilydžiusi vos kelių kilometrų gylyje; energijos balanse dominuoja smūgiai, o ne vidinė šiluma; didžioji plutos dalis perdirbama atgal

į mantiją ir šiame modelyje ji negali palaikyti plokščių tektonikos.

Kas tikėtina, bet neįrodyta: kad būtent smūgių silpnėjimas leido maždaug ties 3,9 Ga atsirasti ilgai išliekantiems žemynams; kad Hadėjaus Žemė turėjo sustingusio ar labai plastiško išorinio sluoksnio tektoninį režimą, o ne ankstyvą plokščių tektoniką; kad beveik visų Hadėjaus uolienų nebuvimą konkrečiai lėmė išsilydžiusios plutos perdirbimas.

Ko tai nerodo: tiesioginio Hadėjaus plutos matavimo; galutinio atsakymo į plokščių tektonikos debatai; įrodyto priežastinio ryšio tarp silpstančio bombardavimo ir pirmųjų žemynų; kad Jack Hills cirkonai yra išlikę žemynai; pilno ankstyvosios planetos modelio.

Svarbiausi apribojimai: Hadėjaus uolienų įrašas beveik neegzistuoja, todėl modelį riboja labai nedaug duomenų; modeliai statomi vienas ant kito (smūgių srautas → geodinamika → fazių pusiausvyra); pats pasirinktas smūgių srautas yra reprezentatyvus, bet neapibrėžtas; simuliacijos idealizuotos — 1D profiliai, 2D pusiaujo pjūviai ir atskirų laiko momentų būsenos. Konservatyvios apatinės ribos prielaidos sustiprina kokybinę išvadą, bet nepadaro konkrečių geotermų tikslų.

Kiek tuo turėtų pasitikėti bendras skaitytojas? Didelis pasitikėjimas, kad pagal tikėtiną fiziką stipriai bombarduojama ankstyvoji Žemė būtų turėjusi karštą, ploną ir negiliai išsilydžiusią plutą. Vidutinis pasitikėjimas, kad dėl to Hadėjaus plokščių tektonika buvo mažai tikėtina ir kad tai paaiškina trūkstamą uolienų įrašą. Mažas pasitikėjimas bet koku teiginiu, kad tai *įrodo*, kaip tiksliai susidarė žemynai ar kada tai įvyko — tai stiprus, konservatyvus modelis, perrėminantis Hadėjų, o ne tiesioginis žvilgsnis į jį.

Šaltiniai

Johnson, O'Neill, Turner & Kirkland, Science 392:1408-1412 (2026)

<https://doi.org/10.1126/science.aeb5402>