



WHAT THE PAPER SAYS · WHAT IT DOESN'T · WHY IT MATTERS

Trys jauni pacientai buvo gyvi ir be ligos praėjus metams po eksperimentinių T ląstelių. I fazės tyrimas negali parodyti, kas sukėlė šiuos rezultatus

ReMIND 33 vaikams ir jauniems suaugusiesiems, sergantiems didelės rizikos smegenų navikais, suleido laboratorijoje iš jų pačių kraujo išaugintas T ląsteles. Ląstelės buvo išplėtos taip, kad reaguotų į tris baltymus, kurių gali būti vėžio ląstelėse. Trys pacientai turėjo be ligos laikotarpius, ilgesnius nei 31,8, 41,2 ir 51,6 mėnesio nuo pirmos infuzijos, įskaitant vieną visišką atsaką pagal vaizdinimo kriterijus. Agresyvių smegenų kamieno navikų grupėje nė viename skenavime nebuvo pakankamo sumažėjimo ar išnykimo, kad būtų pasiektas iš anksto nustatytas atsako slenkstis. Tas pats ankstyvas saugumo ir dozės tyrimas užfiksavo vieną mirtį, pakankamai rimtą, kad pagal jo taisykles būtų skaičiuojama prieš tolesnį dozės didinimą. Be palyginamosios grupės tyrimas negali parodyti, ar T ląstelės sukėlė šiuos tris rezultatus.

Written by Cinzia Vaglio · Cross-checked by Laura Nesso and Matteo · Edited by Laura Nesso and Michele Renda
· Figures by Cinzia Vaglio and Nova Vela · AI-assisted, human-reviewed

Paper: *Multi-antigen-targeting T cells in pediatric central nervous system tumors: a phase 1 trial*, Stephanie Gomez, Rachel A. DiCioccio, Ashley E. Geiger, Melanie L. Grant, Emily Reynolds, Anushree Datar, Chase D. McCann, Jay Tanna, Divyesh Kukadiya, Fahmida Hoq, Anqing Zhang, Patrick J. Hanley, Jennifer L. Webb, Lindsay B. Kilburn, Brian R. Rood, Adriana Fonseca, Holly J. Meany, L. Gilbert Vezina, Roger J. Packer, Conrad Russell Y. Cruz, Catherine M. Bollard & Eugene I. Hwang, *Nature Medicine* 32, 2481-2493 (2026) · DOI: 10.1038/s41591-026-04449-9

Author Correction

Nature Medicine 2026 m. liepos 22 d. paskelbė Author Correction, patikslinančią interesų konflikto deklaracijos formulotę. Čia naudojamas pataisytas straipsnis; klinikiniai duomenys ir išvados nebuvo pakeisti.

Author Correction →

Trys jauni pacientai buvo gyvi ir be ligos praėjus metams po eksperimentinių T ląstelių. I fazės tyrimas negali parodyti, kas sukėlė šiuos rezultatus

Daugiau nei 31,8 mėnesio. Daugiau nei 41,2 mėnesio. Daugiau nei 51,6 mėnesio.

Tai trys be ligos išbūti laikotarpiai, skaičiuoti nuo pirmos eksperimentinio T ląstelių gydymo infuzijos. Pirmasis priklausė 14-mečiui, kurio meduloblastoma buvo atsinaujinusi kelis kartus; stebėjimas baigėsi pacientui pasitraukus iš tyrimo. Antrasis – 8-mečiui, sergančiam reta astroblastoma, ir straipsnio duomenų fiksavimo metu jis tebesitęsė. Trečiasis – 14-mečiui, kurio glioblastoma buvo atsinaujinusi, ir jis taip pat tebesitęsė.

Mėnesių skaičius gali skambėti kliniškai ir nutolusiai. Čia tai vienintelis sąžiningas būdas nepamesti žmogiško fakto. Straipsnis nepasako, kaip tie metai jautėsi. Jis pasako, kad trys jauni pacientai, sergantys didelės rizikos smegenų navikais, po ląstelių infuzijos metus buvo gyvi be dokumentuotos ligos.

Jis **nepasako**, kad būtent ląstelės sukėlė šiuos rezultatus.

Šis skirtumas yra visos istorijos stuburas. ReMIND buvo atviras tyrimas: šeimos ir gydytojai žinojo, koks gydymas skiriamas. Jis taip pat buvo nerandomizuotas – nebuvo paskirtos palyginamosios grupės. Ir tai buvo I fazės tyrimas, ankstyvas tyrimas, pirmiausia skirtas patikrinti, ar į kelis taikinius nukreiptas T ląstelių galima pagaminti, suleisti ir tirti toleruojama doze, o ne ar jos pagerina išgyvenamumą. Tyrimas užfiksavo tris išskirtines klinikines istorijas. Jis taip pat neužfiksavo nė vieno skenavimo, kuriame agresyvių smegenų kamieno navikų grupėje būtų pakankamas sumažėjimas ar išnykimas, kad būtų pasiektas iš anksto nustatytas atsako slenkstis; užfiksavo du galbūt su gydymu susijusius rimtus reiškinius su naviko patinimu ir vieną mirtiną reiškinį, pakankamai rimtą, kad pagal tyrimo taisykles būtų stabdomas tolesnis dozės didinimas.

Metai yra tikri. Priežastinis priskyrimas – neaiškus. Abi tiesos turi likti pagrindinėje istorijoje.

Gydymas pagamintas iš kiekvieno paciento kraujo

Gydymas vadinamas **TAA-T terapija** — tai navikų asocijuotiems antigenams specifinės T ląstelės. T ląstelės yra imuninės ląstelės, galinčios atpažinti tam tikrus molekulinis fragmentus. Tyrėjai paėmė kraujo iš kiekvieno dalyvio ir laboratorijoje augino to žmogaus T ląsteles, veikdami jas trijų su navikais siejamų baltymų fragmentais: **WT1** (Wilms tumor 1), **PRAME** (preferentially expressed antigen in melanoma) ir **survivin**, baltymu, dalyvaujančiu ląstelių išlikime ir dalijimesi. Šių baltymų gali būti vaikų smegenų navikuose ir jie gali veikti kaip imuninėms ląstelėms matomi ženklai, tačiau jie nėra būdingi tik vėžiui.

Tai nebuvo **CAR-T ląstelės** — genetiškai modifikuotos T ląstelės, turinčios laboratorijoje sukurtą receptorių, tarsi naują jutiklį pasirinktam taikiniui. ReMIND naudojo kitą metodą: atrinko ir išplėtė natūraliai egzistuojančias T ląsteles, reagavusias į trijų baltymų fragmentų taikinius, jų genetiškai nekeičiant. Ląstelės buvo patikrintos, užšaldytos ir vėliau suleistas į veną. Nukreipdami į tris taikinius, o ne vieną, tyrėjai tikėjosi sumažinti tikimybę, kad iš skirtingų ląstelių sudarytas navikas išvengs gydymo todėl, kad tik dalis jo ląstelių turi vieną konkretų taikinį.

Kuo tai skiriasi nuo CAR-T?

Gaminant CAR-T T ląstelėms suteikiamas naujas dirbtinis receptorių, kad jos galėtų tiesiogiai atpažinti pasirinktą žymenį. Gaminant TAA-T receptorių nepridedamas. Auginama mišri nemodifikuotų T ląstelių populiacija, kurios esami receptoriai reaguoja į su WT1, PRAME ar survivin susijusius baltymų fragmentus. Tai skirtingi imuninių ląstelių gydymo kūrimo būdai; įrodymai, kad vienas metodas veikia tam tikro tipo vėžyje, negali būti automatiškai perkelti kitam.

Tai pagrįsta strategija, bet ne pademonstruotas klinikinis mechanizmas. Tyrimas neparodė, kad suleistas ląstelės pateko į konkretų naviką, jame išliko ar jį sunaikino. Pagrindiniai klausimai buvo daug paprastesni: ar galima pagaminti tinkamą produktą, ar galima jį suleisti, kokia dozė turėtų būti tiriama toliau ir kokie toksiškumai pasirodo?

ReMIND Children's National Hospital ligoninėje turėjo tris grupes. **A grupėje** buvo naujai diagnozuota **difuzinė vidinė tilto glioma (DIPG)** — agresyvus navikas, augantis per smegenų kamieno dalį, vadinamą tiltu, ir sunkiai pašalinamas chirurgiškai. **B grupėje** buvo ne smegenų kamieno esantys smegenų ir nugaros smegenų navikai, kurie atsinaujino, atsparūs gydymui arba progresavo. Nei A, nei B grupė negavo limfodeplecijos — trumpo chemoterapijos kurso, laikinai sumažinančio dalį organizme esančių imuninių ląstelių prieš imuninių ląstelių infuziją. **C grupė** buvo keturių pacientų išplėtimo grupė su atsinaujinusiomis ne smegenų kamieno navikais, kurioje ši priešinfuzinė chemoterapija buvo pridėta naudojant fludarabiną ir ciklofosfamidą.

Three arms, two disease settings, two starting points for survival

The groups provide different kinds of information.

ARM A | 11 infused

Newly diagnosed aggressive brainstem tumor (DIPG)

No pre-infusion
immune-cell-reducing chemo
Survival counted
from diagnosis

ARM B | 18 infused

Returned / resisted treatment /
worsened outside the brainstem

No pre-infusion
immune-cell-reducing chemo
Survival counted
from first infusion

ARM C | 4 infused

Returned outside
the brainstem

Immune-cell-reducing
chemo before first infusion
Survival counted
from first infusion

DO NOT COMPARE THE SURVIVAL ESTIMATES DIRECTLY

- arm A starts at diagnosis; arms B/C start at first infusion

Original diagram - The Clean Paper - CC BY 4.0

ReMIND turėjo tris grupes su skirtingomis ligomis ir skirtingu chemoterapijos naudojimu prieš infuziją. A grupėje išgyvenamumas skaičiuotas nuo diagnozės, B ir C grupėse — nuo pirmos TAA-T infuzijos, todėl įverčių negalima tiesiogiai lyginti.

The Clean Paper CC BY 4.0

Sutikimą davė 51 žmogus; infuziją gavo 33

Pacientų skaičius mažėjo kiekviename praktiniame etape.


Sutikimą davė 51 pacientas. Iš 48 buvo paimtas kraujas. 41 iš šių 48, arba 85,4%, pavyko pagaminti TAA-T produktą pagal pirmą planuotą tyrimo dozę ar didesnę. Bent vieną infuziją gavo 33 pacientai: 11 A grupėje, 18 B grupėje ir 4 C grupėje.

Kai kurie pacientai iki gydymo nebeatitiko kriterijų arba mirė. Septyniems pacientams, iš kurių kraujas jau buvo paimtas, nepavyko pagaminti tinkamo produkto pagal pirmą planuotą dozės lygį: šešiems dėl to, kad ląstelės laboratorijoje nepakankamai dauginosi, o vienam produktas neatitiko privalomo kokybės patikrinimo. Devyniems pacientams, kurių pirmasis kiekis buvo nepakankamas, teko priskirti mažesnę dozę.

Tyrimo metu procesas pagerėjo. Padidinus paimamo kraujo kiekį ir pakeitus ląstelių auginimo metodą, visiems 14 pacientų, kurių kraujas buvo paimtas po šių pakeitimų, pavyko pagaminti bent vieną gydymo dozę pagal pirmą planuotą lygį ar didesnę. Tai tikras įrodymas apie gydymo pagaminamumą. Tai nėra paciento klinikinio rezultato įrodymas.

The treated group was smaller than the consented group

Every step tests whether the treatment can be made and delivered.



Original diagram - The Clean Paper - CC BY 4.0

Tyrimas prasidėjo nuo 51 sutikimą davusio paciento ir infuzavo 33. Trūkštami 18 taip pat yra įrodymų dalis: kraujo paėmimas, produkto gamyba, tolesnis tyrimo kriterijų atitikimas ir blogėjanti sveikata nulėmė, kas pasiekė gydymą.

The Clean Paper CC BY 4.0

Naudodamas statistinį dozės ir saugumo modelį, tyrimas pasirinko tikslą — **80 milijonų ląstelių vienai dozei kiekvienam apskaičiuoto kūno paviršiaus ploto kvadratiniam metrui (8×10^7 ląstelių/m²)**. Kūno paviršiaus plotas yra klinikinis bendro kūno dydžio įvertis, apskaičiuojamas iš ūgio ir svorio; tai nereiškia, kad gydytojai matavo odos lopa, smegenis ar naviką. Onkologiniuose ir pediatriiniuose tyrimuose jis naudojamas planuojamai dozei pritaikyti skirtingo dydžio pacientams — pavyzdžiui, pacientui, kurio apskaičiuotas kūno paviršiaus plotas yra 1,2 m², vienos infuzijos tikslinė dozė būtų 96 milijonai ląstelių. Modelis 80 milijonų ląstelių/m² dozę taip pat pavadino apskaičiuota didžiausia toleruojama doze — didžiausia doze, kuri, tikėtina, išliks žemiau tyrimo nepriimtino toksiškumo ribos. Formuliuotė svarbi: realiai gydyti pacientai niekada nepasiekė stebėto toksiškumo „lubų“. Tai buvo modeliu paremta rekomendacija II fazės tyrimui, o ne įrodymas, kad dozė apskritai saugi.

Dauguma užregistruotų šalutinių reiškinių buvo lengvi ar vidutiniai. Vienas mirtinas įvykis atitiko dozę ribojančio toksiškumo taisyklę

Nepageidaujamas reiškinys yra bet kokia tyrimo metu užregistruota sveikatos problema; ji nėra automatiškai sukelta gydymo. 1 ir 2 laipsnis reiškia lengvą arba vidutinį, 3 – sunkų, 4 – pavojingą gyvybei, o 5 – mirtį. ReMIND metu 293 iš 332 užregistruotų nepageidaujamų reiškinių, arba 88%, buvo 1 ar 2 laipsnio. Dažni reiškiniai buvo galvos skausmas, nuovargis ar vangumas, pykinimas ir vėmimas. Trims iš 33 infuzuotų pacientų po gydymo atsirado ar pablogėjo 3 laipsnio ar sunkesni reiškiniai, kurie buvo laikyti bent galbūt susijusiais su TAA-T terapija. Dviem pacientams pasireiškė galbūt susiję rimti reiškiniai su edema – smegenų ar naviko srities patinimu.

Vienas iš jų buvo **P27**, pacientas su DIPG. Praėjus dešimčiai dienų po infuzijos, P27 išsivystė hidrocefalija – pavojingas skysčio kaupimasis smegenų viduje – kartu su naviko patinimu ir kvėpavimo sutrikimu. Paciento būklė nepagerėjo gydytojams įdėjus drenavimo vamzdelį, vadinamą šuntu, ir padidinus steroidų dozę patinimui mažinti. Mirtinas įvykis buvo klasifikuotas kaip **5 laipsnio dozę ribojantis toksiškumas**: pagal protokolą jis buvo pakankamai rimtas, kad būtų laikomas argumentu prieš tolesnį dozės didinimą.

Paties tyrimo saugumo duomenys išlaiko du priežastinio priskyrimo vertinimus vienu metu: įvykis laikytas galbūt susijusiu su TAA-T terapija ir tikriausiai susijusiu su pagrindine liga. Vaizdinimo duomenys atitiko naviko progresavimą. Tyrimas negali pasirinkti vienos vienintelės priežasties, ir straipsnis apie jį taip pat neturėtų to daryti.

Po mirties pacientų įtraukimas buvo sustabdytas. Protokolas pakeistas taip, kad reikėtų ilgesnio neurologinio stabilumo laikotarpio ir trumpesnio intervalo tarp spindulinio gydymo ir pirmos infuzijos. Tada dar penki A grupės pacientai buvo gydyti tomis pačiomis ar didesnėmis planuotomis dozėmis, ir daugiau nė vienas įvykis neatitiko dozę ribojančio kriterijaus.

Antrasis rimtas įvykis pasireiškė **P42**, kuriam progresavo difuzinė vidurinės linijos glioma talame – gilioje smegenų dalyje. Praėjus šešiolikai dienų po infuzijos, magnetinio rezonanso tomografija (MRT) parodė smegenų patinimą kartu su galvos skausmu ir kitais neurologiniais simptomais. Po bevacizumabo – vaisto, galinčio sumažinti su naviku susijusį patinimą – simptomai grįžo į ankstesnį lygį. Šis įvykis neatitiko dozę ribojančio kriterijaus.

Visiems keturiems C grupės pacientams pasireiškė laikinos 3 laipsnio citopenijos – mažas kraujo ląstelių skaičius – kurių tikėtasi dėl priešinfuzinės chemoterapijos; šie reiškiniai nebuvo įtraukti į bendrą TAA-T saugumo analizę. Vienas tyrimo dalyvis retrospektyviai atitiko lengvo citokinų išsiskyrimo sindromo kriterijus – viso kūno uždegiminės reakcijos, galinčios pasireikšti aktyvavus imunines ląsteles.

Subalansuota išvada yra ta, kad šiame mažame I fazės tyrime TAA-T gydymas apskritai buvo toleruojamas. Neribotas žodis **saugus** ištrintų tyrimo dydį, du rimtus patinimo atvejus ir mirtiną dozę ribojantį toksiškumą.

Kas nutiko skirtingose grupėse

Dvi klinikinės populiacijos turi likti atskirtos.

A grupėje, DIPG grupėje, progresavimo nepatyrusio išgyvenamumo mediana — laikas iki naviko pablogėjimo ar paciento mirties — buvo **10,5 mėnesio nuo diagnozės**. Bendro išgyvenamumo mediana — laikas, kurį pacientai išliko gyvi — buvo **13,7 mėnesio nuo diagnozės**. Dešimčiai pacientų buvo atlikti skenavimai, kuriuos buvo galima vertinti pagal iš anksto nustatytas protokolo atsako taisykles: šeši turėjo stabilią ligą, t. y. nei pakankamą sumažėjimą atsakui, nei pakankamą augimą progresavimui, o keturi — progresuojančią ligą. **Nė viename skenavime nebuvo pakankamo sumažėjimo ar išnykimo, kad būtų pasiektas iš anksto nustatytas objektyvaus atsako slenkstis.**

B ir C grupėse buvo sujungti keli ne smegenų kamieno navikai, kurie atsinaujino, buvo atsparūs gydymui ar progresavo, nes C grupė buvo per maža prasmingam savarankiškam palyginimui. Čia išgyvenamumas skaičiuotas nuo **pirmos infuzijos**, o ne nuo diagnozės. Laiko iki naviko pablogėjimo ar mirties mediana buvo **5,0 mėnesio**, o bendro išgyvenamumo mediana — **12,7 mėnesio**, abu skaičiuoti nuo infuzijos. Šių įverčių negalima tiesiogiai lyginti su A grupės skaičiais nuo diagnozės.

Iš dešimties B ir C grupių pacientų, turėjusių išmatuojamą ligą — bent vieną naviko sritį, kurią buvo galima patikimai išmatuoti skenavimuose — penki turėjo stabilią ligą, o penki progresuojančią. Vienam iš penkių pacientų, klasifikuotų kaip stabili liga, P37, pažeidimas sumažėjo daugiau nei 90%, tačiau paciento būklė pablogėjo prieš antrą skenavimą, kuris būtų galėjęs tai patvirtinti. Daliniam atsakui reikėjo pakankamo sumažėjimo, kad būtų peržengtas iš anksto nustatytas protokolo slenkstis, ir vėlesnio patvirtinančio skenavimo, todėl protokolas P37 rezultato nepriskyrė daliniam atsakui.

Dar penki pacientai turėjo neišmatuojamą, bet vis tiek įvertinamą ligą: gydytojai galėjo spręsti apie pokyčius skenavimuose, tačiau nė viena naviko sritis neatitiko patikimo dydžio matavimo kriterijų. Geriausi jų atsakai buvo vienas visiškas atsakas, trys stabilios ligos atvejai ir viena progresuojanti liga. Visiškas atsakas priklausė P41. Pagal protokolo vaizdinimo taisykles „visiškas atsakas“ reiškė, kad matoma ne taikinio liga išnyko; tai nereiškė įrodytos išgyjimo. Tai nebuvo patikimas procentinis išmatuojamo taikinio pažeidimo sumažėjimas ir nepriklauso dešimties išmatuojamos ligos pacientų skaičiui.

Kaip radiologai klasifikuoja atsaką?

Prieš gydymą radiologai parenka „taikinius“ pažeidimus, kurie pakankamai dideli ir aiškūs, kad juos būtų galima pakartotinai matuoti. Kita matoma liga gali būti sekama kaip „ne taikinio“ liga nepriskiriant patikimo procentinio pokyčio. Daliniam atsakui reikia pakankamo išmatuotų taikinių pažeidimų sumažėjimo ir paprastai vėlesnio skenavimo jam patvirtinti. Visiškam atsakui reikia išnykimo pagal taikomas vaizdinimo taisykles. Šios žymos apibūdina vaizdus tam tikrais momentais; jos savaime neįrodo išgyjimo ir nepasako, kuris gydymas sukėlė pokytį.

Trys gyvenimai, trys skirtingos įrodymų istorijos

Tris ilgus laikotarpius lengviausia klaidingai suprasti suspaudus juos į vieną sakinį. Jų gydymo istorijos ir matavimo ribos nebuvo vienodos.

Three documented intervals, three different histories

Not to scale. Sequence is shown; attribution is not.

P41 | age 8 | rare astroblastoma

Before: surgery, radiation, re-irradiation, low-dose chemo

3 TAA-T infusions + pre-infusion chemo

Complete response on scan ~1 year after final infusion

>41.2 months disease-free
ONGOING at cutoff

P35 | age 14 | medulloblastoma returned 3 times

Before: tumor returned 3 times, 17 disease-directed treatments

TAA-T infusion

No later antitumor treatment reported

>31.8 months disease-free
FOLLOW-UP ENDED off-study

P36 | age 14 | pediatric glioblastoma that returned

Before: repeat surgery + temozolomide

TAA-T infusion

After: 7 months of a CDK4/6 cell-division blocker

>51.6 months disease-free
ONGOING at cutoff

No line here says the infused cells caused an outcome

Original diagram - The Clean Paper - CC BY 4.0

P41, P35 ir P36 po pirmos infuzijos turėjo ilgus dokumentuotus be ligos laikotarpius, tačiau jų ankstesni gydymai, vėlesni gydymai, pradinio naviko išmatuojamumas ir stebėjimo būsena skyrėsi. Laiko juostos rodo seką, o ne priežastį.


The Clean Paper CC BY 4.0

P41: visišką atsaką su sunkiai įvertinama pradine būkle

P41 į tyrimą pateko būdamas 8 metų su **atsinaujinusia astroblastoma, turinčia EWSR1-BEND2 geno persitvarkymą** — reta naviko savybė, kai susijungia du genai. Navikas buvo trečiajame skilvelyje, vienoje iš skysčių užpildytų ertmių giliai smegenyse. Vaikui buvo atliktas chirurginis pašalinimas ir fokusuota spindulinė terapija, tada antras spindulinio gydymo kursas maždaug septynis mėnesius prieš TAA-T ir mažų dozių chemoterapiją, baigta maždaug prieš du mėnesius iki infuzijos. P41 pateko į C grupę, gavo priešinfuzinę imunitetą mažinančią chemoterapiją ir tada tris TAA-T infuzijas.

Specialistams pakartotinai įvertinus smegenų vaizdus, pradinė liga buvo klasifikuota kaip **neišmatuojama, bet įvertinama**: pakankamai matoma pokyčiui vertinti, bet netinkama patikimam dydžio matavimui. Maždaug po vieno metų nuo paskutinės infuzijos ne taikinio pažeidimo išnykimas pagrindė autorių visiško atsako vaizdinimo klasifikaciją. Šaltinio duomenys rodo be ligos laikotarpį,

ilgesnį nei **41,2 mėnesio nuo pirmos infuzijos**, ir jis tebesitęsė 2026 m. sausio 1 d. duomenų fiksavimo dieną.



Šie po kontrasto T1 svertiniai MRT vaizdai rodo P41 prieš infuziją ir praėjus vieniems metams po paskutinės infuzijos. Oranžiniai kvadratai, pridėti tyrimo autorių, žymi sritį, kurioje prieš infuziją buvo kontrastą kaupiantis pažeidimas ir kurios nebebuvo po metų; autoriai tai klasifikavo kaip visišką atsaką. Išnykimas yra tikras ir viltingas stebėjimas, bet vienas atvejis negali pasakyti, kas jį sukėlė: P41 pradinė liga buvo įvertinama, bet nepatikimai išmatuojama, vaikas prieš TAA-T buvo gavęs pakartotinį švitinimą ir chemoterapiją, atsakas buvo vėlyvas, o tyrimas neturėjo kontrolinės grupės.

Gomez et al. / Nature Medicine CC BY-NC-ND 4.0

Tai ryškiausias tyrimo stebėjimas ir kartu trapiusia jo priežastinė istorija. Natūrali naviko eiga nėra gerai apibrėžta. Gyvybingo naviko kiekį pradžioje buvo sunku patvirtinti. Pakartotinis švitinimas ir chemoterapija buvo atlikti prieš ląstelių terapiją. Atsakas buvo vėlyvas, o kontrolinės grupės nebuvo.

Imuniniai duomenys šios spragos neužpildo. Tyrime naudotas **ELISpot testas** – laboratorinis tyrimas, aptinkantis signalus, kuriuos išskiria atskiros T ląstelės reaguodamos į pasirinktą taikinį. Pagal pradinį tyrimo analizės kriterijų P41 pagamintos ląstelės buvo neigiamos. Teigiamas rezultatas atsirado tik taikant mažiau griežtą pakartotinę analizę ir vėliau buvo pašalintas dėl susirūpinimo klaidingai teigiamu rezultatu; tyrimo plokštelė buvo įtrūkusi, galimas nuotėkis ir neliko produkto pakartotiniam testui. Tyrėjai taip pat negalėjo sekti suleisto ląstelių produkto pagal unikalius T ląstelių receptorių „pirštų atspaudus“, vadinamus **klonotipais**. Produkto neliko, todėl nebuvo galima nustatyti, kurie receptorių atspaudai priklausė infuzijai, o vėlesni mišrūs kraujo imuninių ląstelių mėginiai buvo naudoti tik bendresnei analizei, o ne tiesioginiam produkto ir kraujo palyginimui. Taigi turimi mėginiai negalėjo tiesiogiai nustatyti ilgalaikio infuzijos produkto ląstelių išlikimo ar išsiplėtimo.

Ką gali parodyti šie imuniniai testai?

ELISpot klausia, ar T ląstelės išskiria signalą, kai laboratorijoje susiduria su pasirinktu taikiniu. Receptorių „pirštų atspaudų“ sekimas klausia, ar tas pačias T ląstelių šeimas, esančias infuzijos produkte, vėliau galima aptikti ir išmatuoti kraujyje ar audinyje. Įtinkamas rezultatas galėtų paremti grandinę nuo taikinio atpažinimo iki išlikimo, tačiau vis tiek neįrodytų, kad ląstelės sukėlė klinikinį atsaką. Čia techninės problemos ir trūkstami suderinti mėginiai paliko net ir šią palaikančią grandinę neužbaigtą.

Todėl tyrimas neparodė, kad P41 suleistos ląstelės atpažino numatytus taikinius, liko organizme ar sukėlė visišką atsaką.

P35: daugiau nei 31,8 mėnesio, tada stebėjimas baigėsi

P35 į tyrimą pateko būdamas 14 metų, sirgdamas 4 laipsnio meduloblastoma — aukšto laipsnio smegenų vėžiu, pirmą kartą diagnozuotu 7 metų amžiaus. Iki įtraukimo liga buvo atsinaujinusi tris kartus, o pacientas buvo gavęs **17 į ligą nukreiptų gydymo kursų**.

Po TAA-T straipsnyje nurodomas ilgalaikis stabilumas skenavimuose be papildomo priešnavikinio gydymo. Šaltinio duomenys dokumentuoja daugiau nei **31,8 mėnesio be ligos nuo pirmos infuzijos**. Tuo momentu P35 pasitraukė iš tyrimo. Tyrimo statistikoje stebėjimas buvo **cenzūruotas**: sekimas baigėsi ten, nedarant prielaidų apie tai, kas vyko vėliau. Jo negalima pratęsti iki galutinės straipsnio duomenų fiksavimo datos.

Pradžioje ligos nebuvo galima patikimai išmatuoti ar pakankamai gerai įvertinti vaizduose, kad būtų galima klasifikuoti atsaką. Plati ankstesnio gydymo istorija ir atsitiktinai parinktos kontrolės nebuvimas neleidžia šio laikotarpio priskirti vienai intervencijai.

P36: operacija ir chemoterapija prieš, tikslinė terapija po

P36 į tyrimą pateko būdamas 14 metų su vaikų glioblastoma, kuri atsinaujino po progresavimo taikant standartinę chemoterapiją kartu su spinduline terapija ir eksperimentiniu **PARP inhibitoriumi** — vaistu, skirtu blokuoti vieną kelią, kuriuo naviko ląstelės taiso pažeistą DNR. Navikas progresavo maždaug prieš tris mėnesius iki pirmos infuzijos; prieš TAA-T sekė pakartotinė operacija ir temozolomido chemoterapija.

Aktyvaus TAA-T gydymo metu nebuvo skiriamas į ligą nukreiptas gydymas, tačiau po paskutinės infuzijos P36 septynis mėnesius gavo **CDK4/6 inhibitorių** — tikslinį vaistą, skirtą lėtinti ląstelių dalijimąsi. Šaltinio duomenys dokumentuoja daugiau nei **51,6 mėnesio be ligos nuo pirmos infuzijos**, ir šis laikotarpis tebesitęsė tyrimo duomenų fiksavimo dieną.

Tai ilgiausias iš trijų laikotarpių. Tačiau jis yra gydymo sekoje, apimančioje operaciją, chemoterapiją, TAA-T ir vėlesnę tikslinę terapiją. Tyrimas negali atskirti jų poveikio.

Kodėl „po to“ negali virsti „dėl to“

Šios istorijos svarbios būtent todėl, kad jų ribos laikomos šalia pačių rezultatų.

ReMIND nebuvo randomizuotas, neturėjo tuo pat metu gydytos kontrolinės grupės ir nebuvo pakankamai didelis ar suprojektuotas tikrinti, ar gydymas veikia. B ir C grupės sujungė skirtingas diagnozes, ligos kiekius, ankstesnius gydymus ir tikėtiną ligos eigą; jų sujungimas buvo aprašomasis pasirinkimas, padarytas tyrėjams jau pamačius duomenis. C grupė prieš infuziją gavo imunitetą mažinančią chemoterapiją, B grupė – ne. Kai kurie pacientai po TAA-T gavo papildomą gydymą. Tie, kuriems liga neprogresavo, pradžioje turėjo labai mažai matomo naviko, o tai savaime gali paveikti rezultatą.

ClinicalTrials.gov ir straipsnis dalyvavimą skaičiuoja skirtingai. Registras šiuo metu nurodo 33 įtrauktus žmones ir pagrindinį saugumo rodiklį sutelkia į pirmąsias 42 dienas. Straipsnis ir protokolai prasideda nuo 51 sutikimą davusio žmogaus, nurodo 33 infuzuotus ir pagrindiniais klausimais laiko saugumą, ar gydymą galima pagaminti ir suleisti, bei kokia dozė turėtų būti tiriama toliau. Šis straipsnis naudoja darbo ir protokolo apibrėžimus, o ne jungia dvi skaičiavimo sistemas.

Nė viena iš šių išlygų nepadaro trijų laikotarpių nesvarbių. Jos nustato, kokio pobūdžio svarbą šie įrodymai gali turėti.

Rezultatas yra **preliminarius signalas**: priežastis tirti strategiją tyrime, kuris iš tikrųjų skirtas naujai įvertinti, su aiškesniais biologiniais matavimais ir palyginamąja grupe, galinčia atskirti gydymo poveikį nuo atrankos, laiko ir kitų gydymo priemonių. Tai nėra įrodymas, kad trys vaikai buvo išgydyti T ląstelėmis. Tai nėra įrodymas, kad ląstelės kirto hematoencefalinį barjerą – apsauginę ribą tarp cirkuliuojančio kraujo ir smegenų audinio – ir sunaikino navikus. Tai nėra gydymas, kurio šeimos šiuo metu gali paprašyti už tyrimo ribų.

Kas toliau

Praktiniam ReMIND klausimui – ar gydymą galima pagaminti ir suleisti? – reikia dviejų skaičių. TAA-T produktas pagal pirmą planuotą tyrimo dozę ar didesnę buvo pagamintas 41 iš 48 pacientų, kurių kraujas buvo paimtas, o 33 iš 51 sutikimą davusio paciento gavo bent vieną infuziją. Gamybos procesas tyrimo metu taip pat pagerėjo. Klinikinės istorijos pateisina tolesnį darbą, tačiau kitas tyrimas turi klausti kito klausimo.

Tyrėjams reikės nustatyti, ar ląstelės patikimai atpažįsta numatytus taikinius, kur jos nukeliauja, kiek laiko išlieka ir ar rezultatai geresni nei taikant kitą priežiūrą. Didesnių tyrimų reikės ir retiems nepageidaujamiems reiškiniams apibūdinti. Būsimas naudos tyrimas turės išlaikyti skirtumus, kurių ši I fazė negalėjo išspręsti: naviko tipą, ligos kiekį, chemoterapiją prieš infuziją, ankstesnį gydymą ir gydymą po infuzijos.

Šeimoms, susiduriančioms su vaikų smegenų navikais, neapibrėžtumas nėra tas pats, kas niekas. Trys ilgi laikotarpiai gali būti verti dėmesio nepaverčiant jų pažadu. Pagarbiausia vilties forma yra ta,

kuri sąžiningai pasako, kiek dar nežinoma.

Redakcinė pastaba: ko skaičiai negali sutalpinti

Natūralu norėti, kad ši istorija baigtųsi kiekvieno vaiko išgyjimu. Taip nėra. ReMIND buvo atliekamas ligomis sergantiems vaikams, kurių šeimos gali susidurti su siaubingais pasirinkimais, o gydytojai turi veikti nežinodami, ar eksperimentinis gydymas padės, neturės jokio poveikio ar pakenks.

Tyrime užfiksuoti ilgi be ligos laikotarpiai. Jame taip pat užfiksuoti sunkūs nepageidaujami reiškiniai ir P27 mirtis. Tyrėjai tą mirtiną įvykį laikė galbūt susijusiu su TAA-T ir tikriausiai susijusiu su pagrindine liga; vaizdinimas atitiko progresavimą. Šio neapibrėžtumo po fakto išspręsti negalima ir jo negalima paversti kaltinimu.

Kodas P27 saugo vaiko privatumą. Jis neturėtų paversti vaiko abstrakcija. Už kiekvieno paciento numerio buvo jaunas žmogus, šeima, priimanti sprendimus spaudimo sąlygomis, ir klinikinė komanda, atsakinga už priežiūrą aplinkybėmis, kuriose nė vienas pasirinkimas neturėjo garantijos. Dalyvavimas neįpareigojo nė vieno iš jų sukurti viltingo ar „herojiško“ rezultato, o mirtis netampa priimtina kaina vien todėl, kad vėlesni tyrimai gali iš jos kažko išmokti.

Medicinos pažanga kuriama ne vien gydymais, kurie išgydo. I fazės tyrimas taip pat gali nustatyti, ką galima pagaminti ir suleisti, parinkti dozę tolesniam tyrimui, parodyti, kuriems pavojams reikia dėmesio, ir nurodyti, kaip turi keistis protokolas. Šios žinios neatperka kančios. Jos sukuria pareigą apie ją pranešti sąžiningai, panaudoti ją vėlesniems tyrimams padaryti saugesniems ir prisiminti žmones, kurie tai padarė įmanoma.

Trumpa santrauka

ReMIND buvo ankstyvas I fazės tyrimas su T ląstelėmis, išaugintomis iš kiekvieno dalyvio kraujo ir laboratorijoje išplėstomis taip, kad reaguotų į tris baltymus, kurių gali būti vėžio ląstelėse. Iš 51 sutikimą davusio vaiko ir jauno suaugusiojo, sergančio didelės rizikos smegenų ar nugaros smegenų naviku, 48 buvo paimtas kraujas, 41 pavyko pagaminti produktą pagal pirmą planuotą dozę ar didesnę, o 33 gavo bent vieną infuziją. Dauguma užregistruotų sveikatos problemų buvo lengvos ar vidutinės, tačiau trims infuzuotiems pacientams pasireiškė sunkūs ar sunkesni reiškiniai, laikyti bent galbūt susijusiais; dviem buvo galbūt susijęs rimtas smegenų ar naviko patinimas, įskaitant vieną mirtį, atitikusią tyrimo dozę ribojantį kriterijų. Agresyvių smegenų kamieno navikų grupėje nė viename skenavime nebuvo pakankamo sumažėjimo ar išnykimo, kad būtų pasiektas iš anksto nustatytas atsako slenkstis. Ne smegenų kamieno grupėse trys jauni pacientai turėjo be ligos laikotarpius, ilgesnius nei 31,8, 41,2 ir 51,6 mėnesio nuo pirmos infuzijos, įskaitant vieną visišką atsaką pagal skenavimo kriterijus. Vieno paciento stebėjimas baigėsi jam pasitraukus iš tyrimo; kiti du laikotarpiai duomenų fiksavimo metu tebesitęsė. Tyrimas neturėjo kontrolinės grupės, nebuvo skirtas naudai įrodyti ir negali parodyti, kad eksperimentinė T ląstelių terapija sukėlė šiuos rezultatus.

Be pagražinimų

Ką straipsnis parodo: Personalizuotas T ląstelių produktas, nukreiptas į tris su navikais susijusius baltymus, pagal pirmą planuotą dozę ar didesnę buvo pagamintas 41 iš 48 pacientų, kurių kraujas buvo paimtas; bent vieną infuziją gavo 33 iš 51 sutikimą davusio paciento. Statistinis modelis parinko dozę vėlesniam tyrimui. Tyrimas dokumentavo pasireiškusias sveikatos problemas ir tris ilgus be ligos laikotarpius po infuzijos.

Kas perspektyvu, bet neįrodyta: Kad eksperimentinės T ląstelės prisidėjo prie ligos kontrolės kai kuriems pacientams, ypač tiems, kurių pradžioje matomo naviko buvo labai mažai, ir po kontroliuojamų tyrimų galėtų tapti kliniškai naudingos.

Ko straipsnis neparodo: Kad gydymas išgydė tris vaikus; kad jis sukėlė visišką atsaką ar ilgus laikotarpius; kad P41 suleistos ląstelės buvo parodytos atpažįstančios numatytus taikinius ar išliekančios organizme; kad metodas veikia agresyviame smegenų kamieno navike; ar kad gydymas yra prieinamas arba apskritai saugus.

Pagrindiniai apribojimai: Tai buvo ankstyvas saugumo ir dozės tyrimas, kuriame visi žinojo skiriamą gydymą ir niekas nebuvo atsitiktinai priskirtas palyginamajai grupei; infuzuoti 33 pacientai su skirtingomis diagnozėmis; ankstyvi naudos signalai nebuvo pagrindinis klausimas; išgyvenamumas skirtingose grupėse skaičiuotas nuo skirtingų pradžios taškų; C grupėje buvo tik keturi infuzuoti pacientai ir naudota priešinfuzinė imunitetą mažinanti chemoterapija; kai kurie pacientai gavo kitą gydymą; trys išskirtiniai atvejai neprasisidėjo nuo naviko srities, kurią būtų galima patikimai išmatuoti skenavimuose — P41 vis dar turėjo matomą ligą, kurią gydytojai galėjo sekti, o P35 ir P36 nebuvo galima pakankamai gerai įvertinti atsakui klasifikuoti; laboratoriniai duomenys negalėjo tiesiogiai susieti suleisto ląstelių produkto su vėlesniais rezultatais; ir vienas mirtinas įvykis atitiko griežčiausią tyrimo toksiškumo taisyklę.

Kiek pasitikėjimo turėtų turėti bendras skaitytojas? Didelį pasitikėjimą siaurais rezultatais apie gydymo pagaminimą, suleidimą ir šioje grupėje užregistruotas sveikatos problemas. Didelį pasitikėjimą, kad trys dokumentuoti laikotarpiai įvyko po infuzijos. Mažą pasitikėjimą, kad eksperimentinė T ląstelių terapija šiuos rezultatus sukėlė, nes tyrimas nebuvo suprojektuotas atsakyti į šį klausimą.

Šaltiniai

Gomez et al., Multi-antigen-targeting T cells in pediatric central nervous system tumors: a phase 1 trial, *Nature Medicine* 32, 2481-2493 (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41591-026-04449-9>

Author Correction, *Nature Medicine* (22 July 2026), DOI 10.1038/s41591-026-04593-2

<https://www.nature.com/articles/s41591-026-04593-2>

ClinicalTrials.gov, NCT03652545

<https://clinicaltrials.gov/study/NCT03652545>