



WHAT THE PAPER SAYS · WHAT IT DOESN'T · WHY IT MATTERS

Trei pacienți tineri erau în viață și fără boală la ani după administrarea unor celule T experimentale. Studiul de fază I nu poate arăta ce a produs aceste rezultate

ReMIND a administrat la 33 de copii și tineri cu tumori cerebrale cu risc ridicat celule T cultivate în laborator din sângele fiecărui pacient. Celulele au fost multiplicat pentru a reacționa la trei proteine care pot fi prezente în celulele canceroase. Trei pacienți au avut intervale fără boală de peste 31,8, 41,2 și 51,6 luni de la prima perfuzie, inclusiv un răspuns complet conform criteriilor imagistice. În grupul cu tumori agresive ale trunchiului cerebral, nicio scanare nu a arătat o reducere sau dispariție suficientă pentru a atinge pragul de răspuns predefinit. Același studiu timpuriu de siguranță și doză a înregistrat un deces suficient de grav încât, potrivit regulilor sale, să fie luat în calcul împotriva creșterii dozei. Fără un grup de comparație, studiul nu poate arăta dacă celulele T au produs cele trei rezultate.

Written by Cinzia Vaglio · Cross-checked by Laura Nesso and Matteo · Edited by Laura Nesso and Michele Renda
· Figures by Cinzia Vaglio and Nova Vela · AI-assisted, human-reviewed

Paper: *Multi-antigen-targeting T cells in pediatric central nervous system tumors: a phase 1 trial*, Stephanie Gomez, Rachel A. DiCioccio, Ashley E. Geiger, Melanie L. Grant, Emily Reynolds, Anushree Datar, Chase D. McCann, Jay Tanna, Divyesh Kukadiya, Fahmida Hoq, Anqing Zhang, Patrick J. Hanley, Jennifer L. Webb, Lindsay B. Kilburn, Brian R. Rood, Adriana Fonseca, Holly J. Meany, L. Gilbert Vezina, Roger J. Packer, Conrad Russell Y. Cruz, Catherine M. Bollard & Eugene I. Hwang, *Nature Medicine* 32, 2481-2493 (2026) · DOI: 10.1038/s41591-026-04449-9

Author Correction

Nature Medicine a publicat la 22 iulie 2026 o corecție a autorilor pentru a clarifica formularea declarației privind conflictele de interese. Aici este folosit articolul corectat; datele clinice și concluziile nu au fost modificate.

Author Correction →

Trei pacienți tineri erau în viață și fără boală la ani după administrarea unor celule T experimentale. Studiul de fază I nu poate arăta ce a produs aceste rezultate

Peste 31,8 luni. Peste 41,2 luni. Peste 51,6 luni.

Acestea sunt trei intervale fără boală documentată, măsurate de la prima perfuzie a unui tratament experimental cu celule T. Primul a aparținut unui pacient de 14 ani al cărui meduloblastom recidivase de mai multe ori; observația s-a încheiat când pacientul a părăsit studiul. Al doilea a aparținut unui copil de 8 ani cu un astroblastom rar și era încă în desfășurare la data-limită a lucrării. Al treilea a aparținut unui pacient de 14 ani al cărui glioblastom recidivase și era, de asemenea, încă în desfășurare.

Un număr de luni poate suna clinic și distant. Aici este singurul mod responsabil de a păstra în centru realitatea umană. Lucrarea nu ne spune cum au fost trăiți acei ani. Ne spune însă că trei pacienți tineri cu tumori cerebrale cu risc ridicat erau în viață și fără boală documentată pentru perioade măsurate în ani după ce au primit celulele.

Nu ne spune **că celulele au produs aceste rezultate.**

Această distincție este coloana vertebrală a poveștii. ReMIND a fost un studiu deschis, ceea ce înseamnă că familiile și medicii știau ce tratament era administrat. A fost și nerandomizat: nu exista un grup de comparație desemnat. Și era de fază I, un studiu timpuriu conceput în primul rând pentru a testa dacă celulele T îndreptate împotriva mai multor ținte puteau fi produse, administrate și studiate la o doză tolerabilă — nu dacă prelungeau supraviețuirea. A înregistrat trei istorii clinice excepționale. A înregistrat și faptul că, în grupul cu tumori agresive ale trunchiului cerebral, nicio scanare nu a arătat o reducere sau dispariție suficientă pentru a atinge pragul de răspuns predefinit al studiului, două evenimente grave cu umflare tumorală considerate posibil legate de tratament și un eveniment fatal suficient de grav încât, conform regulilor studiului, să fie luat în calcul împotriva creșterii dozei.

Anii sunt reali. Atribuirea cauzei este incertă. Ambele adevăruri merită să se afle în povestea principală.

Un tratament realizat din sângele fiecărui pacient

Tratamentul se numește **terapie TAA-T**, prescurtare de la celule T specifice antigenelor asociate tumorii. Celulele T sunt celule imune capabile să recunoască anumite fragmente moleculare. Cercetătorii au recoltat sânge de la fiecare participant, apoi au cultivat în laborator propriile celule T ale persoanei, expunându-le la fragmente din trei proteine asociate tumorilor: **WT1** — Wilms tumor 1 —, **PRAME** — antigen exprimat preferențial în melanom — și **survivină**, o proteină implicată în supraviețuirea și diviziunea celulelor. Aceste proteine pot fi prezente în tumorile cerebrale pediatrice și pot funcționa ca indicatoare pentru celulele imune, dar nu sunt exclusive cancerului.

Acestea nu erau **celule CAR-T**, adică celule T modificate genetic pentru a purta un receptor proiectat în laborator — un senzor nou pentru o țintă aleasă. ReMIND a folosit o abordare diferită: a selectat și multiplicat celule T naturale care reacționau la fragmentele celor trei proteine-țintă, fără să le modifice genetic. Celulele au fost testate, congelate și apoi administrate într-o venă. Vizând trei ținte în loc de una singură, cercetătorii sperau să reducă posibilitatea ca o tumoră alcătuită din tipuri diferite de celule să scape deoarece numai o parte dintre celule purtau o anumită țintă.

Cum diferă aceasta de terapia CAR-T?

Producerea CAR-T le oferă celulelor T un receptor artificial nou, astfel încât să poată recunoaște direct un marker ales. Producerea TAA-T nu adaugă un receptor. Ea cultivă o populație mixtă de celule T nemodificate, ale căror receptori existenți răspund la fragmente proteice asociate cu WT1, PRAME sau survivină. Sunt două moduri diferite de a realiza un tratament cu celule imune; dovezile că una dintre abordări funcționează într-un anumit cancer nu pot fi transferate celeilalte.

Este o strategie plauzibilă, nu un mecanism clinic demonstrat. Studiul nu a arătat că celulele administrate au intrat într-o anumită tumoră, au persistat acolo sau au distrus-o. Întrebările sale principale erau mai elementare: se putea produce un preparat utilizabil, putea fi administrat, ce doză ar trebui dusă mai departe și ce toxicități apăreau?

ReMIND a inclus trei grupuri la Children's National Hospital. **Brațul A** a inclus pacienți nou diagnosticați cu **gliom pontin intrinsec difuz (DIPG)**, o tumoră agresivă care crește difuz prin punte, o parte a trunchiului cerebral, și este greu de îndepărtat chirurgical. **Brațul B** a inclus tumori cerebrale și ale măduvei spinării din afara trunchiului cerebral care recidivaseră, rezistaseră tratamentului sau se agravaseră. Niciunul dintre aceste grupuri nu a primit limfodepleție, adică o cură scurtă de chimioterapie care reduce temporar o parte dintre celulele imune existente ale organismului înaintea administrării celulelor imune. **Brațul C** a fost o extindere cu patru pacienți cu tumori recidivate din afara trunchiului cerebral și a adăugat această chimioterapie înainte de perfuzie, folosind fludarabină și ciclofosamidă.

Three arms, two disease settings, two starting points for survival

The groups provide different kinds of information.

ARM A | 11 infused

Newly diagnosed aggressive brainstem tumor (DIPG)

No pre-infusion
immune-cell-reducing chemo
Survival counted
from diagnosis

ARM B | 18 infused

Returned / resisted treatment /
worsened outside the brainstem

No pre-infusion
immune-cell-reducing chemo
Survival counted
from first infusion

ARM C | 4 infused

Returned outside
the brainstem

Immune-cell-reducing
chemo before first infusion
Survival counted
from first infusion

DO NOT COMPARE THE SURVIVAL ESTIMATES DIRECTLY

- arm A starts at diagnosis; arms B/C start at first infusion

Original diagram - The Clean Paper - CC BY 4.0

ReMIND a folosit trei brațe, cu boli diferite și cu utilizări diferite ale chimioterapiei înainte de perfuzie. În brațul A, supraviețuirea a fost măsurată de la diagnostic; în brațele B și C, de la prima perfuzie TAA-T, astfel încât estimările nu pot fi comparate direct.

The Clean Paper CC BY 4.0

Cincizeci și unu au consimțit; treizeci și trei au primit perfuzia

Numărul pacienților s-a redus la fiecare etapă practică.


Cincizeci și unu de pacienți și-au dat consimțământul. De la 48 s-a recoltat sânge. Pentru 41 dintre acești 48 — 85,4% — a fost produs un preparat TAA-T la prima doză planificată a studiului sau la una mai mare. Treizeci și trei au primit cel puțin o perfuzie: 11 în brațul A, 18 în brațul B și 4 în brațul C.

Unii pacienți au devenit neeligibili sau au murit înainte de tratament. Pentru șapte pacienți de la care fusese recoltat sânge nu s-a obținut un preparat utilizabil la primul nivel de doză planificat: în șase cazuri, celulele nu s-au multiplicat suficient în laborator, iar într-un caz preparatul nu a trecut un control obligatoriu de calitate. Nouă pacienți la care producția inițială a fost insuficientă au trebuit repartizați la o doză mai mică.

Procesul s-a îmbunătățit pe parcursul studiului. După recoltări de sânge mai mari și modificări ale metodei de cultivare, toți cei 14 pacienți de la care s-a recoltat sânge după aceste schimbări au produs cel puțin o doză de tratament la prima doză planificată sau peste aceasta. Aceasta este o dovadă autentică despre posibilitatea de a fabrica tratamentul. Nu este un rezultat privind starea pacienților.

The treated group was smaller than the consented group

Every step tests whether the treatment can be made and delivered.



Original diagram - The Clean Paper - CC BY 4.0

Studiul a început cu 51 de pacienți care și-au dat consimțământul și a administrat perfuzii la 33. Cei 18 care lipsesc fac parte din dovezi: recoltarea sângelui, fabricarea tratamentului, îndeplinirea în continuare a criteriilor studiului și agravarea stării de sănătate au influențat cine a ajuns la tratament.

The Clean Paper CC BY 4.0

Folosind modelul său statistic de siguranță a dozei, studiul a ales o țintă de **80 de milioane de celule per doză pentru fiecare metru pătrat de suprafață corporală estimată (8×10^7 celule/m²)**. Suprafața corporală este o estimare clinică a dimensiunii generale a corpului, calculată din înălțime și greutate; nu înseamnă că medicii au măsurat o porțiune de piele, creierul sau tumora. Studiile oncologice și pediatrice o folosesc pentru a ajusta doza planificată la pacienți de mărimi diferite — de exemplu, pentru un pacient cu o suprafață corporală estimată de 1,2 m², doza-țintă pentru o perfuzie ar fi de 96 de milioane de celule. Modelul a etichetat doza de 80 de milioane de celule/m² și drept doza maximă tolerată estimată — cea mai mare doză despre care se preconiza că va rămâne sub pragul de toxicitate inacceptabilă al studiului. Formularea contează: pacienții tratați efectiv nu au atins niciodată un plafon observat al toxicității. A fost o recomandare bazată pe model pentru un studiu de fază II, nu dovada că doza este sigură în sens larg.

Majoritatea efectelor adverse înregistrate au fost ușoare sau moderate. Un eveniment fatal a îndeplinit regula toxicității limitante de doză

Un eveniment advers este orice problemă de sănătate înregistrată în timpul studiului; nu este automat cauzată de tratament. Gradele 1 și 2 înseamnă ușor sau moderat, gradul 3 sever, gradul 4 amenințător de viață, iar gradul 5 deces. În ReMIND, 293 dintre cele 332 de evenimente adverse înregistrate — 88% — au fost de gradul 1 sau 2. Evenimentele frecvente au inclus cefalee, oboseală sau letargie, greață și vărsături. Trei dintre cei 33 de pacienți care au primit perfuzia au avut evenimente de gradul 3 sau mai mare, apărute ori agravate după tratament și considerate cel puțin posibil legate de terapia TAA-T. Doi pacienți au avut evenimente grave considerate posibil legate, care implicau edem — umflare în creier, în jurul acestuia sau al tumorii.

Unul dintre ei a fost **P27**, un pacient cu DIPG. La zece zile după perfuzie, P27 a dezvoltat hidrocefalie, o acumulare periculoasă de lichid în interiorul creierului, împreună cu umflare tumorală și detresă respiratorie. Starea pacientului nu s-a îmbunătățit după ce medicii au montat un tub de drenaj numit șunt și au intensificat tratamentul cu steroizi pentru reducerea edemului. Evenimentul fatal a fost clasificat drept **toxicitate limitantă de doză de gradul 5**: potrivit protocolului, era suficient de grav pentru a fi luat în calcul împotriva unei creșteri suplimentare a dozei.

Registrul de siguranță al studiului păstrează simultan două aprecieri de cauzalitate: evenimentul a fost considerat posibil legat de terapia TAA-T și probabil legat de boala de bază. Imaginile erau compatibile cu progresia tumorii. Studiul nu poate alege o singură cauză, iar un articol despre el nu ar trebui să o facă nici el.

Decesul a dus la întreruperea temporară a recrutării. Protocolul a fost modificat pentru a cere o perioadă mai lungă de stabilitate neurologică și un interval mai scurt între radioterapie și prima perfuzie. Ulterior, alți cinci pacienți din brațul A au fost tratați la aceleași doze planificate sau la doze mai mari, fără un alt eveniment care să îndeplinească regula de limitare a dozei.

Al doilea eveniment grav a apărut la **P42**, care avea un gliom difuz de linie mediană în agravare, localizat în talamus, o regiune profundă a creierului. La șaisprezece zile după perfuzie, imagistica prin rezonanță magnetică (IRM) a arătat edem cerebral însoțit de cefalee și alte simptome neurologice. Simptomele au revenit la nivelul anterior după administrarea bevacizumabului, un medicament care poate reduce edemul asociat tumorii. Evenimentul nu a îndeplinit regula toxicității limitante de doză.

Toți cei patru pacienți din brațul C au dezvoltat citopenii temporare de gradul 3 — număr scăzut al celulelor sanguine — așteptate în urma chimioterapiei administrate înainte de perfuzie; aceste evenimente au fost excluse din analiza combinată a siguranței TAA-T. Un participant din întregul studiu a îndeplinit retrospectiv criteriile pentru un sindrom ușor de eliberare a citokinelor, o reacție inflamatorie în întregul organism care poate apărea când sunt activate celulele imune.

Concluzia calibrată este că tratamentul TAA-T a fost în general tolerabil în această cohortă mică de fază I. Cuvântul neîngrădit **sigur** ar șterge dimensiunea redusă a studiului, cele două evenimente

grave de edem și toxicitatea fatală limitantă de doză.

Ce s-a întâmplat în cohorte

Cele două populații clinice trebuie păstrate separat.

În brațul A, grupul DIPG, supraviețuirea mediană fără progresie — timpul până la agravarea tumorii sau deces — a fost de **10,5 luni de la diagnostic**. Supraviețuirea globală mediană — timpul în care pacienții au rămas în viață — a fost de **13,7 luni de la diagnostic**. Zece pacienți aveau scanări care puteau fi evaluate după regulile de răspuns predefinite ale protocolului: șase aveau boală stabilă, adică nici suficientă reducere pentru a conta drept răspuns, nici suficientă creștere pentru a conta drept progresie, iar patru aveau boală progresivă. **Nicio scanare nu a arătat o reducere sau dispariție suficientă pentru a atinge pragul predefinit al studiului pentru un răspuns obiectiv.**

Brațele B și C au reunit mai multe tumori din afara trunchiului cerebral care recidivaseră, rezistaseră tratamentului sau se agravasera, deoarece brațul C era prea mic pentru o comparație relevantă de unul singur. Aici, supraviețuirea a fost calculată de la **prima perfuzie**, nu de la diagnostic. Timpul median până la agravarea tumorii sau deces a fost de **5,0 luni**, iar timpul median de supraviețuire de **12,7 luni**, ambele măsurate de la perfuzie. Aceste estimări nu pot fi comparate direct cu valorile brațului A, măsurate de la diagnostic.

Dintre cei zece pacienți din brațele B și C cu boală măsurabilă — cel puțin o zonă tumorală care putea fi dimensionată fiabil pe scanări — cinci au avut boală stabilă și cinci boală progresivă. Unul dintre cei cinci clasificați cu boală stabilă, P37, a avut o reducere de peste 90% a leziunii, dar starea lui s-a deteriorat înainte ca o a doua scanare să poată confirma rezultatul. Un răspuns parțial necesită o reducere suficientă pentru a depăși pragul predefinit al protocolului și o scanare ulterioară care să o confirme, astfel încât protocolul nu a clasificat rezultatul lui P37 drept răspuns parțial.

Alți cinci pacienți aveau boală nemăsurabilă, dar totuși evaluabilă: medicii puteau aprecia schimbarea pe scanări, însă nicio zonă tumorală nu îndeplinea criteriile pentru o măsurare fiabilă a dimensiunii. Cele mai bune răspunsuri au fost un răspuns complet, trei cazuri de boală stabilă și unul de boală progresivă. Răspunsul complet a aparținut lui P41. Potrivit regulilor imagistice ale protocolului, „răspuns complet” însemna dispariția bolii vizibile care nu fusese desemnată drept leziune-țintă; nu însemna dovada vindecării. Nu era o reducere procentuală fiabilă a unei leziuni-țintă măsurabile și nu face parte din numărătoarea celor zece pacienți cu boală măsurabilă.

Cum clasifică radiologii un răspuns?

Înainte de tratament, radiologii identifică leziuni „țintă” suficient de mari și clare pentru a fi măsurate repetat. Alte zone vizibile de boală pot fi urmărite drept boală „non-țintă”, fără a li se atribui o schimbare procentuală fiabilă. Un răspuns parțial necesită o reducere suficientă a leziunilor-țintă măsurate și, de obicei, o scanare ulterioară care să o confirme. Un răspuns complet necesită dispariția bolii potrivit criteriilor imagistice aplicabile. Aceste etichete descriu imagini în anumite momente; nu demonstrează singure vindecarea și nu

identifică tratamentul care a produs schimbarea.

Trei vieți, trei istorii diferite ale dovezilor

Cele trei intervale lungi sunt cel mai ușor de interpretat greșit atunci când sunt comprimate într-o singură propoziție. Istoricul tratamentelor și limitele măsurării nu au fost aceleași.

Three documented intervals, three different histories

Not to scale. Sequence is shown; attribution is not.

P41 | age 8 | rare astroblastoma

Before: surgery, radiation, re-irradiation, low-dose chemo

3 TAA-T infusions + pre-infusion chemo

Complete response on scan ~1 year after final infusion

>41.2 months disease-free
ONGOING at cutoff

P35 | age 14 | medulloblastoma returned 3 times

Before: tumor returned 3 times, 17 disease-directed treatments

TAA-T infusion

No later antitumor treatment reported

>31.8 months disease-free
FOLLOW-UP ENDED off-study

P36 | age 14 | pediatric glioblastoma that returned

Before: repeat surgery + temozolomide

TAA-T infusion

After: 7 months of a CDK4/6 cell-division blocker

>51.6 months disease-free
ONGOING at cutoff

No line here says the infused cells caused an outcome

Original diagram - The Clean Paper - CC BY 4.0

P41, P35 și P36 au avut fiecare un interval lung fără boală documentată după prima perfuzie, dar tratamentele anterioare și ulterioare, posibilitatea de măsurare la început și starea urmăririi au fost diferite. Cronologiile arată succesiunea, nu cauzalitatea.


The Clean Paper CC BY 4.0

P41: un răspuns complet cu o situație inițială dificilă

P41 a intrat în studiu la vârsta de 8 ani cu un **astroblastom recidivat care prezenta o rearanjare genetică EWSR1-BEND2**, o caracteristică tumorală rară în care două gene s-au unit. Tumora implica ventriculul al treilea, unul dintre spațiile pline cu lichid din profunzimea creierului. Copilul suferise o rezecție chirurgicală și radioterapie focalizată, apoi o a doua cură de radioterapie cu aproximativ șapte luni înainte de TAA-T și chimioterapie în doză mică, încheiată cu aproximativ două luni înainte de perfuzie. P41 a intrat în brațul C, a primit chimioterapia limfodepletivă premergătoare și apoi trei

perfuzii TAA-T.

După ce specialiștii au recitit scanările cerebrale, boala inițială a fost clasificată drept **nemăsurabilă, dar evaluabilă**: suficient de vizibilă pentru a fi urmărită, dar nepotrivită pentru măsurarea fiabilă a dimensiunii. La aproximativ un an după ultima perfuzie, dispariția leziunii non-țintă a susținut clasificarea imagistică de răspuns complet făcută de autori. Datele-sursă arată un interval fără boală de peste **41,2 luni de la prima perfuzie**, încă în desfășurare la data-limită de 1 ianuarie 2026.



Aceste imagini IRM ponderate T1 după administrarea substanței de contrast îl arată pe P41 înainte de perfuzie și la un an după ultima perfuzie. Pătratele portocalii, adăugate de autorii studiului, marchează regiunea în care o leziune cu captare de contrast era prezentă înainte de perfuzie și absentă la un an; autorii au clasificat rezultatul drept răspuns complet. Dispariția este o observație reală și dăătoare de speranță, dar acest caz singular nu ne poate spune ce a produs-o: boala inițială a lui P41 era evaluabilă, dar nu măsurabilă fiabil, copilul primise reiradiere și chimioterapie înainte de TAA-T, răspunsul a fost întârziat, iar studiul nu avea grup de control.

Gomez et al. / Nature Medicine CC BY-NC-ND 4.0

Aceasta este observația cea mai impresionantă a studiului și, în același timp, povestea sa cauzală cea mai fragilă. Istoria naturală a tumorii nu este definită complet. Cantitatea de tumoră viabilă la început era dificil de confirmat. Reiradierea și chimioterapia au precedat celulele. Răspunsul a apărut târziu și nu exista grup de control.

Dovezile imune nu închid acest gol. Studiul a folosit un **test ELISpot**, un test de laborator care detectează semnalele eliberate de celule T individuale atunci când reacționează la o țintă aleasă. Celulele produse pentru P41 au avut rezultat negativ după regulile de analiză inițiale ale studiului. Un rezultat pozitiv a apărut numai într-o reanaliză mai puțin strictă și a fost ulterior eliminat din cauza temerilor privind un fals pozitiv; placa de test era fisurată, putea exista scurgere și nu mai rămăsese preparat pentru repetarea testului. Cercetătorii nu au putut nici să urmărească celulele administrate prin amprente unice ale receptorilor celulelor T, numite **clonotipuri**. Nu mai rămăsese preparat

pentru a stabili ce amprente aparțineau perfuziei, iar probele ulterioare de celule imune amestecate din sânge au fost folosite numai într-o analiză generală, nu într-o potrivire directă între preparat și sânge. Prin urmare, probele disponibile nu au putut demonstra direct persistența sau expansiunea pe termen lung a celulelor din preparatul perfuzat.

Ce pot arăta aceste teste imune?

ELISpot întreabă dacă celulele T eliberează un semnal când sunt expuse în laborator unei ținte selectate. Urmărirea amprentelor receptorilor întreabă dacă aceleași familii de celule T găsite în preparatul perfuzat pot fi identificate și măsurate ulterior în sânge sau țesut. Un rezultat convingător ar putea susține un lanț de la recunoașterea țintei la persistență, dar nici acesta nu ar demonstra că celulele au provocat un răspuns clinic. Aici, problemele tehnice și lipsa unor probe pereche au lăsat incomplet chiar și acest lanț de susținere.

Studiul nu a demonstrat, așadar, că celulele administrate lui P41 au recunoscut țintele urmărite, au rămas în organism sau au produs răspunsul complet.

P35: peste 31,8 luni, apoi urmărirea s-a încheiat

P35 a intrat în studiu la 14 ani cu meduloblastom de gradul 4, un cancer cerebral de grad înalt, diagnosticat inițial la vârsta de 7 ani. Până la includere, boala recidivase de trei ori, iar pacientul primise **17 tratamente îndreptate împotriva bolii**.

După TAA-T, lucrarea raportează stabilitate prelungită pe scanări, fără tratament antitumoral suplimentar. Datele-sursă documentează un interval fără boală de peste **31,8 luni de la prima perfuzie**. În acel moment, P35 a părăsit studiul. În statistica studiului, observația a fost **cenzurată**: urmărirea s-a oprit acolo, fără nicio presupunere despre ceea ce s-a întâmplat ulterior. Intervalul nu trebuie prelungit până la data-limită finală a lucrării.

La început, boala nu putea fi măsurată fiabil și nici evaluată suficient de bine pe scanări pentru clasificarea unui răspuns. Istoricul extins de tratamente și lipsa unui comparator randomizat fac imposibilă atribuirea intervalului unei singure intervenții.

P36: chirurgie și chimioterapie înainte, tratament țintit după

P36 a intrat la vârsta de 14 ani cu glioblastom pediatric recidivat după progresia sub chimioterapie standard plus radioterapie și un **inhibitor PARP** experimental, un medicament destinat să blocheze una dintre căile folosite de celulele tumorale pentru repararea ADN-ului deteriorat. Tumora a progresat cu aproximativ trei luni înainte de prima perfuzie; înainte de TAA-T au urmat o nouă intervenție chirurgicală și chimioterapie cu temozolomidă.

În timpul tratamentului activ TAA-T nu a fost administrată nicio altă terapie îndreptată împotriva bolii, dar după ultima perfuzie P36 a primit timp de șapte luni un **inhibitor CDK4/6**, un medicament țintit conceput să încetinească diviziunea celulară. Datele-sursă documentează un interval fără boală

de peste **51,6 luni de la prima perfuzie**, încă în desfășurare la data-limită a studiului.

Este cel mai lung dintre cele trei intervale. Se află însă într-o succesiune care include chirurgie, chimioterapie, TAA-T și tratament țintit ulterior. Studiul nu poate separa efectele lor.

De ce „după” nu poate deveni „din cauza”

Aceste istorii contează tocmai fiindcă limitele sunt păstrate lângă ele.

ReMIND nu a fost randomizat, nu a avut un grup de control concomitent și nu a fost suficient de mare sau conceput pentru a testa dacă tratamentul funcționa. Brațele B și C au combinat diagnostice, cantități de boală, tratamente anterioare și evoluții așteptate diferite; reunirea lor a fost o alegere descriptivă făcută după ce cercetătorii au văzut datele. Brațul C a adăugat chimioterapie limfodepletivă înainte de perfuzie, în timp ce brațul B nu a făcut-o. Unii pacienți au urmat terapii suplimentare după TAA-T. Persoanele care au rămas fără progresie aveau foarte puțină tumoră vizibilă la început, ceea ce poate influența în sine rezultatul.

ClinicalTrials.gov și lucrarea numără participarea în mod diferit. Registrul listează în prezent 33 de persoane drept înscrise și își concentrează principala măsură de siguranță asupra primelor 42 de zile. Lucrarea și protocolul pornesc de la 51 de persoane care și-au dat consimțământul, raportează 33 care au primit perfuzia și descriu întrebările principale drept siguranța, posibilitatea de a produce și administra tratamentul și alegerea dozei care trebuie continuată. Acest articol folosește definițiile lucrării și protocolului, fără să combine cele două sisteme de numărare.

Niciuna dintre aceste rezerve nu face cele trei intervale lipsite de importanță. Ele stabilesc tipul de importanță pe care îl poate purta dovada.

Rezultatul este un **semnal preliminar**: un motiv pentru a testa strategia într-un studiu proiectat să estimeze beneficiul, cu măsurători biologice mai clare și un grup de comparație capabil să separe tratamentul de selecția pacienților, momentul intervenției și celelalte îngrijiri. Nu este dovada că trei copii au fost vindecați de celulele T. Nu este dovada că celulele au traversat bariera hemato-encefalică — granița protectoare dintre sângele circulant și țesutul cerebral — și au distrus tumorile. Și nu este un tratament pe care familiile îl pot solicita în prezent în afara cercetării.

Ce urmează

Întrebarea practică a ReMIND — putea fi produs și administrat tratamentul? — are nevoie de două numărători. Un preparat TAA-T la prima doză planificată sau la una mai mare a fost produs pentru 41 dintre cei 48 de pacienți de la care s-a recoltat sânge, în timp ce 33 dintre cele 51 de persoane care au consimțit au primit cel puțin o perfuzie. Procesul de fabricare s-a îmbunătățit și pe parcursul studiului. Istoriile clinice justifică cercetări suplimentare, dar următorul studiu trebuie să pună o altă întrebare.

Cercetătorii vor trebui să stabilească dacă celulele recunosc în mod fiabil țintele urmărite, unde ajung, cât timp persistă și dacă rezultatele se îmbunătățesc față de alte îngrijiri. Vor fi necesare și studii mai mari pentru caracterizarea efectelor adverse neobișnuite. Un studiu viitor conceput să testeze beneficiul trebuie să păstreze distincțiile pe care această fază I nu le-a putut rezolva: tipul tumorii, cantitatea de boală, chimioterapia înainte de perfuzie, tratamentul anterior și tratamentul administrat ulterior.

Pentru familiile care se confruntă cu tumori cerebrale pediatrie, incertitudinea nu este același lucru cu golul. Trei intervale lungi pot merita atenție fără să fie transformate într-o promisiune. Forma cea mai respectuoasă a speranței este cea care spune adevărul despre cât de multe rămân necunoscute.

Notă editorială: ce nu pot purta numerele

Este firesc să ne dorim ca această poveste să se încheie cu vindecarea fiecărui copil. Nu se încheie astfel. ReMIND a fost realizat în boli în care familiile se pot confrunta cu alegeri cumplite, iar medicii trebuie să acționeze fără să știe dacă un tratament experimental va ajuta, nu va avea efect sau va provoca rău.

Studiul a înregistrat intervale lungi fără boală. A înregistrat și evenimente adverse severe și moartea lui P27. Investigatorii au apreciat că evenimentul fatal era posibil legat de TAA-T și probabil legat de boala de bază; imaginile erau compatibile cu progresia. Această incertitudine nu poate fi rezolvată retrospectiv și nu trebuie transformată în vină.

Codul P27 protejează intimitatea unui copil. Nu trebuie să îl transforme într-o abstracție. În spatele fiecărui număr de pacient se afla un tânăr, o familie care lua decizii sub presiune și o echipă clinică responsabilă de îngrijire în circumstanțe în care nicio opțiune nu oferea certitudine. Participarea nu îi obliga pe niciunul dintre ei să producă un rezultat plin de speranță sau „eroic”, iar un deces nu devine un preț acceptabil doar pentru că cercetările ulterioare ar putea învăța din el.

Progresul medical nu este produs numai de tratamentele care vindecă. Un studiu de fază I poate stabili și ce poate fi fabricat și administrat, poate identifica o doză pentru testare ulterioară, poate arăta ce riscuri cer atenție și poate indica modul în care trebuie schimbat un protocol. Această cunoaștere nu răscumpără suferința. Ea creează obligația de a o raporta cu rigoare, de a o folosi pentru a face studiile ulterioare mai sigure și de a-i păstra în memorie pe oamenii care au făcut-o posibilă.

Pe scurt

ReMIND a fost un studiu timpuriu de fază I cu celule T cultivate din sângele fiecărui participant și multiplicat în laborator pentru a reacționa la trei proteine care pot fi prezente în celulele canceroase. Dintre cei 51 de copii și tineri cu tumori cerebrale sau ale măduvei spinării cu risc ridicat care și-au dat consimțământul, 48 au avut sânge recoltat, pentru 41 s-a produs un preparat la prima doză planificată sau peste aceasta, iar 33 au primit cel puțin o perfuzie. Majoritatea problemelor de sănătate înregistrate au fost ușoare sau moderate, dar trei pacienți perfuzați au avut evenimente severe sau mai grave, considerate cel puțin posibil legate; doi au avut evenimente grave cu umflare

cerebrală sau tumorală considerate posibil legate, inclusiv un deces care a îndeplinit regula studiului pentru toxicitatea limitantă de doză. În grupul cu tumori agresive ale trunchiului cerebral, nicio scanare nu a arătat o reducere sau dispariție suficientă pentru a atinge pragul de răspuns predefinit. În grupurile cu tumori din afara trunchiului cerebral, trei pacienți tineri au avut intervale fără boală de peste 31,8, 41,2 și 51,6 luni de la prima perfuzie, inclusiv un răspuns complet conform criteriilor imagistice. Urmărirea s-a încheiat când un pacient a părăsit studiul; celelalte două intervale erau încă în desfășurare la data-limită. Studiul nu a avut grup de control, nu a fost proiectat să stabilească beneficiul și nu poate arăta că terapia experimentală cu celule T a produs aceste rezultate.

Verificare fără exagerări

Ce arată lucrarea: Un preparat personalizat de celule T îndreptat împotriva a trei proteine asociate tumorilor a fost produs la prima doză planificată sau peste aceasta pentru 41 dintre cei 48 de pacienți de la care s-a recoltat sânge; 33 dintre cele 51 de persoane care au consimțit au primit cel puțin o perfuzie. Un model statistic a selectat o doză pentru testare ulterioară. Studiul a documentat problemele de sănătate apărute și a înregistrat trei intervale lungi fără boală după perfuzie.

Ce este promițător, dar nedemonstrat: Că celulele T experimentale au contribuit la controlul bolii la unii pacienți, în special la cei cu foarte puțină tumoră vizibilă la început, și că ar putea deveni utile clinic după testare controlată.

Ce nu arată: Că tratamentul a vindecat trei copii; că a produs răspunsul complet sau intervalele prelungite; că s-a demonstrat că celulele administrate lui P41 recunoșteau țintele urmărite sau rămâneau în organism; că abordarea funcționează în tumora agresivă a trunchiului cerebral; ori că tratamentul este disponibil sau sigur în sens larg.

Limitări principale: A fost un studiu timpuriu de siguranță și doză, în care toți știau tratamentul și nimeni nu a fost repartizat aleatoriu într-un grup de comparație; 33 de pacienți cu diagnostice diferite au primit perfuzia; semnele timpurii de beneficiu nu reprezentau întrebarea principală; supraviețuirea a fost măsurată de la momente diferite în grupuri; brațul C a avut numai patru pacienți perfuzați și a folosit chimioterapie limfodepletivă înainte de perfuzie; unii pacienți au primit alte terapii; cele trei cazuri excepționale nu au început cu o zonă tumorală care să poată fi măsurată fiabil pe scanări — P41 avea totuși boală vizibilă pe care medicii o puteau urmări, în timp ce P35 și P36 nu puteau fi evaluați suficient de bine pentru clasificarea unui răspuns; dovezile de laborator nu au putut lega direct celulele perfuzate de rezultatele ulterioare; iar un eveniment fatal a îndeplinit cea mai severă regulă de toxicitate a studiului.

Câtă încredere ar trebui să aibă un cititor obișnuit? Încredere mare în constatările restrânse privind fabricarea și administrarea tratamentului și problemele de sănătate înregistrate în acest grup. Încredere mare că cele trei intervale documentate au avut loc după perfuzie. Încredere scăzută că terapia experimentală cu celule T a produs acele rezultate, deoarece studiul nu a fost conceput să răspundă la această întrebare.

Surse

Gomez et al., Multi-antigen-targeting T cells in pediatric central nervous system tumors: a phase 1 trial, Nature Medicine 32, 2481-2493 (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41591-026-04449-9>

Author Correction, Nature Medicine (22 July 2026), DOI 10.1038/s41591-026-04593-2

<https://www.nature.com/articles/s41591-026-04593-2>

ClinicalTrials.gov, NCT03652545

<https://clinicaltrials.gov/study/NCT03652545>