



The CLEAN PAPER

WHAT THE PAPER SAYS · WHAT IT DOESN'T · WHY IT MATTERS

Një kore e parë e hollë dhe gjysmë e shkrirë: një model ku Hadeanin e drejtonin përplasjet, jo nxehtësia e brendshme

Eoni i parë i Tokës, Hadeani, la pothuajse asnjë regjistër shkëmbor. Ky studim modelimi pyet si do të dukej korja po të mos injoroheshin përplasjet. Me një model stokastik të fluksit të përplasjeve që bie me kohën dhe simulime të testuara të rrjedhës së nxehtësisë në kore e mantel, autorët gjejnë se nxehtësia e përplasjeve do ta kishte tejkaluar të gjithë nxehtësinë e brendshme të Tokës me të paktën një rend madhësie për pjesën më të madhe të Hadeanit, duke lënë një kore të hollë (nën ~5 km), pjesërisht të shkrirë vetëm disa kilometra poshtë — tepër të dobët, argumentojnë ata, për tektonikë pllakash dhe të prirur të riciklohej në mantel, çka do të shpjegonte pse mbijeton kaq pak material hadean. Ndërsa përplasjet u zbehën pas ~3.9 Ga, korja kontinentale e qëndrueshme mund të formohej, pikërisht kur shfaqen shkëmbinjtë felsikë më të vjetër të mbijetuar — “me gjasë jo rastësi”, sipas formulimit të kujdesshëm të autorëve. Meqë përdorën qëllimisht ngrohje konservatore në kufirin e poshtëm, rezultati cilësor është relativisht i fortë edhe pse numrat e saktë nuk janë të fiksuar. Është një model i fortë dhe koherent i fëmijërisë së Tokës — jo vëzhgim i drejtpërdrejtë.

Written by Lucio Vaglio · Cross-checked by Laura Nesso · Edited by Michele Renda · Figures by Laura Nesso and Nova Vela · AI-assisted, human-reviewed

Paper: *Impact heating and the hidden Hadean*, Tim E. Johnson, Craig O'Neill, Simon Turner, Christopher L. Kirkland, Science (2026), 392:1408-1412 · DOI: [10.1126/science.aeb5402](https://doi.org/10.1126/science.aeb5402)

Kapitulli i historisë së Tokës nga i cili pothuajse nuk kanë mbetur faze

Toka është i vetmi planet që njohim me kontinente — toka të lundrueshme, të pasura me silicë, mbi të cilat jetojmë. Megjithatë, mënyra si u formuan kontinentet e para është një nga problemet më të vjetra të pazgjidhura të gjeologjisë, dhe arsyeja është e pamëshirshme: provat pothuajse janë zhdukur të gjitha.

Eoni i parë i Tokës, Hadeani, shtrihet nga lindja e planetit deri rreth 4.03 miliardë vjet më parë (Ga). Nga ajo gjysmë miliardi vitesh e parë pothuajse asgjë nuk ka mbijetuar. Shkëmbinjtë felsikë më të vjetër të paprekur — të tipit kontinental — janë rreth 4.03 Ga. Disa shkëmbinj bazaltikë shumë të rrallë arrijnë rreth 4.2 Ga. Materiali më i vjetër i çdo lloji është një numër i vogël kristalesh zirkoni — më të famshmit nga Jack Hills në Australinë Perëndimore — të datuar deri në 4.4 Ga. Ky është pothuajse i gjithë arkivi i fëmijërisë së Tokës: pak lokalitete dhe disa minerale të madhësisë së kokrrave të rërës.

Ky studim nuk shton një shkëmb të ri në atë arkiv. Bën diçka tjetër: ndërton një model fizik se si do të dukej korja hadeane nën ato ligje fizike dhe shtron një pyetje që shumica e modeleve të Tokës së hershme e lënë jashtë. Çfarë ndodh kur nuk e injoron më faktin se Toka e hershme bombardohej vazhdimisht?

Përgjigjja e autorëve është e fortë. Për pjesën më të madhe të Hadeanit, nxehtësia e sjellë nga përplasjet do të kishte tejkaluar me shumë të gjithë nxehtësinë e brendshme të Tokës, duke lënë një kore të hollë, pjesërisht të shkrirë — shumë të dobët, argumentojnë ata, për diçka që t'i ngjajë tektonikës moderne të pllakave. Është një model, jo një kujtesë e ruajtur në shkëmb. Por është një model që, për një herë, përpiqet të përfshijë dhunën e epokës që përshkruan.


A model of the Hadean, not a memory of it

The logic is thermal: impacts heat, crust melts, the archive erases itself.

Energy

Impact heat dominates


At least an order of magnitude larger than internal heat for much of the Hadean.



Consequence

Thin, shallowly molten crust


<5 km crust; >30% melt near 5 km in the model.



Record

Most crust recycles

Rare survivors: zircons and oldest rocks.



Around the 4.0-3.9 Ga transition, lasting crust appears.

Në model, nxehtësia e përplasjeve dominon bilancin energjetik, një kore e hollë dhe e shkrirë në cekët riciklon veten, ndërsa korja kontinentale që zgjat shfaqet vetëm rreth kalimit 4.0–3.9 Ga. Është model i Hadeanit, jo kujtim i drejtpërdrejtë i tij.

The Clean Paper CC BY 4.0

Çfarë bënë autorët

Ekipi bashkoi tri përbërës që zakonisht trajtohen veçmas.

Së pari, një **model stokastik të fluksit të përplasjeve** — reshjen e asteroidëve dhe trupave më të mëdhenj që godisnin Sistemin e brendshëm Diellor gjatë Hadeanit dhe Arkeanit të hershëm. E rëndësishme: ky nuk është koncepti i vjetër i një kulmi të vetëm “Bombardimi i Rëndë i Vonë”. Është një fluks shumë i madh në fillim që **bie me kalimin e kohës**, me përplasje të mëdha që ndodhin në mënyrë të rastësishme (stokastike), jo sipas një kalendari. Modeli është rishkallëzuar nga statistikat e përplasjeve hënore dhe të Sistemit të brendshëm Diellor dhe është zgjedhur të jetë në përputhje me spektrat e moshës së zirkoneve dhe provat paleomagnetike të disponueshme.

Së dyti, **simulime gjeodinamike** të mënyrës si lëviz nxehtësia nëpër kore dhe mantelin e sipërm. Përdorën një kod lattice-Boltzmann të testuar (Planet_LB), si në llogaritje të thjeshta 1D të temperaturës sipas thellësisë, ashtu edhe në pamje të plota 2D të konveksionit të mantelit në 4.1 Ga. Modelet përfshijnë burimet e zakonshme të nxehtësisë së brendshme — zbërthimin radioaktiv dhe nxehtësinë nga bërthama — dhe, në mënyrë të rëndësishme, **advексионin magmatik**: nxehtësinë që ngrihet me materialin e shkrirë, gjë që shumë modele termike të kores e lënë jashtë.

Së treti, **modelim të ekuilibrit fazor** për një kore të hershme realiste — një metabasalt hadean të hidratuar nga brezi i gjelbër Nuvvuagittuq — për të përcaktuar në çfarë temperature dhe thellësie një shkëmb i tillë fillon të shkrijë.

Një zgjedhje metodologjike është vendimtare për mënyrën si duhet lexuar punimi: autorët zgjodhën qëllimisht supozime që e bënin më të vështirë arritjen e përfundimit të tyre. Ata përdorën një mantel “jokondritik” me më pak materiale radioaktive që prodhojnë nxehtësi se modeli kondritik standard — më pak se gjysmën e ngrohjes së brendshme —, përdorën norma konservatore ngrohjeje dhe injoruan ngrohjen baticore nga Hëna e re dhe më e afërt. Pra temperaturat e llogaritura të kores janë **minima** — kufij të poshtëm. Nëse ka një prirje, Hadeani real ka të ngjarë të ketë qenë më i nxehtë se modeli i tyre.

Çfarë gjetën

Përplasjet, jo nxehtësia e brendshme, dominuan buxhetin energjetik të Hadeanit. Kur nxehtësia nga përplasjet integrohet në kohë, ajo e tejkalon shumë kontributin e brendshëm — me të paktën një rend madhësie për pjesën më të madhe të Hadeanit. Në këtë pamje, ngrohja nga përplasjet, jo zbërthimi radioaktiv, është motori kryesor i tektonikës së hershme dhe bëhet faktor dytësor vetëm

pas rreth **3.9 Ga**.

Kjo nxehtësi e mbajti koren të hollë dhe të shkrirë afër sipërfaqes. Pa përplasjet dhe adveksionin e materialit të shkrirë, modeli jep një kore hadeane pjesërisht të shkrirë vetëm poshtë rreth 10–15 km. Kur shtohet ngrohja nga përplasjet, zona e shkrirjes ngrihet ndjeshëm: korja bëhet pjesërisht e shkrirë vetëm **disa kilometra nën sipërfaqe** (afërsisht poshtë 2–5 km). Rreth 5 km thellësi, modelet parashikojnë më shumë se 30% material të shkrirë — gjendje në të cilën shkëmbi është shumë i dobët për t'u sjellë si pllakë e ngurtë. Në 5–10 km, temperatura rreth 1000–1100°C do ta linte koren gjerësisht të shkrirë pothuajse pavarësisht nga përbërja. Pjesa e ngurtë e mbijetuar e kores do të kishte qenë **e hollë, më pak se rreth 5 km**.

Një kore gjysmë e shkrirë e fshin veten. Shkrirja e gjerë lejon që materiali më i dendur, i pasur me hekur dhe magnez, të fundoset dhe të ndahet, ndërsa shkrirjet më të lehta, të pasura me silicë, ngrihen. Me kalimin e kohës kjo e çon përbërjen mesatare të kores drejt materialeve më të evoluara dhe më të pasura me silicë — duke prodhuar edhe shkrirje felsike nga të cilat mund të kristalizohet zirkoni. Pothuajse e gjithë kjo kore e hollë më pas do të riciklohej poshtë në mantelin konvektiv, në përputhje me regjistrin kimik dhe izotopik. Në këtë model, mungesa pothuajse totale e shkëmbinjve hadeanë nuk është thjesht një boshllëk i të dhënave — është **parashikim**. Shkëmbinjtë 4.2 Ga dhe zirkonet 4.4 Ga janë të mbijetuarit e rrallë të një koreje që në pjesën më të madhe shkatërrohej po aq shpejt sa formohej.

Fundi i bombardimit përputhet me shfaqjen e kontinenteve të qëndrueshme. Ndërsa bombardimi zbehej gjatë kalimit 4.0–3.9 Ga, korja më në fund mund të trashej dhe të zgjaste. Shkëmbinjtë kontinentalë më të vjetër të mbijetuar shfaqen rreth të njëjtit kalim. Autorët e formulojnë me kujdes: fakti që korja kontinentale e qëndrueshme shfaqet rreth kësaj kohe është “me gjasë jo rastësi”.

Përfundimi kryesor i tyre: në këto kushte — kore e hollë, e shkrirë disa kilometra nën sipërfaqe — **tektonika e pllakave në Hadean është e pamundur të ketë qenë e ngjashme me modernen dhe, sipas tyre, është e pamundur në praktikë**.

Punimi shpjegon edhe pse studime më të hershme kishin arritur në përfundimin e kundërt. Studime të mëparshme me përplasje stokastike kishin gjetur efekt të vogël, me më pak se 2.5% të kores të shkrirë në çdo moment. Ato kishin lënë jashtë dy gjëra që ky model i përfshin: efektin global të përplasjeve të mëdha mbi shkrirjen e thellë në mantel dhe transportin lart të kësaj nxehtësie nga magma që ngrihet. Kur këto përfshihen, pamja termike ndryshon rrënjësisht.

Pse një model nuk është kujtim

Gjithçka më sipër është dalje nga simulimet, jo lexim nga shkëmbinjtë hadeanë — sepse pothuajse të gjithë ata shkëmbinjtë nuk ekzistojnë më. Kjo nuk e bën rezultatin të dobët, por përcakton çfarë lloj rezultati është.

Zinxhiri është ky: një **model** i fluksit të përplasjeve ushqen një **model** të rrjedhës së nxehtësisë në mantel dhe kore, i kontrolluar kundrejt një **modeli** se si shkrihet një shkëmb i caktuar. Çdo hallkë është e motivuar fizikisht dhe, kur është e mundur, e testuar; por e tëra është një argument koherent

se si **duhej** të dukej Hadeani nën fizikë të besueshme, jo një matje se si **ishte** realisht.

Pikërisht për këtë supozimet konservatore të autorëve kanë rëndësi. Meqë zgjodhën ngrohje në kufirin e poshtëm dhe përsëri morën një kore gjerësisht të shkrirë pranë sipërfaqes, përfundimi cilësor — korja hadeane ishte e nxehtë dhe e dobët — është relativisht i qëndrueshëm ndaj zgjedhjeve të tyre. Ajo që **nuk** përcaktohet me saktësi janë numrat: gradientët e saktë termikë, përqindjet e sakta të shkrirjes dhe trashësia e saktë e kores. Drejtimi i rezultatit mund të lexohet si i fortë; shifrat e detajuara duhen mbajtur si të përkohshme.

Çfarë *nuk* provon kjo

- **Nuk vëzhgon drejtpërdrejt koren hadeane.** Shkëmbin nga kjo epokë pothuajse nuk ekzistojnë; ky është rezultat modelimi për atë që nënkupton fizika, jo matje.
- **Nuk mbështetet në një “Bombardim të Rëndë të Vonë”.** Fluksi i përplasjeve në model bie gradualisht dhe është stokastik — modeli nuk kërkon dhe nuk përdor një kulm të papritur bombardimi.
- **Nuk e mbyll debatin për tektonikën e pllakave.** “E pamundur” këtu është një inferencë e fortë dhe e motivuar fizikisht në favor të një Toke të hershme me kapak të palëvizshëm ose të butë, por regjimi tektonik i Hadeanit mbetet realisht i debatueshëm.
- **Nuk provon se përplasjet shkaktuan shfaqjen e kontinenteve** rreth kalimit 4.0–3.9 Ga. Përputhja kohore është një lidhje e fortë që vetë autorët e quajnë “me gjasë jo rastësi” — gjuhë e kujdesshme për një korrelacion bindës, jo shkak të demonstruar.
- Zirkonet e Jack Hills **nuk janë kontinente të ruajtura.** Janë kokrra të rralla që tregojnë se material felsik dhe ujë ekzistonin herët; ideja e modelit është pikërisht se korja që i krijoi u riciklua kryesisht.
- **Nuk rindërton një histori të plotë të Tokës së hershme.** Simulimet janë të idealizuara — profile 1D dhe prerje ekuatoriale 2D, me përplasje të përqendruara afër ekuatorit dhe të trajtuara si pamje në kohë — jo model i plotë katërdimensional i planetit.

Sa e fortë është prova?

Për pretendimin qendror — se ngrohja nga përplasjet ishte kontroll i rendit të parë mbi koren hadeane, duke e mbajtur të hollë dhe të shkrirë në cekët — argumenti është koherent dhe, në një kuptim të rëndësishëm, konservator. Përdor kod gjeodinamik të testuar, hyrje fizikisht të arsyeshme dhe supozime të kufirit të poshtëm, dhe përfshin një burim nxehtësie që shumica e modeleve të mëparshme thjesht e injoronin. Fiton besueshmëri edhe sepse shpjegon dy fakte të vështira njëkohësisht: pse pothuajse asnjë shkëmb më i vjetër se ~4 Ga nuk mbijeton (riciklim pothuajse total) dhe pse korja e qëndrueshme shfaqet pikërisht kur bombardimi zbehet.



Jack Hills në Australinë Perëndimore, parë nga instrumenti ASTER i NASA-s. Zirkonet nga kjo zonë përfshijnë disa nga materialet më të vjetra të njohura të mbijetuara nga korja e hershme e Tokës — të dhëna të vogla nga një eon shkëmbinjtë e të cilit janë fshirë pothuajse tërësisht.

NASA/GSFC/METI/ERSDAC/JAROS, and U.S./Japan ASTER Science Team fair-use

Kufizimet janë po aq të qarta dhe janë kufizimet e çdo modeli për kohë kaq të thella: kemi modele mbi modele, të ankoruara në një regjistër shkëmbor shumë të varfër, dhe përfundimi më i cituar — “tektonika e pllakave është e pamundur” — është inferencë, jo vëzhgim. Qëndrimi i arsyeshëm është ta trajtojmë si hipotezë të fortë dhe të arsyetuar mirë që e riformulon Hadeanin dhe fton të tjerët të testojnë supozimet e saj — sidomos zgjedhjen e modelit të fluksit të përplasjeve — jo si një çështje të mbyllur.

Përmbledhja më e dobishme nuk është as “kështu ishte Hadeani”, as “është vetëm simulim”. Është: me fizikë të besueshme dhe konservatore, një Tokë e hershme nën bombardim intensiv do të kishte një kore të hollë, pjesërisht të shkrirë dhe vetë-ricikluese — dhe kjo ide e vetme shpjegon çuditërisht shumë nga ajo pak që mund të shohim.

Pse ka rëndësi

Imazhi popullor i Tokës së hershme lëkundet shpesh mes dy ekstremeve: një botë ujore e qetë me tektonikë pllakash pothuajse si sot, ose një planet ferri i mbuluar me lavë. Ky studim vizaton një mes fizikisht të motivuar: një kore të hollë, të rishkrirë vazhdimisht disa kilometra poshtë sipërfaqes, që shkatërrohej dhe rindërtohej pa pushim, me përplasjet — jo nxehtësinë e brendshme — që përcaktonin kushtet.

Ky riformulim bën punë reale. Ofron një mekanizëm për dy nga faktet më të mëdha të fëmijërisë së Tokës — mungesën pothuajse totale të regjistrimit shkëmbor dhe kohën kur shfaqen kontinentet e para të qëndrueshme — dhe vendos në qendër një proces që zakonisht lihet në periferi, ngrohjen nga përplasjet. Nëse qëndron, ndryshon mënyrën si mendojmë për kohën kur Toka u bë vërtet një planet me kontinente të qëndrueshme dhe mund të ketë pasojë edhe për botë të tjera shkëmbore të formuara nën bombardimet e tyre.

Asgjë nga kjo nuk kërkon që modeli të jetë fjala e fundit. Duhet vetëm të jetë një hipotezë mjaft e mirë për t'u testuar — dhe, duke u lidhur me regjistrin e mbijetuar të zirkoneve dhe izotopeve, është. “Hadeani i fshehur” është pikërisht ideja: një epokë që mund ta arrijmë kryesisht me modelim, sepse ajo epokë fshihi vetë provat e veta.

Përmbledhje e shkurtër

Eoni i parë i Tokës, Hadeani (para ~4.03 Ga), la pothuajse asnjë regjistër shkëmbor. Ky studim modeli pyet si do të dukej korja po të përfshihej një burim nxehtësie që zakonisht lihet jashtë: përplasjet. Duke përdorur një model stokastik të fluksit të përplasjeve që bie me kohën dhe simulime të testuara 1D dhe 2D të rrjedhës së nxehtësisë në kore e mantel (përfshirë nxehtësinë e transportuar nga magma që ngrihet), autorët gjejnë se nxehtësia e integruar nga përplasjet do ta kishte tejkaluar gjithë nxehtësinë e brendshme të Tokës me të paktën një rend madhësie për pjesën më të madhe të Hadeanit. Pasoja është një kore e hollë (nën ~5 km), pjesërisht e shkrirë vetëm disa kilometra nën sipërfaqe dhe, rreth 5 km thellësi, më shumë se 30% e shkrirë — shumë e dobët për të mbajtur tektonikë pllakash, të cilën autorët e konsiderojnë të pamundur për Hadeanin. Një kore e tillë do të riciklohej kryesisht në mantel, duke shpjeguar pse mbijeton kaq pak material hadean; ndërsa përplasjet u zbehën gjatë kalimit 4.0–3.9 Ga, korja kontinentale e qëndrueshme mund të formohej pikërisht rreth kohës kur shfaqen shkëmbinjtë felsikë më të vjetër të mbijetuar — “me gjasë jo rastësi”. Meqë autorët përdorën qëllimisht ngrohje konservatore, në kufirin e poshtëm, përfundimi cilësor është relativisht i fortë edhe pse numrat e saktë nuk janë të fiksuar. Është një model i fortë dhe koherent i fëmijërisë së Tokës — jo vëzhgim i drejtpërdrejtë.

Kontroll pa teprime

Çfarë tregon punimi: Në simulime fizikisht të motivuara që përfshijnë ngrohjen nga përplasjet dhe transportin magmatik të nxehtësisë, korja hadeane del e hollë dhe pjesërisht e shkrirë vetëm disa kilometra në sipërfaqe, e dominuar nga nxehtësia e përplasjeve dhe jo ajo e brendshme, kryesisht e ricikluar në mantel dhe — në këtë model — e paaftë për të mbajtur tektonikë pllakash.

Çfarë është e besueshme, por jo e provuar: Që përplasjet janë arsyeja pse kontinentet e qëndrueshme shfaqen rreth 3.9 Ga; që Hadeani ishte një botë me kapak të palëvizshëm ose të butë dhe jo me tektonikë të hershme pllakash; që pothuajse asnjë shkëmb hadean nuk mbijeton pikërisht sepse korja e shkrirë riciklohej vazhdimisht.

Çfarë nuk tregon: Matje të drejtpërdrejtë të kores hadeane; përgjigje përfundimtare për debatin e tektonikës së pllakave; lidhje shkakësore të demonstruar mes zbehjes së bombardimit dhe kontinenteve të para; se zirkonet e Jack Hills përfaqësojnë kontinente të ruajtura; një model të plotë të planetit të hershëm.

Kufizimet kryesore: Regjistri shkëmbor hadean pothuajse mungon, prandaj rezultati është model i kufizuar nga shumë pak të dhëna; vendos modele mbi modele (fluksi i përplasjeve → gjeodinamikë → ekuilibra fazorë); vetë fluksi i përplasjeve është një zgjedhje përfaqësuese dhe e pasigurt; simulimet janë të idealizuara (prerje 1D dhe 2D ekuatoriale, pamje në kohë). Supozimet konservatore të kufirit të poshtëm e forcojnë përfundimin cilësor, por nuk i bëjnë të sakta gradientët termikë të veçantë.

Sa besim duhet të ketë një lexues i përgjithshëm? Të lartë se, sipas fizikës së besueshme, një Tokë e hershme nën bombardim të rëndë do të kishte një kore të nxehtë, të hollë dhe pjesërisht të shkrirë pranë sipërfaqes. Mesatar se kjo e bën tektonikën e pllakave në Hadean të pamundur dhe shpjegon regjistrin e munguar shkëmbor. Të ulët për çdo pretendim se kjo **provon** si u formuan kontinentet ose saktësisht kur — është një model i fortë dhe konservator që e riformulon Hadeanin, jo një vështrim i drejtpërdrejtë mbi të.

Burimet

Johnson, O'Neill, Turner & Kirkland, Science 392:1408-1412 (2026)
<https://doi.org/10.1126/science.aeb5402>