




The CLEAN PAPER

WHAT THE PAPER SAYS · WHAT IT DOESN'T · WHY IT MATTERS

K2-18 b: distanca mes një sinjali të dobët dhe një titulli të madh

Në prill 2025, vëzhgimet me JWST të sub-Neptunit K2-18 b u raportuan si shenjat më të forta të jetës të gjetura deri atëherë jashtë Sistemit Diellor. Vetë punimi ishte shumë më i kujdesshëm: një sinjal rreth 3σ — nën pragun edhe për një zbulim të fortë — se mund të jetë e pranishme njëra nga dy molekula të ngjashme me squfur, bioshënja të mundshme, në një planet natyra oqeanike e banueshme e të cilit është vetë e pasigurt. Autorët diskutojnë burime jobiologjike dhe kërkojnë më shumë të dhëna; ekiye të pavarura më pas e kanë gjetur provën edhe më të dobët. Një matje reale, jo zbulimi i jetës.

Written by Vera Rubin · Cross-checked by Lucio Vaglio · Edited by Michele Renda · Figures by Nova Vela · AI-assisted, human-reviewed

Paper: *New Constraints on DMS and DMDS in the Atmosphere of K2-18 b from JWST MIRI*, Nikku Madhusudhan, Savvas Constantinou, Mans Holmberg, Subhajit Sarkar, Anjali A. A. Piette, and Julianne I. Moses, *The Astrophysical Journal Letters* 983, L40 (2025) · DOI: 10.3847/2041-8213/adc1c8

Distanca mes një sinjali të dobët dhe një titulli të madh

Në prill 2025, një planet 124 vite-dritë larg u bë për pak kohë bota më e famshme në qiell. Një ekip i drejtuar nga Nikku Madhusudhan raportoi se Teleskopi Hapësinor James Webb kishte kapur, në atmosferën e sub-Neptunit K2-18 b, një gjurmë të mundshme të dimetil sulfidi — një molekulë që në Tokë prodhohet pothuajse tërësisht nga organizmat e gjallë, sidomos planktoni oqeanik. Mbulimi mediatik që pasoi përdori fjalët më të mëdha të mundshme: shenjat më të forta të jetës jashtë Sistemit Diellor të gjetura ndonjëherë. Punimi vetë ishte shumë më i kujdesshëm, dhe hendeku mes këtyre dy gjërave është e gjithë historia.

K2-18 b është vërtetë interesant. Ka rreth 8.6 herë masën e Tokës dhe 2.6 herë rrezen e saj, dhe orbiton në zonën e butë të një ylli të vogël të kuq. Një ide për planetë të tillë është se mund të jenë botë *hycean* — me një oqean global nën një atmosferë të trashë hidrogjeni — gjë që do t'i bënte objektiva relativisht të mëdhenj dhe të vëzhgueshëm për kërkimin e jetës. Por ky identitet nuk është vendosur: të njëjtat matje janë gjithashtu në përputhje me një mini-Neptun ose një “xhuxh gazi” shkëmbor, dhe çfarë është në të vërtetë K2-18 b mbetet pyetje e hapur. Interpretimi si botë oqeanike e banueshme është hipotezë shpresëdhënëse, jo fakt i vendosur.

Në këtë sfond, punimi shton një pjesë të re prove, nga një pjesë e spektrit — infra e kuqe e mesme, afërsisht 6 deri 12 mikrometra — që vëzhgimet e mëparshme të K2-18 b nuk e kishin mbuluar. Mënyra e ndershme për ta përshkruar këtë provë është me shifrat e punimit, jo me mbiemrat e titujve.

Punimi raporton një sinjal statistikor rreth 3σ se *njëra prej dy* molekulave të ngjashme mund të jetë e pranishme — nën pragun që shkencëtarët zakonisht kërkojnë edhe për ta quajtur diçka një zbulim të fortë, dhe disa hapa larg një shenje jete. Pikërisht distanca mes kësaj dhe “u gjet jetë” është vendi ku leximi i kujdesshëm ka rëndësi.

Çfarë nënkuptojnë këtu DMS, “bioshënjë” dhe “ 3σ ”

Dimetil sulfidi (DMS) dhe dimetil disulfidi (DMDS) janë molekula që përmbajnë squfur. Në Tokë prodhohen në masë dërrmuese nga jeta — sidomos mikrobet detare — dhe nuk prodhohen në sasi të mëdha nga kimia e zakonshme jobiologjike. Kjo i bën *bioshënja kandidatë*: gaze që, në kontekstin e duhur, mund të tregojnë drejt biologjisë. Fjala “kandidate” është thelbësore.

Një bioshënjë nuk është zbulim, dhe një zbulim nuk është jetë. Të gjesh një molekulë është një gjë; të tregosh se ajo është vërtetë aty (dhe jo artefakt modeli apo veçori instrumenti) është një tjetër; dhe të tregosh se jeta është shpjegimi më i mirë — e jo ndonjë kimi jobiologjike — është një hap i tretë, shumë më i vështirë. Secili mund të dështojë veçmas.

“ 3σ ” mat sa pak e mundshme është që një sinjal të jetë thjesht rastësi e zhurmës — këtu, shumë përafërsisht, një pjesë e vogël e një për qind. Tingëllon e fortë, por në fizikë dhe astronomi 3σ është niveli i një *sinjali të mundshëm*: për të pretenduar zbulim zakonisht kërkohet 5σ , dhe edhe kjo do të ishte pretendim për molekulën, jo për jetën. Autorët e thonë vetë se prova e tyre është “në skajin e poshtëm të robustësisë që kërkohet zakonisht për prova shkencore”.

Dimetil sulfidi (DMS) dhe dimetil disulfidi (DMDS) janë molekula të vogla me sqfuri që ndryshojnë vetëm nga një atom sqfuri. Punimi JWST/MIRI raporton veçori të mundshme spektrale në përputhje me këto molekula — por jo me rëndësi statistikore të mjaftueshme për një zbulim të sigurt, dhe të dhënat nuk i dallojnë dot nga njëra-tjetra.

Çfarë bënë autorët

- Vëzhguan K2-18 b me instrumentin MIRI të JWST në modalitet rezolucioni të ulët, duke matur spektrin e transmetimit nga rreth 6 në 12 mikrometra — një interval gjatësh valësh që të dhënat e mëparshme në infra të kuqe të afërt nuk e mbulonin.
- Përpunuan të dhënat me dy pipeline të pavarur dhe kryen shumë kontrolle robuste, duke hequr në mënyrë konservative pjesën më të zhurmshme të spektrit nën 5.6 mikrometra.
- Përshtatën spektrin me modele atmosferike, duke testuar 20 molekula kandidate për të parë cilat mund të shpjegojnë formën e veçorive.
- Krahasuan rëndësinë statistikore të një modeli vetëm me DMS, vetëm me DMDS dhe të një modeli të kombinuar DMS+DMDS me një spektër pa veçori, në të dy pipeline-t.
- I kushtuan seksione të veçanta rezultateve false pozitive — nëse kimia jobiologjike mund t'i prodhojë këto molekula — dhe asaj që do të duhej për ta forcuar ose rrëzuar rezultatin.

Çfarë gjetën

- Spektri në infra të kuqe të mesme nuk është i sheshtë: ndaj modelit kanonik të autorëve devijon nga një vijë pa veçori me 3.4σ . Diçka po i jep formë spektrit.
- Nga 20 molekulat e testuara, autorët raportojnë se veçoritë shpjegohen më mirë nga DMS dhe/ose DMDS, me prova rreth 3σ (përshtatjet individuale variojnë nga 2.9σ në 3.2σ në dy pipeline-t).
- Bollëku i nxjerrë nga modeli është i lartë — i rendit 10 pjesë për milion në vëllim — për të paktën njërin prej dy molekulave.
- Të dhënat nuk dallojnë DMS nga DMDS: dy molekulat janë të degjeneruara në spektër, kështu që edhe nëse e marrim sinjalin si real, mbetet e pazgjidhur *cila* molekulë është.
- Sinjali i mëparshëm i DMS në infra të kuqe të afërt ishte i dobët (rreth 2σ) dhe i ndjeshëm ndaj parametrave të instrumentit; ky është një burim i pavarur prove nga instrument dhe interval gjatësh vale tjetër, prandaj autorët e shohin si hap përpara.

Çfarë nuk provon

- **Nuk është zbulim i konfirmuar.** Rreth 3σ është sinjal i mundshëm, jo 5σ që zakonisht kërkohet edhe për të thënë se molekula është realisht aty — gjë që autorët e theksojnë vetë, duke e quajtur rezultatin me robustësi të ulët dhe që kërkon verifikim.
- **Nuk identifikon një molekulë specifike.** Degjenerimi DMS/DMDS do të thotë se të dhënat mbësht-

esin “njërën nga këto dy”, jo njërën në veçanti.

- **Nuk tregon jetë.** DMS dhe DMDS janë vetëm bioshënja të mundshme. Seksioni i punimit për rezultatet false pozitive vëren se molekula të tilla mund të formohen abiotikisht (në eksperimente laboratorike, dhe DMS është parë edhe në një kometë) dhe thotë qartë se një bioshënjë bindëse kërkon të vlerësohen së bashku robustësia, konteksti mjedisor dhe burimet false pozitive — dhe “ka pak gjasa të jetë e menjëhershme ose e paqartë”.
- **Nuk përcakton se K2-18 b është botë oqeanike e banueshme.** Interpretimi hycean është vetëm një nga disa që të dhënat globale lejojnë dhe mbetet i debatueshëm.
- Identifikimi molekular mbështetet në matje laboratorike të mënyrës si këto gaze përthithin dritën — seksione efikase që autorët thonë se duhen matur më saktë.

Sa e fortë është prova

- **Një sinjal real në spektër, por me kuptim ende të dobët të përcaktuar.** Fakti që spektri në infra të kuqe të mesme nuk është pa veçori (3.4σ) është pjesa më e fortë; kalimi nga “ka veçori” te “janë DMS dhe/ose DMDS” e pastaj te “kjo mund të lidhet me jetë” bëhet gjithnjë e më i dobët në çdo hap.
- **Autorët janë të kujdesshëm; amplifikimi erdhi nga jashtë.** Punimi përdor vazhdimisht formulime si “e mundshme”, “e përkohshme”, “nevojitet punë e mëtejshme” dhe vëren se me vetëm 8–24 orë të tjera JWST rëndësia mund të rritet në $4\text{--}5\sigma$ ose mund të mos riprodhohet fare. Korniza e sigurt “shenja jete” erdhi nga mbulimi mediatik, jo nga pretendimi shkencor.
- **Kontrolli i pavarur e ka dobësuar pretendimin.** Në muajt pas publikimit, ekipe të tjera rianalizuan të njëjtat të dhëna dhe nuk gjetën sinjal robust. Taylor (2025) pyeti drejtpërdrejt nëse spektri MIRI përmban fare veçori spektrale reale dhe nuk gjeti prova të forta statistikore — vetëm rreth 2σ ndaj një vije të sheshtë. Një rianalizë e përbashkët e NIRISS, NIRSpec dhe MIRI nga Luque dhe kolegët (2025) raportoi *prova të pamjaftueshme* për DMS ose DMDS, pa zbulim statistikisht domethënës në një varg përpunimesh të të dhënave. Një vlerësim më i gjerë i drejtuar nga Stevenson (2025) arriti në përfundimin se të dhënat nuk plotësojnë standardet për një bioshënjë dhe ia atribuoi veçoritë në infra të kuqe të mesme sistematikave instrumentale. Ky debat nuk është dështim i procesit; është procesi, dhe është arsyeja pse një sinjal 3σ është fillim, jo përfundim.

Pse ka rëndësi

Ky është një nga shembujt më të qartë të viteve të fundit se si një rezultat i kujdesshëm dhe një titull që ikën përpara mund të shfaqen në të njëjtën ditë. Shkenca këtu është reale dhe ia vlen: JWST tani mund të hetojë atmosferat e planetëve relativisht të vegjël e të butë, dhe molekulat me squfur janë objektiva të arsyeshëm. Por statusi i ndershëm i K2-18 b është një sinjal i zbehtë dhe i paqartë për njërën nga dy molekulat, në një planet natyra e të cilit vetë është e pasigurt, me një nivel besimi që zbuluesit e quajnë të ulët — dhe që analiza të tjera e kanë kundërshtuar. Asgjë nga kjo nuk është zhgënjyese përveçse nëse të ishte premtuar se do të gjenim alienë. Mënyra e duhur për ta mbajtur këtë rezultat është mënyra si funksionon realisht fusha: një fill interesant për t’u ndjekur me më

shumë kohë JWST dhe kontrole të pavarura në vitet e ardhshme. Kërkimi i jetës tjetërkund nuk do të vijë si një titull i vetëm; do të grumbullohet, ose do të shpërbëhet, matje pas matjeje.

Përmbledhje e shkurtër

Duke përdorur instrumentin e JWST në infra të kuqe të mesme, astronomët gjetën se spektri i K2-18 b nuk është pa veçori dhe se, ndër molekulat e testuara, shpjegimi që përshtatet më mirë është dimetil sulfidi dhe/ose dimetil disulfidi — gaze që mund të jenë bioshënja — me rreth 3σ , ndërsa të dhënat nuk i dallojnë dot dy molekulat. Ky është sinjal i mundshëm, jo zbulim, dhe edhe një zbulim nuk do të ishte vetvetiu shenjë jete: autorët e thonë vetë, diskutojnë burime të mundshme jobiologjike dhe kërkojnë më shumë vëzhgime. Rianalizat e pavarura e kanë gjetur provën edhe më të dobët. K2-18 b është objektiv real dhe i vlefshëm, dhe kjo është matje reale. Nuk është zbulimi i jetës, dhe punimi nuk pretendoi kurrë se ishte.

Burimet

Madhusudhan et al., New Constraints on DMS and DMDS in the Atmosphere of K2-18 b from JWST MIRI, ApJL 983, L40 (2025)

<https://doi.org/10.3847/2041-8213/adc1c8>

J. Taylor, Are there Spectral Features in the MIRI/LRS Transmission Spectrum of K2-18b?, Research Notes of the AAS (2025), DOI 10.3847/2515-5172/add881 (arXiv:2504.15916)

<https://doi.org/10.3847/2515-5172/add881>

R. Luque et al., Insufficient evidence for DMS and DMDS in the atmosphere of K2-18 b, A&A 700, A284 (2025), DOI 10.1051/0004-6361/202555580 (arXiv:2505.13407)

<https://doi.org/10.1051/0004-6361/202555580>

K. B. Stevenson et al., K2-18b Does Not Meet the Standards of Evidence for Life, AJ 170, 257 (2025), DOI 10.3847/1538-3881/ae0338 (arXiv:2508.05961)

<https://doi.org/10.3847/1538-3881/ae0338>