



The CLEAN PAPER

WHAT THE PAPER SAYS · WHAT IT DOESN'T · WHY IT MATTERS

Tanka, napola rastaljena prva kora: model u kojem su Had oblikovali udari, a ne unutrašnja toplota

Prvi Zemljin eon, Had, ostavio je gotovo nikakav stenski zapis. Ova studija modeliranjem pita kakva bi kora bila kada se prestanu ignorirati udari. Koristeći stohastički model opadajućeg toka udara i proverene simulacije protoka topline kroz koru i plašt, autori nalaze da bi toplota udara veći deo Hada nadmašivala svu Zemljinu unutrašnju toplinu za najmanje red veličine, ostavljajući tanku koru (ispod ~5 km) delimično rastaljenu već nekoliko kilometara ispod površine — preslabu, tvrde, za tektoniku ploča i sklonu recikliranju natrag u plašt, što bi objasnilo zašto je tako malo hadejskog materijala preživelo. Kako su udari slabili nakon ~3.9 Ga (pre oko 3.9 milijardi godina), trajna kontinentalna kora mogla se formirati upravo kada se pojavljuju najstarije preživjele felseične stene — „verovatno nije slučajnost”, prema opreznoj formulaciji autora. Budući da su namerno koristili konzervativno zagrevanje donje granice, kvalitativni rezultat robustan je iako tačne brojke nisu fiksne. To je snažan, koherentan model Zemljina detinjstva — ne direktno posmatranje.

Written by Lucio Vaglio · Cross-checked by Laura Nesso · Edited by Michele Renda · Figures by Laura Nesso and Nova Vela · AI-assisted, human-reviewed

Paper: *Impact heating and the hidden Hadean*, Tim E. Johnson, Craig O'Neill, Simon Turner, Christopher L. Kirkland, Science (2026), 392:1408-1412 · DOI: [10.1126/science.aeb5402](https://doi.org/10.1126/science.aeb5402)

Poglavlje Zemljine priče iz kojeg gotovo nijedna stranica nije ostala

Zemlja je jedini planet za koji znamo da ima kontinente — uzdignuta, silicijumom bogata kopna na kojima živimo. Ipak, način na koji su prvi kontinenti nastali jedan je od najstarijih neresenih problema geologije, i to iz brutalno jednostavnog razloga: gotovo svi dokazi su nestali.


Prvi Zemljin eon, Had, proteže se od nastanka planeta do pre oko 4.03 milijarde godina (Ga). Iz tih prvih pola milijarde godina gotovo ništa nije preživelo. Najstarije celovite felsične stene, tipične za kontinentalnu koru, stare su oko 4.03 Ga. Nekoliko retkih bazaltnih stena doseže ~4.2 Ga. Najstariji materijal bilo koje vrste tek je raspršen skup kristala cirkona — najpoznatiji iz Jack Hillsa u Zapadnoj Australiji — datiranih na 4.4 Ga. To je praktično celi arhiv Zemljina detinjstva: nekoliko lokaliteta i minerali veličine zrna peska.

Ova studija tom arhivu ne dodaje novu stenu. Radi nešto drugo: gradi fizički model izgleda hadejske kore pod tadašnjom fizikom i postavlja pitanje koje većina modela rane Zemlje izostavlja. Što se dogodi kada prestanete ignorirati činjenicu da je rana Zemlja bila bombardovana?

Odgovor autora je upečatljiv. Tokom većeg dela Hada toplota unesena udarima prevazilazila bi svu unutrašnju Zemljinu toplotu, ostavljajući koru tankom i delimično rastaljenom — preslabom, tvrde autori, za išta nalik današnjoj tektonici ploča. To je model, ne sećanje. Ali model koji, za promenu, pokušava uključiti nasilje perioda koje opisuje.

A model of the Hadean, not a memory of it

The logic is thermal: impacts heat, crust melts, the archive erases itself.



Toplota udara dominira energetske proračunom modela, tanka plitko rastaljena kora sama se reciklira, a trajna kontinentalna kora pojavljuje se tek oko prelaza 4.0–3.9 Ga. To je model Hada, ne direktno sećanje na njega.

Šta su autori uradili

Tim je spojio tri sastojka koji se obično posmatraju odvojeno.

Prvo, **stohastički model toka udara** — kiše asteroida i većih tela koja su pogađala unutrašnji Sunčev sistem tokom Hada i ranog Arhaika. Presudno, to nije stara ideja o jednom naglom vrhuncu „Late Heavy Bombardment”. Tok je vrlo snažan rano i **opada s vremenom**, a veliki udari dolaze nasumično, stohastički, a ne prema rasporedu. Model je skaliran iz statistike udara na mesec i unutrašnji Sunčev sistem te odabran tako da bude usklađen sa spektrima starosti cirkona i dostupnim paleomagnetskim dokazima.

Drugo, **geodinamičke simulacije** prenosa toplote kroz koru i gornji plašt. Koristili su provereni lattice-Boltzmannov kod Planet_LB, izводеći i jednostavne jednodimenzionalne profile temperature s dubinom i potpune dvodimenzionalne snimke konvekcije plašta na 4.1 Ga. Uključili su uobičajene unutrašnje izvore toplote — radioaktivni raspad i toplinu jezgre — te, važno, **magnetsku advekciju**: toplinu koju navise prenosi uzlazna talina, a koju većina togasovitih modela kore izostavlja.

Treće, **modeliranje faznih ravnoteža** realistične rane kore — hidratiziranog hadejskog metabazalta iz pojasa zelenih stena Nuvvuagittuq — kako bi odredili na kojoj bi temperaturi i dubini takva stena počela taliti.

Jedan metodološki izbor važan je za čitanje celog rada: autori su namerno postavili pretpostavke *protiv* sopstvenog zaključka. Pretpostavili su „nehondritski” plašt, s manje radioaktivnih elemenata koji proizvode toplinu od hondritskog referentnog modela, s manje od polovine njegova unutrašnjeg zagrevanja, koristili konzervativne stope zagrevanja i zanemarili plimno zagrevanje mladog, bliskog meseca. Zato su njihove izračunate temperature kore **minimumi** — donje granice. Ako išta, stvarni Had bio je topliji od modela.

Šta su pronašli

Udari, a ne unutrašnja toplota, dominirali su energetske proračunom Hada. Kada se toplota udara integriše kroz vreme, ona nadmašuje unutrašnji doprinos — najmanje za red veličine kroz veći deo Hada. U toj slici zagrevanje udarima, a ne radioaktivni raspad, glavni je pokretač rane tektonike i postaje sporedno tek nakon otprilike **3.9 Ga**.

Ta toplota održavala je koru tankom i plitko rastaljenom. Bez udara i advekcije taline model daje hadejsku koru koja je delimično rastaljena tek ispod oko 10–15 km. Dodavanjem toplote udara zona taljenja dramatično se podiže: kora postaje delimično rastaljena već **nekoliko kilometara ispod površine**, otprilike ispod 2–5 km. Na oko 5 km dubine modeli predviđaju više od 30% taline — stanje u kojem je stena preslaba da bi se držala kao kruta ploča. Na 5–10 km, temperature od ~1000–1100°C znače da je kora opsežno rastaljena gotovo nezavisno o sastavu. Preživela čvrsta kora bila bi **tanka**,

tanja od oko 5 km.

Napola rastaljena kora briše samu sebe. Opsežno taljenje omogućuje gustom materijalu bogatom gvožđem i magnezijumom da tone i odvaja se, dok lakše, taline bogate silicijumom rastu naviše. S vremenom to prosečan sastav kore pomiče prema razvijenijim sastavima bogatim silicijumom — i proizvodi felsičnu talinu iz koje se može kristalizovati cirkon. Gotovo sva ta tanka kora zatim bi se reciklirala natrag u konvektirajući plašt, što je usklađeno s hemijskim, izotopnim zapisom. U ovom modelu gotovo potpuna odsutnost hadejskih stena nije rupa u zapisu — nego *predviđanje*. Stene od 4.2 Ga i cirkoni od 4.4 Ga retki su preživeli ostaci kore koja se uglavnom uništavala gotovo jednako brzo kao što je nastajala.

Kraj bombardovanja vremenski se poklapa s prvim trajnim kontinentima. Kako je bombardovanje slabilo kroz prelaz 4.0–3.9 Ga, kora je napokon mogla zadebljati i opstati. Najstarije preživele kontinentalne stene pojavljuju se oko istog prelaza. Autori to formulišu oprezno: da se trajna kontinentalna kora pojavila upravo tada „verovatno nije slučajnost”.

Njihov glavni zaključak: u tim uslovima — s tankom korom rastaljenom već nekoliko kilometara ispod površine — **tektonika ploča u Hadu nije verovatna**.

Pokazuju i zašto su raniji radovi dolazili do suprotnog zaključka. Prethodne studije stohastičkih udara nalazile su samo mali efekat, s manje od 2.5% kore rastaljene u bilo kojem trenutku. Te studije izostavile su dve stvari koje ova uključuje: globalni efekat velikih udara na taljenje duboko u plaštu i prenos te toplote naviše uzlaznom magmom. Kada se to vrati u model, toplotna se slika drastično menja.

Zašto model nije sećanje

Sve gore navedeno izlaz je simulacija, a ne očitavanje hadejskih stena — jer tih stena gotovo više nema. To rezultat ne čini slabim, ali određuje o kakvoj vrsti rezultata je reč.

Lanac glasi: *model* toka udara hrani *model* protoka toplote kroz plašt i koru, proveren prema *modelu* taljenja određene stene. Svaka je karika fizički motivisana i, gde je moguće, validirana — ali celina je koherentan argument o tome kako je Had *morao* izgledati prema razumno pretpostavljenoj fizici, a ne merenje kako je *zaista* izgledao.

Zato su konzervativne pretpostavke autora važnije nego što se čini. Budući da su odabrali donju granicu zagrevanja i ipak dobili plitku koru koja je opsežno rastaljena, kvalitativni zaključak — hadejska kora bila je vruća i slaba — robustan je na njihove izbore. Ono što *nije* čvrsto određeno jesu precizne brojke: tačni geotermalni profili, tačni udeli taline i tačna debljina kore. Smer rezultata čitajte kao snažan, decimalna mesta kao privremena.

Šta ovo *ne* dokazuje

- **Ne** posmatra direktno hadejsku koru. Iz tog perioda gotovo da nema stena; ovo je rezultat modeliranja onoga što fizika implicira, ne merenje.
- **Ne** oslanja se na „Late Heavy Bombardment”. Korišćeni tok udara opada i stohastičan je — model ne treba niti koristi nagli vrhunac bombardovanja.
- **Ne** zatvara raspravu o tektonici ploča. „Malo verovatna” ovde je snažna fizički zasnovana inferencija u korist vruće rane Zemlje sa stagnantnim ili „mekanim” pokrovom, ali tektonski režim Hada i dalje je stvarno sporan.
- **Ne** dokazuje da su udari *uzrokovali* pojavu kontinenata oko prelaza 4.0–3.9 Ga. Vremensko poklapanje snažna je povezanost koju sami autori nazivaju „verovatno ne slučajno” — to je pažljiv jezik za uverljivu korelaciju, ne dokazan uzrok.
- Cirkoni iz Jack Hillsa **nisu** sačuvani kontinenti. To su retka preživela zrna koja pokazuju da su fel-sični materijal i voda postojali rano; cela poenta modela je da je kora koja ih je proizvela uglavnom reciklirana.
- **Ne** rekonstruisa celovitu istoriju rane Zemlje. Simulacije su idealizovane — jednodimenzionalni profili i dvodimenzionalni ekvatorski preseki s udarima ograničenima blizu ekvatora, prikazani kao vremenski snimci — a ne potpun četvorodimenzionalni model planeta.

Koliko su dokazi jaki?

Za centralnu tvrdnju — da je zagrevanje udarima bilo faktor prvog reda za hadejsku koru i držalo je tankom i plitko rastaljenom — argument je koherentan i, u važnom smislu, konzervativan. Koristi proveren geodinamički kod, fizički razumne ulaze i pretpostavke donje granice te uključuje izvor toplote koji je većina prethodnih modela jednostavno zanemarivala. Dodatno dobija na uverljivosti jer istom idejom objašnjava dve tvrdokorne činjenice: zašto gotovo nijedna stena starija od ~4 Ga nije preživela, i zašto se trajna kora pojavljuje upravo kada bombardovanje slabi.



Jack Hills u Zapadnoj Australiji na snimci NASA-inog instrumenta ASTER. Cirkoni iz ove područja među najstarijim su poznatim preživelim materijalom rane Zemljine kore — sitni tragovi iz eona čije su stene uglavnom izbrisane.

NASA/GSFC/METI/ERSDAC/JAROS, and U.S./Japan ASTER Science Team fair-use

Ograničenja su jednako jasna i tipična za svaki model duboke prošlosti: modeli su složeni na modele, oslonjeni na vrlo oskudan stenski zapis, a najcitiraniji zaključak — „tektonika ploča nije verovatna” — inferencija je, ne posmatranje. Ispravan stav je tretirati ovo kao snažnu, dobro obrazloženu hipotezu koja preoblikuje sliku Hada i sada poziva druge da testiraju njene pretpostavke — naročito izbor modela toka udara — a ne kao zatvoren slučaj.

Najkorisniji rezime nije ni „ovako je Had izgledao” ni „to je samo simulacija”. On glasi: prema razumno pretpostavljenoj, konzervativnoj fizici, rana Zemlja pod snažnim bombardovanjem imala bi tanku, napola rastaljenu koru koja se sama reciklira — i ta jedna ideja objašnjava iznenađujuće mnogo od onoga malo što stvarno možemo videti.

Zašto je to važno

Popularna slika rane Zemlje često oscilira između dveju krajnosti: mirnog vodenog sveta s tektonikom ploča gotovo poput današnje Zemlje ili paklenog sveta lave. Ovaj rad skicira konkretan, fizički motivisan srednji slučaj: koru koja je bila tanka i iznova se pretapala već nekoliko kilometara ispod površine, stalno uništavana i ponovo stvarana, pri čemu su udari — ne unutrašnja toplota — određivali uslove.

To preoblikovanje stvarno nešto objašnjava. Nudi jedan mehanizam za dve najveće činjenice o Zemljinu detinjstvu — gotovo potpuno odsustvo stenskog zapisa i vreme pojave prvih trajnih kontinenata — i u centar priče stavlja često zanemaren proces, zagrevanje udarima. Ako izdrži proveru, menja način na koji razmišljamo o tome kada je Zemlja uopšte postala planet stabilnih kontinenata, a može se primeniti i na druge stenovite svetove koji su nastajali pod sopstvenim bombardovanjem.

Ništa od toga ne zahteva da model bude poslednja reč. Dovoljno je da bude dovoljno dobra hipoteza za testiranje — a vezivanjem uz preživeli zapis cirkona i izotopa to jest. „Skriveni Had” iz naslova upravo je poenta: doba do kojeg uglavnom možemo dopreti samo modeliranjem, jer je samo izbrisalo sopstvene dokaze.

Kratak rezime

Prvi Zemljin eon, Had (pre ~4.03 Ga), ostavio je gotovo nikakav stenski zapis. Ova studija modeliranjem pita kakva bi kora bila kada se uključi izvor toplote koji se obično izostavlja: udari. Koristeći stohastički model opadajućeg toka udara zajedno s proverenim 1D i 2D simulacijama protoka toplote kroz koru i plašt, uključujući toplinu koju nosi uzlazna talina, autori nalaze da bi vremenski integrisana toplota udara veći deo Hada nadmašivala svu Zemljinu unutrašnju toplinu za najmanje red veličine. posledica je tanka kora (ispod ~5 km), delimično rastaljena već nekoliko kilometara ispod površine i na ~5 km dubine rastaljena više od 30% — preslaba za tektoniku ploča, koju autori za Had smatraju malo verovatnom. Takva bi se kora uglavnom reciklirala u plašt, što bi objasnilo zašto je tako malo hadejskog materijala preživelo; kako su udari slabili kroz prelaz 4.0–3.9 Ga, trajna kontinentalna kora mogla je opstati, otprilike kada se pojavljuju najstarije preživele felseične stene — „verovatno nije slučajnost”. Budući da su autori namerno koristili konzervativno zagrevanje donje granice, kvalitativni rezultat robustan je iako precizne brojke nisu fiksne. To je snažan, koherentan model Zemljina detinjstva — ne direktno posmatranje.

Provera bez ulepšavanja

Šta rad pokazuje: U fizički zasnovanim simulacijama koje uključuju zagrevanje udarima i magmatski prenos toplote hadejska kora izlazi tanka i delimično rastaljena već nekoliko kilometara ispod površine, s dominacijom toplote udara nad unutrašnjom toplinom, uglavnom reciklirana natrag u

plašt i — prema ovom modelu — nesposobna podržavati tektoniku ploča.

Šta je verovatno, ali nije dokazano: Da su udari razlog pojave trajnih kontinenata oko 3.9 Ga; da je Had bio svet stagnantnog ili mekog pokrova umesto rane tektonike ploča; da gotovo nijedna hadejska stena nije preživela upravo zato što se rastaljena kora reciklirala.

Šta ne pokazuje: Direktno merenje hadejske kore; konačan odgovor na raspravu o tektonici ploča; dokazan uzročni odnos između slabljenja bombardovanja i prvih kontinenata; da cirkoni Jack Hillsa predstavljaju očuvane kontinente; potpuni model ranog planeta.

Glavna ograničenja: Hadejski stenski zapis gotovo ne postoji, pa je rezultat model ograničen vrlo malom količinom podataka; slaže modele na modele (tok udara → geodinamika → fazne ravnoteže); sam tok udara reprezentativan je, ali neizvestan izbor; simulacije su idealizovane (1D i 2D ekvatorski preseki, vremenski snimci). Konzervativne pretpostavke donje granice jačaju kvalitativni zaključak, ali ne čine specifične geoterme preciznim.

Koliko poverenja treba imati opšti čitalac? Visoko da bi prema razumno pretpostavljenoj fizici snažno bombardovana rana Zemlja imala vruću, tanku i plitko rastaljenu koru. Umereno da to čini hadejsku tektoniku ploča malo verovatnom i objašnjava nedostajući stenski zapis. Nisko za bilo kakvu tvrdnju da ovo *dokazuje* kako su kontinenti nastali ili tačno kada — ovo je snažan, konzervativan model koji preoblikuje Had, ne direktan pogled na njega.

Izvori

Johnson, O'Neill, Turner & Kirkland, Science 392:1408-1412 (2026)
<https://doi.org/10.1126/science.aeb5402>