




# The CLEAN PAPER

WHAT THE PAPER SAYS · WHAT IT DOESN'T · WHY IT MATTERS

## İnce, yarı erimiş ilk kabuk: Hadean'ı iç ısı değil çarpmaların yönettiği bir model

*Dünya'nın ilk eonu Hadean neredeyse hiç kaya kaydı bırakmadı. Bu modelleme çalışması çarpmaları görmezden gelmeyi bıraktığınızda kabuğun nasıl olacağını soruyor. Stokastik, azalan çarpma-akısı modeli ve benchmark edilmiş kabuk/manto ısı-akışı simülasyonlarıyla yazarlar, çarpma ısının Hadean'ın çoğunda Dünya'nın tüm iç ısını en az bir büyüklük mertebesi aşacağını; ~5 km'den ince ve yalnızca birkaç kilometre aşağıda kısmen erimiş kabuk bırakacağını buluyor — onların argümanına göre levha tektoniği için fazla zayıf ve kendini mantoya geri dönüştürmeye yatkın, bu da neden çok az Hadean materyali kaldığını açıklayabilir. Çarpmalar ~3,9 Ga sonrasında azalırken kalıcı kıtasal kabuk, en eski felsik kayaların görüldüğü sırada oluşabilir — yazarların dikkatli sözleriyle 'muhtemelen tesadüf değil.' Bilinçli olarak ihtiyatlı alt-sınır ısınma kullandıkları için nitel sonuç sağlam, kesin sayılar sabit değil. Dünya'nın çocukluğuna dair güçlü ve tutarlı bir model — doğrudan gözlem değil.*

Written by Lucio Vaglio · Cross-checked by Laura Nesso · Edited by Michele Renda · Figures by Laura Nesso and Nova Vela · AI-assisted, human-reviewed

Paper: *Impact heating and the hidden Hadean*, Tim E. Johnson, Craig O'Neill, Simon Turner, Christopher L. Kirkland, Science (2026), 392:1408-1412 · DOI: 10.1126/science.aeb5402

# Dünya'nın hikâyesindeki neredeyse tüm sayfaları kaybolmuş bölüm

Dünya, bildiğimiz kadarıyla kıtalara sahip tek gezegen — üzerinde yaşadığımız, hafif ve silisçe zengin kara kütleleri. Fakat kıtaların ilk kez nasıl oluştuğu jeolojinin en eski çözölememiş problemlerinden biri ve bunun acımasız bir nedeni var: kanıtın neredeyse tamamı yok olmuş durumda.


Dünya'nın ilk eonu olan Hadean, gezegenin doğumundan yaklaşık 4,03 milyar yıl öncesine (Ga) kadar uzanır. İlk yarım milyar yıldan neredeyse hiçbir şey kalmadı. En yaşlı sağlam felsik (kıta-tipi) kayalar yaklaşık 4,03 Ga. Birkaç nadir bazaltik kayaç ~4,2 Ga'ya ulaşıyor. Her türden en eski materyal ise 4,4 Ga yaşındaki dağınık zirkon kristalleri — en ünlüleri Batı Avustralya'daki Jack Hills'ten. Dünya'nın bebekliğine ait arşivin tamamı bu: birkaç yer ve kum tanesi büyüklüğünde bazı mineraller.

Bu çalışma o arşive yeni bir kaya eklemiyor. Başka bir şey yapıyor: Hadean kabuğunun o dönemin fiziki altında nasıl görünmesi gerektiğine dair fiziksel bir model kuruyor ve erken-Dünya modellerinin çoğunun dışarıda bıraktığı bir soru soruyor. Erken Dünya'nın bombardıman edildiği gerçeğini görmezden gelmeyi bırakırsanız ne olur?

Yazarların ulaştığı cevap çarpıcı. Hadean'ın büyük bölümünde çarpmaların taşıdığı ısı, Dünya'nın tüm iç ısını bastırarak kadar büyük olurdu; kabuğu ince ve yarı erimiş bırakırdı — onların argümanına göre modern levha tektoniğine benzeyen herhangi bir sistem için fazla zayıf. Bu bir model, anı değil. Ama en azından anlattığı çağın şiddetini hesaba katmaya çalışan bir model.

## A model of the Hadean, not a memory of it

*The logic is thermal: impacts heat, crust melts, the archive erases itself.*



Modelin enerji bütçesine çarpma ısısı hâkim olur; ince, sığda erimiş kabuk kendini sürekli geri dönüştürür ve kalıcı kıtasal kabuk ancak 4,0–3,9 Ga geçişi civarında ortaya çıkar. Bu Hadean'ın bir modelidir, doğrudan hatırası değil.

## Yazarlar ne yaptı?

Ekip genellikle ayrı tutulan üç bileşeni birleştirdi.

Birincisi, **çarpma akısının stokastik modeli** — Hadean ve erken Arkeen boyunca iç Güneş Sistemi'ne çarpan asteroid ve daha büyük cisimlerin yağmuru. Kritik olarak bu, eski “Late Heavy Bombardment” gibi tek bir ani zirve fikri değil. Erken dönemde yoğun, zamanla **azalan** ve büyük çarpmaların takvimli değil rastgele (stokastik) geldiği bir akı. Model Ay ve iç-Güneş-Sistemi çarpma istatistiklerinden yeniden ölçekleniyor ve zirkon yaş dağılımları ile mevcut paleomanyetik kanıtlarla uyumlu olacak şekilde seçiliyor.

İkincisi, ısıнын kabuk ve üst mantoda nasıl hareket ettiğine dair **jeodinamik simülasyonlar**. Benchmark edilmiş lattice-Boltzmann kodu (Planet\_LB) kullandılar; hem basit 1B sıcaklık-derinlik hesapları hem de 4,1 Ga'daki mantonun tam 2B konveksiyon görüntülerini çalıştırdılar. Bunlar sıradan iç ısı kaynaklarını — radyoaktif bozunma ve çekirdekten gelen ısı — ve kritik olarak **magmatik adveksiyonu** içeriyor: yükselen eriyiğin yukarı taşıdığı ısı; çoğu kabuk termal modeli bunu dışarıda bırakır.

Üçüncüsü, gerçekçi bir erken kabuğun **faz-denge modellemesi** — Nuvvuagittuq yeşiltaş kuşağından hidratlı Hadean metabazalt — böyle bir kayanın hangi sıcaklık ve derinlikte erimeye başlayacağını belirlemek için.

Tüm makalenin nasıl okunacağını etkileyen metodolojik bir tercih var: yazarlar bilinçli olarak sonuçlarının *aleyhine* varsayımlar yaptı. Standart chondritic referanstan daha az ısı üreten radyoaktif madde taşıyan “nonchondritic” manto, standart modelin yarısından az iç ısınma, ihtiyatlı ısınma oranları ve genç, yakın Ay'dan gelmiş olabilecek gelgit ısısını yok sayma. Bu, hesaplanan kabuk sıcaklıklarının **minimum**, yani alt sınır olduğu anlamına geliyor. Gerçek Hadean varsa modelden daha sıcak olabilir.

## Ne buldular?

**Hadean enerji bütçesine iç ısı değil, çarpmalar hâkimdi.** Çarpma ısısı zaman boyunca entegre edildiğinde iç katkırı ezip geçiyor — Hadean'ın çoğunda en az bir büyüklük mertebesi fazla. Bu tabloda erken tektonizmi sürükleyen ana motor radyoaktif bozunma değil çarpma ısısı ve ancak yaklaşık **3,9 Ga** sonrasında ikincil role düşüyor.

**Bu ısı kabuğu ince ve sığda erimiş tuttu.** Çarpma ve eriyik adveksiyonu olmadan model, Hadean kabuğunun yalnızca 10–15 km'nin altında kısmen erimiş olduğunu veriyor. Çarpma ısını ekleyince erime bölgesi dramatik biçimde yukarı çıkıyor: kabuk yalnızca **birkaç kilometre** derinlikte (yaklaşık 2–5 km altında) kısmen erimiş hâle geliyor. Yaklaşık 5 km'de modeller %30'dan fazla eriyik öngörüyor — kayanın rijit bir levha olarak bir arada kalamayacak kadar zayıf olduğu durum. 5–10 km'de ~1000–

1100°C sıcaklık, kabuğu bileşiminden büyük ölçüde bağımsız biçimde yaygın erimeye sokuyor. Hayatta kalan katı kabuk **ince, yaklaşık 5 km'den az** olurdu.

**Yarı erimiş kabuk kendini siliyor.** Yaygın erime, yoğun demir ve magnezyumca zengin materyalin batıp ayrılmasına; daha hafif silisçe zengin eriyiklerin yükselmesine izin verir. Zamanla bu, ortalama kabuğu daha evrimleşmiş, silisçe zengin bileşimlere iter — ve zirkon kristalleştirebilen felsik eriyik üretir. Bu ince kabuğun neredeyse tamamı daha sonra konvekto olan mantoya geri dönüştürülürdü; bu da kimyasal (izotopik) kayıtlarla uyumludur. Modelde Hadean kayaçlarının neredeyse tamamen yokluğu kayıt boşluğu değil, bir *öngörü*. 4,2 Ga kayaçlar ve 4,4 Ga zirkonlar, olduğu kadar hızlı yok edilen kabuğun nadir hayatta kalanlarıdır.

**Bombardımanın sona ermesi ilk kalıcı kıtalarla çakışıyor.** Bombardıman 4,0–3,9 Ga geçişinde zayıflarken kabuk sonunda kalınlaşıp kalıcı olabilir. En eski hayatta kalan kıtasal kayaçlar aynı geçiş çevresinde ortaya çıkıyor. Yazarların dikkatli ifadesi: kalıcı kıtasal kabuğun bu zamanda görünmesi “muhtemelen tesadüf değil.”

Başlıktaki çıkarımları: bu koşullar altında — ince kabuk, birkaç kilometre aşağıda eriyik — **Hadean levha tektoniği olası görünmüyor.**

Ayrıca önceki çalışmaların neden ters sonuca ulaştığını gösteriyorlar. Stokastik çarpmaları inceleyen önceki çalışmalar, herhangi bir anda kabuğun %2,5'inden azının erimiş olmasıyla yalnızca küçük etki bulmuştu. O çalışmalar bu çalışmanın içerdiği iki şeyi dışarıda bıraktı: büyük çarpmaların manto derinindeki erimeye küresel etkisi ve yükselen magmanın bu ısıyı yukarı taşıması. Bunlar eklenince termal tablo kökten değişiyor.

## Model neden anı değildir?

Yukarıdakilerin tamamı simülasyon çıktısı; Hadean kayaçlarından alınmış doğrudan ölçüm değil — çünkü bu kayaçlar neredeyse tamamen artık yok. Bu, sonucu zayıf yapmaz ama ne tür bir sonuç olduğunu belirler.

Zincir şöyle: çarpma akısının *modeli*, manto ve kabuk ısı akışının *modeline* giriyor; o da belirli bir kayanın nasıl eridiğine dair *modelle* kontrol ediliyor. Her bağlantı fiziksel olarak gerekçeli ve mümkün olduğunda benchmark edilmiş — fakat bütün yapı Hadean'ın makul fizik altında *nasıl görünmek zorunda olabileceğine* dair tutarlı bir argüman; gerçekte *nasıl görüldüğünün* ölçümü değil.


Bu nedenle yazarların ihtiyatlı varsayımları görüldüğünden daha önemli. Alt-sınır ısınmayı seçip yine de yaygın sığ erimiş kabuk elde ettikleri için nitel sonuç — Hadean kabuğunun sıcak ve zayıf olduğu — tercihlerin çoğuna karşı sağlam. Buna karşılık kesin sayı sabitlenmiş değil: tam jeotermal profiller, kesin eriyik oranları, kesin kabuk kalınlığı. Sonucun yönünü güçlü, ondalıklarını geçici okuyun.

## Bu neyi *kanıtlamıyor*?

- Hadean kabuğunu doğrudan **gözlemlemiyor**. Bu çağdan neredeyse hiç kaya yok; sonuç fiziğin ne ima ettiğine dair model, ölçüm değil.
- Bir “**Late Heavy Bombardment**” varsayımına dayanmıyor. Kullanılan çarpma akısı azalan, stokastik; model ani bombardıman zirvesine ihtiyaç duymuyor ve onu çağırıyor.
- Levha-tektoniği tartışmasını **bitirmiyor**. Buradaki “olası değil”, sıcak, stagnant- veya squishy-lid erken Dünya lehine güçlü ve fiziksel temelli çıkarım — fakat Hadean tektonik modu hâlâ gerçek bir tartışma konusu.
- Çarpmaların 4,0–3,9 Ga geçişinde kıtaların görünmesine *neden olduğunu* **kanıtlamıyor**. Zamanlama eşleşmesi, yazarların “muhtemelen tesadüf değil” diye adlandırdığı güçlü ilişki — ikna edici korelasyon için dikkatli dil, gösterilmiş nedensellik değil.
- Jack Hills zirkonları **korunmuş kıtalar değil**. Felsik materyal ve suyun erken var olduğunu gösteren nadir hayatta kalmış taneler; modelin bütün noktası bunları üreten kabuğun çoğunlukla geri dönüştürülmesi.
- Erken Dünya’nın tam tarihini **yeniden kurmuyor**. Simülasyonlar idealize — 1B profiller ve çarpmaların ekvator yakınıyla sınırlandırılmış 2B ekvator kesitleri, zaman anlık görüntüleri — gezegenin tam dört-boyutlu modeli değil.

## Kanıt ne kadar güçlü?

Merkez iddia için — çarpma ısısının Hadean kabuğunda birinci dereceden kontrol olup onu ince ve sığda erimiş tutması — argüman tutarlı ve önemli bir anlamda ihtiyatlı. Benchmark edilmiş jeodinamik kod, fiziksel olarak makul girdiler ve alt-sınır varsayımlar kullanıyor; ayrıca önceki modellerin çoğunun basitçe görmezden geldiği bir ısı kaynağını entegre ediyor. İki inatçı olguyu aynı anda açıklaması da güvenilirlik kazandırıyor: neden ~4 Ga’dan eski neredeyse hiç kaya kalmadığı (neredeyse tam geri dönüşüm) ve bombardıman sönerken kalıcı kabuğun neden ortaya çıktığı.



NASA'nın ASTER aracıyla görülen Batı Avustralya'daki Jack Hills. Bu bölgedeki zirkonlar, kayaçlarının çoğu silinmiş bir eondan Dünya'nın erken kabuğuna ait bilinen en eski materyallerden bazılarını içerir — küçük ipuçları.

NASA/GSFC/METI/ERSDAC/JAROS, and U.S./Japan ASTER Science Team fair-use

Sınırlar da aynı derecede açık ve derin-zaman modelinin sınırları: çok seyrek kaya kaydına sabitlenmiş modeller üstüne modeller ve en alıntılanabilir sonuç — “levha tektoniği olası değil” — gözlem değil çıkarım. Doğru tutum, bunu Hadean'ı yeniden çerçeveyeleyen güçlü ve iyi gerekçelendirilmiş hipotez olarak görmek; artık diğerlerinin özellikle çarpma-akısı modeli seçimi gibi varsayımlarını test etmesini davet ediyor. Kapanmış dava değil.

En yararlı özet ne “Hadean tam böyleydi” ne “yalnızca simülasyon.” Şu: makul, ihtiyatlı fizik altında ağır bombardıman gören erken Dünya ince, yarı erimiş, kendini geri dönüştüren kabuğa sahip olurdu — ve bu tek fikir gerçekten görebildiğimiz az sayıdaki şeyin şaşırtıcı bölümünü açıklıyor.

## Neden önemli?

Erken Dünya'nın popüler görüntüsü iki uç arasında salınır: bugünküne benzeyen sakin, levha-tektonikli su dünyası ya da cehennemsi lav gezegeni. Bu çalışma spesifik, fiziksel temelli bir orta yol

çiziyor: birkaç kilometre aşağıdan başlayarak tekrar tekrar eriyen, sürekli yok edilip yeniden yapılan ince kabuk ve koşulları iç ısı değil çarpmaların belirlediği bir dünya.

Bu yeniden çerçeveleme gerçek iş yapıyor. Dünya'nın çocukluğuna dair en büyük iki olgu için tek mekanizma sunuyor — kaya kaydının neredeyse tamamen yokluğu ve ilk kalıcı kıtaların zamanlaması — ve genellikle ihmal edilen çarpma ısısını hikâyenin merkezine koyuyor. Dayanırsa, Dünya'nın ne zaman kalıcı kıtalar gezegeni hâline geldiğini düşünme biçimimizi değiştirir ve kendi bombardımanları altında oluşan başka kayalık dünyalara da taşınabilir.

Bunların hiçbirisi modelin son söz olmasını gerektirmez. Test edilmeye yeterince iyi bir hipotez olmasını gerektirir — ve hayatta kalan zirkon ile izotop kaydına bağlandığı için öyle. Başlıktaki “gizli Hadean” tam da nokta: kayaçlarını kendi sildiği için büyük ölçüde ancak modellemeyle ulaşabildiğimiz bir çağ.

## Kısa özet

Dünya'nın ilk eonu Hadean (yaklaşık 4,03 Ga öncesi) neredeyse hiç kaya kaydı bırakmadı. Bu modelleme çalışması, genellikle dışarıda bırakılan bir ısı kaynağını — çarpmaları — eklediğinizde kabuğun nasıl olacağını soruyor. Stokastik, zamanla azalan bir çarpma-akısı modeli ile benchmark edilmiş 1B ve 2B kabuk/manto ısı-akışı simülasyonlarını (yükselen eriyiğin taşıdığı ısı dâhil) kullanan yazarlar, zaman boyunca entegre çarpma ısısının Hadean'ın çoğunda Dünya'nın tüm iç ısısını en az bir büyüklük mertebesi aşacağını buluyor. Sonuç, **~5 km'den ince**, yalnızca birkaç kilometre aşağıda kısmen erimiş ve ~5 km'de **%30'dan fazla eriyik** taşıyan kabuk — yazarların levha tektoniğini Hadean için olası görmeyecek kadar zayıf saydığı durum. Böyle kabuk büyük ölçüde mantoya geri dönüştürülür ve bu, neden çok az Hadean materyalinin hayatta kaldığını açıklayabilir; çarpmalar 4,0–3,9 Ga geçişinde zayıflarken kalıcı kıtasal kabuk oluşabilir, tam da en eski hayatta kalan felsik kayaçların ortaya çıktığı zaman — yazarların dikkatli sözleriyle “muhtemelen tesadüf değil.” Bilinçli olarak ihtiyatlı alt-sınır ısınma kullandıkları için nitel sonuç sağlam, kesin sayılar ise sabit değil. Dünya'nın çocukluğuna dair güçlü ve tutarlı model — doğrudan gözlem değil.

## Abartısız değerlendirme

**Makalenin gösterdiği:** Çarpma ısısı ve magmatik ısı taşınımını içeren fiziksel temelli simülasyonlarda Hadean kabuğu ince ve yalnızca birkaç kilometre derinde kısmen erimiş çıkıyor; iç ısı yerine çarpma ısısı baskın, kabuğun çoğu mantoya geri dönüştürülüyor ve bu modelde levha tektoniği sürdürülemiyor.

**Makul ama kanıtlanmamış olan:** Kalıcı kıtaların ~3,9 Ga civarında görünmesinin nedeni çarpmaların azalması; Hadean'ın erken levha-tektoniği yerine stagnant- veya squishy-lid dünya olması; Hadean kayaçlarının neredeyse yokluğunun özellikle erimiş kabuğun kendini geri dönüştürmesinden kaynaklanması.

**Göstermediği:** Hadean kabuğunun doğrudan ölçümü; levha-tektoniği tartışmasına kesin cevap; bombardımanın sönmesi ile ilk kıtalar arasında gösterilmiş nedensel bağ; Jack Hills zirkonlarının korunmuş kıtalar olduğu; erken gezegenin eksiksiz modeli.

**Başlıca sınırlamalar:** Hadean kaya kaydı neredeyse yok, dolayısıyla sonuç çok az veriyle kısıtlanan model; modelleri üst üste koyuyor (çarpma akısı → jeodinamik → faz dengesi); çarpma akısının kendisi temsili ve belirsiz bir seçim; simülasyonlar idealize (1B ve 2B ekvator kesitleri, zaman anlık görüntüleri). İhtiyatlı alt-sınır varsayımlar nitel sonucu güçlendirir ama spesifik jeotermalleri hassas yapmaz.

**Genel bir okur ne kadar güven duymalı?** Makul fizik altında ağır bombardıman edilen erken Dünya'nın sıcak, ince, sığda erimiş kabuğa sahip olacağına yüksek güven. Bunun Hadean levha tektoniğini olası olmaktan çıkardığına ve kayıp kaya kaydını açıklayabileceğine orta güven. Kıtaların tam olarak nasıl veya ne zaman oluştuğunu *kanıtladığı* iddiasına düşük güven — bu Hadean'ı yeniden çerçeveleyen güçlü, ihtiyatlı model; doğrudan bakış değil.

---

## Kaynaklar

Johnson, O'Neill, Turner & Kirkland, Science 392:1408-1412 (2026)  
<https://doi.org/10.1126/science.aeb5402>