



Троє молодих пацієнтів роками жили без ознак хвороби після експериментальних Т-клітин. Дослідження І фази не може показати, що спричинило ці результати

ReMIND вводило 33 дітям і молодим людям із пухлинами мозку високого ризику Т-клітини, вирощені в лабораторії з крові кожного пацієнта. Клітини розмножували для реакції на три білки, які можуть бути присутні в ракових клітинах. Троє пацієнтів мали інтервали без ознак хвороби понад 31,8, 41,2 і 51,6 місяця від першої інфузії, включно з однією повною відповіддю за критеріями сканування. У групі агресивних пухлин стовбура мозку жодне сканування не показало достатнього зменшення або зникнення для наперед визначеного порога відповіді. Те саме раннє дослідження безпеки й дози зафіксувало одну смерть, достатньо серйозну, щоб за правилами зарахувати її проти підвищення дози. Без групи порівняння дослідження не може показати, чи Т-клітини спричинили три результати.

Written by Cinzia Vaglio · Cross-checked by Laura Nesso and Matteo · Edited by Laura Nesso and Michele Renda
· Figures by Cinzia Vaglio and Nova Vela · AI-assisted, human-reviewed

Paper: *Multi-antigen-targeting T cells in pediatric central nervous system tumors: a phase 1 trial*, Stephanie Gomez, Rachel A. DiCioccio, Ashley E. Geiger, Melanie L. Grant, Emily Reynolds, Anushree Datar, Chase D. McCann, Jay Tanna, Divyesh Kukadiya, Fahmida Hoq, Anqing Zhang, Patrick J. Hanley, Jennifer L. Webb, Lindsay B. Kilburn, Brian R. Rood, Adriana Fonseca, Holly J. Meany, L. Gilbert Vezina, Roger J. Packer, Conrad Russell Y. Cruz, Catherine M. Bollard & Eugene I. Hwang, *Nature Medicine* 32, 2481-2493 (2026) · DOI: 10.1038/s41591-026-04449-9

Author Correction

Nature Medicine опублікував авторське виправлення 22 липня 2026 року, щоб уточнити формулювання в розкритті конфлікту інтересів. Тут використано виправлену статтю; клінічні дані й висновки не змінювалися.

Author Correction →

Троє молодих пацієнтів роками жили без ознак хвороби після експериментальних Т-клітин. Дослідження І фази не може показати, що спричинило ці результати

Понад 31,8 місяця. Понад 41,2 місяця. Понад 51,6 місяця.

Це три інтервали без ознак хвороби, відраховані від першої інфузії експериментального лікування Т-клітинами. Перший стосувався 14-річного пацієнта з медулобластомою, яка поверталася кілька разів; спостереження завершилося, коли пацієнт залишив дослідження. Другий стосувався 8-річної дитини з рідкісною астробластомою й на момент припинення збору даних іще тривав. Третій стосувався 14-річного пацієнта з рецидивом гліобластоми й також тривав.

Підрахунок місяців може звучати клінічно й відсторонено. Тут це єдиний чесний спосіб не втратити з поля зору людський факт. Стаття не розповідає, якими були ці роки для пацієнтів. Але вона повідомляє, що троє молодих людей із пухлинами мозку високого ризику жили без задокументованої хвороби протягом періодів, вимірюваних роками, після отримання клітин.

Вона **не** показує, що саме клітини спричинили ці результати.

Ця відмінність — хребет усієї історії. ReMIND було відкритим дослідженням: родини й лікарі знали, яке лікування призначено. Воно також було нерандомізованим: призначеної групи порівняння не було. І це була І фаза — раннє дослідження, створене насамперед для перевірки, чи можна виготовити, ввести й дослідити багатомішеневі Т-клітини в переносимій дозі, а не чи поліпшують вони виживання. Воно зафіксувало три виняткові клінічні історії. Але також не зафіксувало жодного сканування з достатнім зменшенням або зникненням пухлини, щоб досягти наперед визначеного порога відповіді в групі агресивних пухлин стовбура мозку; зафіксувало два серйозні явища з набряком пухлини, можливо пов'язані з лікуванням, і одну смертельну подію, достатньо серйозну, щоб за правилами дослідження зарахувати її проти підвищення дози.

Роки реальні. Причинне пояснення невизначене. Обидві істини заслуговують бути в основній історії.

Лікування, виготовлене з крові кожного пацієнта

Лікування називається **терапією ТАА-Т** — Т-клітинами, специфічними до пухлиноасоційованих антигенів. Т-клітини — імунні клітини, здатні розпізнавати певні молекулярні фрагменти. Дослідники брали кров у кожного учасника, а потім вирощували його власні Т-клітини в лабораторії, піддаючи їх дії фрагментів трьох пухлиноасоційованих білків: **WT1** (Wilms tumor 1), **PRAME** (preferentially expressed antigen in melanoma) і **survivin**, білка, пов'язаного з виживанням і поділом клітин. Ці білки можуть бути присутні в дитячих пухлинах мозку й слугувати орієнтирами для імунних клітин, але вони не є унікальними для раку.

Це не були **CAR-Т-клітини** — Т-клітини, генетично змінені так, щоб нести створений у лабораторії рецептор, новий сенсор для вибраної мішені. ReMIND використало інший підхід: відібрало й розмножило природні Т-клітини, які реагували на три білкові фрагменти, без генетичного конструювання. Клітини перевіряли, заморожували й пізніше вводили у вену. Спрямовуючи лікування на три мішені, а не одну, дослідники сподівалися зменшити шанс того, що пухлина з різних типів клітин уникне лікування, бо лише частина клітин несе одну конкретну мішень.

Чим це відрізняється від CAR-Т?

Під час виготовлення CAR-Т Т-клітинам надають новий штучний рецептор, щоб вони могли безпосередньо розпізнавати вибраний маркер. Під час виготовлення ТАА-Т рецептор не додають. Вирощують змішану популяцію незмінених Т-клітин, чиї наявні рецептори реагують на білкові фрагменти, пов'язані з WT1, PRAME або survivin. Це різні способи створення імуноклітинного лікування; докази ефективності одного підходу в певному раку не можна переносити на інший.

Це правдоподібна стратегія, а не продемонстрований клінічний механізм. Дослідження не показало, що введені клітини потрапили в конкретну пухлину, збереглися там або вбили її. Первинні питання були простішими: чи можна виготовити придатний продукт, чи можна його вводити, яку дозу слід досліджувати далі й які токсичні явища виникають?

ReMIND включало три групи в Children's National Hospital. **Група А** включала нещодавно діагностовану **дифузну внутрішню гліому мосту (DIPG)** — агресивну пухлину, що проростає крізь міст, частину стовбура мозку, і яку важко видалити хірургічно. **Група В** включала пухлини мозку й спинного мозку поза стовбуром, які повернулися, не відповідали на лікування або погіршувалися. Жодна з цих груп не отримувала лімфодеплецію — короткий курс хіміотерапії, який тимчасово зменшує частину наявних імунних клітин організму перед інфузією імунних клітин. **Група С** була розширенням на чотирьох пацієнтів із рецидивними позастовбуровими пухлинами й додавала цю хіміотерапію перед інфузією — флударабін і циклофосфамід.

Three arms, two disease settings, two starting points for survival

The groups provide different kinds of information.

ARM A | 11 infused

Newly diagnosed aggressive brainstem tumor (DIPG)

No pre-infusion
immune-cell-reducing chemo
Survival counted
from diagnosis

ARM B | 18 infused

Returned / resisted treatment /
worsened outside the brainstem

No pre-infusion
immune-cell-reducing chemo
Survival counted
from first infusion

ARM C | 4 infused

Returned outside
the brainstem

Immune-cell-reducing
chemo before first infusion
Survival counted
from first infusion

DO NOT COMPARE THE SURVIVAL ESTIMATES DIRECTLY

- arm A starts at diagnosis; arms B/C start at first infusion

Original diagram - The Clean Paper - CC BY 4.0

ReMIND мало три групи з різними захворюваннями й різним використанням хіміотерапії перед інфузією. Вживання в групі А відраховували від діагнозу, а в групах В і С — від першої інфузії ТАА-Т, тому ці оцінки не можна прямо порівнювати.

The Clean Paper CC BY 4.0

П'ятдесят один дав згоду; тридцять троє отримали інфузію

Кількість пацієнтів зменшувалася на кожному практичному етапі.


П'ятдесят один пацієнт дав згоду. У 48 взяли кров. Для 41 із цих 48, або 85,4%, виготовили продукт ТАА-Т у першій запланованій дозі дослідження або вище. Тридцять троє отримали щонайменше одну інфузію: 11 у групі А, 18 у групі В і 4 у групі С.

Деякі пацієнти втратили відповідність критеріям або померли до лікування. У семи пацієнтів, у яких уже взяли кров, не вдалося отримати придатний продукт на першому запланованому рівні дози: у шести клітини недостатньо розмножилися в лабораторії, а один продукт не пройшов обов'язкову перевірку якості. Дев'ятьох пацієнтів із недостатнім первинним виходом довелося перевести на нижчу дозу.

Процес поліпшився протягом дослідження. Після збільшення об'єму забору крові й змін у вирощуванні клітин усі 14 пацієнтів, у яких кров взяли після цих змін, дали щонайменше одну лікувальну дозу на першому запланованому рівні або вище. Це справжній доказ можливості виготовити лікування. Але не результат для здоров'я пацієнтів.

The treated group was smaller than the consented group

Every step tests whether the treatment can be made and delivered.



Original diagram - The Clean Paper - CC BY 4.0

Дослідження почалося з 51 пацієнта, який дав згоду, й дійшло до 33 інфузованих. Відсутні 18 є частиною доказів: забір крові, виготовлення лікування, подальша відповідність правилам дослідження й погіршення здоров'я впливали на те, хто дійшов до лікування.

The Clean Paper CC BY 4.0

За статистичною моделлю доза—безпека дослідження вибрало ціль **80 мільйонів клітин на дозу на кожен квадратний метр оціненої площі поверхні тіла (8×10^7 клітин/м²)**. Площа поверхні тіла — клінічна оцінка загального розміру тіла, обчислена з росту й ваги; це не означає, що лікарі вимірювали ділянку шкіри, мозок або пухлину. Онкологічні й педіатричні дослідження використовують її для масштабування запланованої дози між пацієнтами різного розміру: наприклад, пацієнт з оціненою площею поверхні тіла 1,2 м² мав би цільову дозу 96 мільйонів клітин на одну інфузію. Модель також назвала 80 мільйонів клітин/м² оціненою максимально переносимою дозою — найвищою дозою, яка, як очікується, залишатиметься нижче неприйняттого порога токсичності дослідження. Формулювання важливе: у фактично лікуваних пацієнтів не було досягнуто спостережуваної стелі токсичності. Це була модельна рекомендація для дослідження II фази, а не доказ широкої безпеки дози.

Більшість зафіксованих побічних явищ були легкими або помірними. Одна смертельна подія відповідала правилу дозолімітуючої токсичності

Небажане явище — будь-яка проблема зі здоров'ям, зафіксована під час дослідження; вона не обов'язково спричинена лікуванням. 1-й і 2-й ступені означають легке або помірне явище, 3-й — тяжке, 4-й — загрозливе для життя, 5-й — смерть. У ReMIND 293 із 332 зафіксованих небажаних явищ, або 88%, мали 1-й чи 2-й ступінь. Поширеними були головний біль, втома або млявість, нудота й блювання. У трьох із 33 інфузованих пацієнтів після лікування з'явилися або погіршилися явища 3-го ступеня чи вище, які вважали щонайменше можливо пов'язаними з терапією ТАА-Т. Двоє мали серйозні явища з набряком — у мозку або навколо пухлини — які могли бути пов'язані з лікуванням.

Одним із них був **P27**, пацієнт із DIPG. Через десять днів після інфузії в P27 розвинулася гідроцефалія — небезпечне накопичення рідини в мозку — разом із набряком пухлини й дихальною недостатністю. Стан не поліпшився після встановлення дренажної трубки, шунта, і збільшення стероїдної терапії для зменшення набряку. Смертельну подію класифікували як **дозолімітуючу токсичність 5-го ступеня**: за протоколом вона була достатньо серйозною, щоб зараховуватися проти подальшого підвищення дози.

Власний запис безпеки дослідження одночасно зберігає два судження про причинність: подію вважали можливо пов'язаною з терапією ТАА-Т і ймовірно пов'язаною з основним захворюванням. Візуалізація узгоджувалася з прогресуванням пухлини. Дослідження не може обрати одну причину, і стаття про нього також не повинна.

Смерть спричинила паузу в наборі. Протокол змінили, вимагаючи довшого періоду неврологічної стабільності й коротшого інтервалу між опроміненням і першою інфузією. Після цього ще п'ять пацієнтів групи А отримали лікування на тих самих або вищих запланованих дозах без іншого явища, що відповідало правилу дозолімітуючої токсичності.

Друге серйозне явище сталося в **P42**, у якого погіршувалася дифузна серединна гліома таламуса, глибокої частини мозку. Через 16 днів після інфузії магнітно-резонансна томографія (МРТ) показала набряк мозку, що супроводжувався головним болем та іншими неврологічними симптомами. Після бевацизумабу — препарату, здатного зменшувати пов'язаний із пухлиною набряк, — симптоми повернулися до попереднього рівня. Це явище не відповідало правилу дозолімітуючої токсичності.

У всіх чотирьох пацієнтів групи С виникли тимчасові цитопенії 3-го ступеня — низькі рівні клітин крові, очікувані від хіміотерапії перед інфузією; ці явища виключили із сукупного аналізу безпеки ТАА-Т. Один учасник усього дослідження ретроспективно відповідав критеріям легкого синдрому вивільнення цитокінів — системної запальної реакції, що може виникати під час активації імунних клітин.

Виважений висновок: лікування ТАА-Т загалом переносилося в цій малій когорті І фази. Необмежене слово **безпечне** стерло б малий розмір дослідження, два серйозні явища з набряком і смертельну дозозлімітуючу токсичність.

Що відбулося в різних когортах

Дві клінічні популяції потрібно тримати окремо.

У групі А, групі DIPG, медіанна виживаність без прогресування — час до погіршення пухлини або смерті пацієнта — становила **10,5 місяця від діагнозу**. Медіанна загальна виживаність — час, протягом якого пацієнти залишалися живими, — становила **13,7 місяця від діагнозу**. У десяти пацієнтів були сканування, придатні для оцінки за наперед визначеними правилами відповіді: шестеро мали стабільне захворювання, тобто ні достатнього зменшення для відповіді, ні достатнього росту для прогресування, а четверо — прогресування. **Жодне сканування не показало достатнього зменшення або зникнення, щоб досягти наперед визначеного порога об'єктивної відповіді.**

Групи В і С об'єднали кілька позастовбурових пухлин, які повернулися, не відповідали на лікування або погіршувалися, бо група С була надто малою для змістовного окремого порівняння. Тут виживання рахували від **першої інфузії**, а не від діагнозу. Медіанний час до погіршення пухлини або смерті становив **5,0 місяця**, а медіанний час життя — **12,7 місяця**, обидва від інфузії. Ці оцінки не можна прямо порівнювати з числами групи А від діагнозу.

Серед десяти пацієнтів груп В і С з вимірюваним захворюванням — щонайменше однією ділянкою пухлини, яку можна було надійно вимірювати на сканах, — п'ятеро мали стабільне захворювання й п'ятеро прогресування. Один із п'яти пацієнтів, класифікованих як стабільні, Р37, мав зменшення ураження більш ніж на 90%, але його стан погіршився до другого сканування, яке могло б це підтвердити. Часткова відповідь вимагала достатнього зменшення для перетину наперед визначеного порога й подальшого сканування для підтвердження, тому протокол не класифікував результат Р37 як часткову відповідь.

Ще п'ятеро пацієнтів мали невимірюване, але оцінюване захворювання: лікарі могли оцінити зміни на сканах, але жодна ділянка пухлини не відповідала вимогам до надійного вимірювання розміру. Їхні найкращі відповіді були: одна повна відповідь, три стабільні захворювання й одне прогресування. Повна відповідь належала Р41. За правилами сканування протоколу «повна відповідь» означала зникнення видимого нецільового захворювання; це не означало доведене вилікування. Це не було надійним відсотковим зменшенням вимірюваної цільової пухлини й не входить до підрахунку десяти пацієнтів із вимірюваним захворюванням.

Як радіологи класифікують відповідь?

До лікування радіологи визначають «цільові» ураження, які достатньо великі й чіткі для повторного вимірювання. Інше видиме захворювання можна відстежувати як «нецільове», не призначаючи йому надійної відсоткової зміни. Часткова відповідь вимагає достатнього зменшення виміряних цільових уражень і зазвичай подальшого сканування для підтвердження. Повна відповідь вимагає зникнення за відповідними критеріями. Ці назви описують зображення в певні моменти; самі собою вони не доводять вилікування й не визначають, яке лікування спричинило зміну.

Три життя, три різні історії доказів

Три довгі інтервали найлегше неправильно зрозуміти, якщо стиснути їх в одне речення. Історії лікування й межі вимірювання відрізнялися.

Three documented intervals, three different histories

Not to scale. Sequence is shown; attribution is not.

P41 | age 8 | rare astroblastoma

Before: surgery, radiation, re-irradiation, low-dose chemo

— 3 TAA-T infusions + pre-infusion chemo

— Complete response on scan ~1 year after final infusion

— >41.2 months disease-free
ONGOING at cutoff

P35 | age 14 | medulloblastoma returned 3 times

Before: tumor returned 3 times, 17 disease-directed treatments

— TAA-T infusion

— No later antitumor treatment reported

— >31.8 months disease-free
FOLLOW-UP ENDED off-study

P36 | age 14 | pediatric glioblastoma that returned

Before: repeat surgery + temozolomide

— TAA-T infusion

— After: 7 months of a CDK4/6 cell-division blocker

— >51.6 months disease-free
ONGOING at cutoff

No line here says the infused cells caused an outcome

Original diagram - The Clean Paper - CC BY 4.0

P41, P35 і P36 мали довгі задокументовані інтервали без хвороби після першої інфузії, але відрізнялися попереднім і подальшим лікуванням, вимірюваністю на початку й статусом спостереження. Часові лінії показують послідовність, а не причинність.


P41: повна відповідь зі складною вихідною оцінкою

P41 вступив у дослідження у 8 років із **рецидивною астробластою з перебудовою гена EWSR1-BEND2** — рідкісною ознакою пухлини, за якої два гени з'єдналися. Вона охоплювала третій шлуночок, один із заповнених рідиною просторів глибоко в мозку. Дитині зробили хірургічне видалення й прицільне опромінення, потім другий курс опромінення приблизно за сім місяців до ТАА-Т і низькодозову хіміотерапію, завершену приблизно за два місяці до інфузії. P41 вступив до групи С, отримав хіміотерапію для зменшення імунних клітин перед інфузією, а потім три інфузії ТАА-Т.


Після повторного перегляду сканів фахівцями вихідне захворювання класифікували як **невимірюване, але оцінюване**: достатньо видиме для оцінки, але непридатне для надійного вимірювання розміру. Приблизно через рік після останньої інфузії зникнення нецільового ураження підтримало авторську класифікацію повної відповіді на зображеннях. Вихідні дані показують інтервал без ознак хвороби понад **41,2 місяця від першої інфузії**, який тривав на дату припинення збору даних 1 січня 2026 року.

e

Pre-infusion (P41)



Post therapy year 1 (P41)



Ці постконтрастні T1-зважені МРТ-зображення показують мозок P41 до інфузії й через рік після останньої інфузії. Помаранчеві квадрати, додані авторами дослідження, позначають область, де перед інфузією було контрастне ураження, а через рік його не було; автори класифікували це як повну відповідь. Зникнення є реальним і обнадійливим спостереженням, але один випадок не показує його причину: вихідне захворювання P41 було оцінюваним, але не надійно вимірюваним, дитина отримала повторне опромінення й хіміотерапію до ТАА-Т, відповідь була відстроченою, а контрольної групи не було.

Gomez et al. / Nature Medicine CC BY-NC-ND 4.0

Це найвражаюче спостереження дослідження й водночас найкрихітша причинна

історія. Природний перебіг пухлини визначений неповністю. Кількість життєздатної пухлини на початку було важко підтвердити. Повторне опромінення й хіміотерапія передували клітинам. Відповідь була відстроченою, а контрольної групи не було.

Імунні дані не закривають цю прогалину. Дослідження використало **ELISpot** — лабораторний тест, що виявляє сигнали, які виділяють окремі Т-клітини у відповідь на вибрану мішень. Виготовлені клітини P41 дали негативний результат за початковими правилами аналізу. Позитивний результат з'явився лише за менш суворого повторного аналізу й пізніше був вилучений через підозру на хибнопозитивність; планшет був тріснутий, можливе протікання, а продукту для повторного тесту не залишилося. Дослідники також не могли відстежити введені клітини за унікальними «відбитками» Т-клітинних рецепторів — **клонотипами**. Продукту не залишилося, щоб установити, які відбитки належали інфузії, а пізніші змішані зразки імунних клітин із крові використовували лише в широкому аналізі, не для прямого зіставлення продукту з кров'ю. Тому наявні зразки не могли прямо встановити довготривале збереження або розмноження клітин з інфузійного продукту.

Що можуть показати ці імунні тести?

ELISpot запитує, чи виділяють Т-клітини сигнал, коли в лабораторії зустрічають вибрану мішень. Відстеження рецепторних відбитків запитує, чи можна пізніше знайти й виміряти в крові або тканині ті самі родини Т-клітин, що були в інфузійному продукті. Переконливий результат міг би підтримати ланцюг від розпізнавання мішені до збереження клітин, але все одно не довів би, що вони спричинили клінічну відповідь. Тут технічні проблеми й відсутність зіставлених зразків залишили незавершеним навіть цей допоміжний ланцюг.

Отже, дослідження не продемонструвало, що введені P41 клітини розпізнавали заплановані мішені, залишалися в організмі або спричинили повну відповідь.

R35: понад 31,8 місяця, потім спостереження завершилося

R35 вступив у дослідження у 14 років із медулобластомою 4-го ступеня, високозлоякісним раком мозку, уперше діагностованим у 7 років. До включення захворювання поверталася тричі, а пацієнт отримав **17 видів лікування, спрямованого проти хвороби**.

Після ТАА-Т стаття повідомляє про тривалу стабільність на сканах без додаткового протипухлинного лікування. Вихідні дані документують інтервал без ознак хвороби понад **31,8 місяця від першої інфузії**. Тоді R35 залишив дослідження. У статистиці спостереження було **цензуроване**: воно завершилося в цій точці без припущення про подальші події. Його не можна продовжувати до остаточної дати зрізу статті.

На початку захворювання не можна було надійно виміряти чи достатньо добре оцінити на сканах для класифікації відповіді. Велика історія попереднього лікування й відсутність рандомізованого порівняння не дають приписати інтервал одному

втручанню.

Р36: операція й хіміотерапія до, таргетне лікування після

Р36 вступив у дослідження у 14 років із рецидивною дитячою гліобластою після прогресування на стандартній хіміотерапії з опроміненням і експериментальному **інгібіторі PARP** — препараті, що має блокувати один зі шляхів ремонту пошкодженої ДНК пухлинними клітинами. Пухлина прогресувала приблизно за три місяці до першої інфузії; перед ТАА-Т провели повторну операцію й хіміотерапію темозоломідом.

Під час активного лікування ТАА-Т іншої спрямованої проти хвороби терапії не давали, але після останньої інфузії Р36 отримував сім місяців **інгібітор CDK4/6** — таргетний препарат, призначений для сповільнення поділу клітин. Вихідні дані документують інтервал без ознак хвороби понад **51,6 місяця від першої інфузії**, який тривав на дату зрізу.

Це найдовший із трьох інтервалів. Але він також міститься в послідовності операції, хіміотерапії, ТАА-Т і подальшого таргетного лікування. Дослідження не може розділити їхні ефекти.

Чому «після» не можна перетворювати на «через»

Ці історії важливі саме тому, що поруч із ними залишаються межі.

ReMIND не було рандомізованим, не мало одночасної контрольної групи й не було достатньо великим або розробленим для перевірки ефективності лікування. Групи В і С об'єднали різні діагнози, обсяг захворювання, попереднє лікування й очікуваний перебіг; їхнє об'єднання було описовим рішенням після перегляду даних. Група С додавала хіміотерапію, що зменшує імунні клітини, перед інфузією, а група В — ні. Деякі пацієнти отримували додаткове лікування після ТАА-Т. У тих, хто залишався без прогресування, на початку було дуже мало видимої пухлини, що саме по собі могло вплинути на результат.

ClinicalTrials.gov і стаття по-різному рахують участь. Реєстр нині подає 33 людей як включених і зосереджує головний показник безпеки на перших 42 днях. Стаття й протокол починають із 51 людини, яка дала згоду, повідомляють про 33 інфузованих і формулюють головні питання як безпеку, можливість виготовити й ввести лікування та вибір дози для подальших досліджень. Ця стаття використовує визначення публікації й протоколу, а не змішує дві системи підрахунку.

Жодне із застережень не робить три інтервали неважливими. Вони визначають, яку саме вагу можуть нести докази.

Результат є **попереднім сигналом**: підставою перевірити стратегію в дослідженні,

створеному для оцінки користі, з чіткішими біологічними вимірюваннями й групою порівняння, здатною відокремити лікування від добору, часу та іншої допомоги. Це не доказ того, що трьох дітей вилікували Т-клітини. Не доказ того, що клітини перетнули гематоенцефалічний бар'єр — захисну межу між циркулюючою кров'ю й тканиною мозку — та вбили пухлини. І не лікування, яке родини зараз можуть отримати поза дослідженням.

Що далі

Практичне питання ReMIND — чи можна виготовити й ввести лікування — потребує двох чисел. Продукт ТАА-Т у першій запланованій дозі або вище виготовили для 41 із 48 пацієнтів, у яких взяли кров, тоді як 33 із 51 пацієнта, що дали згоду, отримали щонайменше одну інфузію. Процес виготовлення також поліпшився під час дослідження. Клінічні історії виправдовують подальшу роботу, але наступне дослідження має поставити інше питання.

Дослідникам потрібно встановити, чи надійно клітини розпізнають заплановані мішені, куди вони рухаються, як довго зберігаються й чи поліпшуються результати порівняно з іншою допомогою. Для характеристики рідкісної шкоди також потрібні більші дослідження. Майбутнє випробування користі має зберегти відмінності, які ця I фаза не могла розв'язати: тип пухлини, обсяг захворювання, хіміотерапія перед інфузією, попереднє й подальше лікування.

Для родин, які стикаються з дитячими пухлинами мозку, невизначеність не те саме, що порожнеча. Три довгі інтервали заслуговують на увагу, але їх не слід перетворювати на обіцянку. Найшанобливіша версія надії — та, що чесно говорить, скільки ще невідомо.

Редакційна примітка: чого числа не можуть умістити

Природно хотіти, щоб ця історія завершилася одужанням кожної дитини. Але це не так. ReMIND проводили для захворювань, за яких родини можуть опинитися перед жахливим вибором, а лікарі мають діяти, не знаючи, чи експериментальне лікування допоможе, не матиме ефекту або завдасть шкоди.

Дослідження зафіксувало довгі інтервали без хвороби. Воно також зафіксувало тяжкі небажані явища й смерть P27. Дослідники вважали смертельну подію можливо пов'язаною з ТАА-Т і ймовірно пов'язаною з основним захворюванням; візуалізація узгоджувалася з прогресуванням. Цю невизначеність неможливо вирішити заднім числом, і її не можна перетворювати на звинувачення.

Код P27 захищає приватність дитини. Він не повинен робити дитину абстракцією. За кожним номером пацієнта стояли молода людина, родина, яка приймала рішення під тиском, і клінічна команда, відповідальна за допомогу в обставинах, де жоден варіант не давав певності. Участь не зобов'язувала нікого створити обнадійливий чи «героїчний» результат, а смерть не стає прийнятною ціною

лише тому, що майбутні дослідження можуть із неї навчитися.

Медичний прогрес створюють не лише лікування, які виліковують. Дослідження I фази може також визначити, що можна виготовити й ввести, вибрати дозу для подальших випробувань, показати, яка шкода потребує уваги, і вказати, як має змінитися протокол. Це знання не виправдовує страждання. Воно створює обов'язок чесно про нього повідомити, використати для безпечніших наступних досліджень і пам'ятати людей, які зробили його можливим.

Короткий підсумок

ReMIND було раннім дослідженням I фази Т-клітин, вирощених із крові кожного учасника й розмножених у лабораторії для реакції на три білки, які можуть бути присутні в ракових клітинах. Із 51 дитини й молодої людини з пухлинами мозку або спинного мозку високого ризику, які дали згоду, у 48 взяли кров, для 41 виготовили продукт у першій запланованій дозі або вище, а 33 отримали щонайменше одну інфузію. Більшість зафіксованих проблем зі здоров'ям були легкими або помірними, але троє інфузованих пацієнтів мали тяжкі чи гірші явища, які вважали щонайменше можливо пов'язаними; двоє мали серйозні явища набряку мозку або пухлини, можливо пов'язані з лікуванням, включно з однією смертю, що відповідала правилу дозолімітуючої токсичності. У групі агресивних пухлин стовбура мозку жодне сканування не показало достатнього зменшення або зникнення для наперед визначеного порога відповіді. У позастовбурових групах троє молодих пацієнтів мали інтервали без ознак хвороби понад 31,8, 41,2 і 51,6 місяця від першої інфузії, включно з однією повною відповіддю за критеріями сканування. Спостереження за одним пацієнтом завершилося, коли він залишив дослідження; два інші інтервали тривали на дату зрізу. Дослідження не мало контрольної групи, не було створене для встановлення користі й не може показати, що експериментальна терапія Т-клітинами спричинила ці результати.

Твереза оцінка

Що показує стаття: персоналізований продукт Т-клітин, спрямований на три пухлиноасоційовані білки, виготовили в першій запланованій дозі або вище для 41 із 48 пацієнтів, у яких взяли кров; 33 із 51 пацієнта, які дали згоду, отримали щонайменше одну інфузію. Статистична модель вибрала дозу для подальшого тестування. Дослідження задокументувало проблеми зі здоров'ям і три довгі інтервали без хвороби після інфузії.

Що перспективне, але не доведене: що експериментальні Т-клітини сприяли контролю захворювання в частини пацієнтів, особливо тих, у кого на початку було дуже мало видимої пухлини, і можуть стати клінічно корисними після контрольованого тестування.

Чого робота не показує: що лікування вилікувало трьох дітей; що воно спричинило повну відповідь або тривалі інтервали; що введені Р41 клітини доведено розпізнавали заплановані мішені або залишалися в організмі; що підхід працює за цієї агресивної пухлини стовбура мозку; або що лікування доступне чи широко безпечне.

Головні обмеження: це було раннє дослідження безпеки й дози, у якому всі знали про лікування й нікого випадково не призначали до групи порівняння; інфузію отримали 33 пацієнти з різними діагнозами; ранні ознаки користі не були головним питанням; виживання в групах рахували від різних початкових точок; група С містила лише чотирьох інфузованих пацієнтів і використовувала хіміотерапію для зменшення імунних клітин перед інфузією; частина пацієнтів отримувала інші види лікування; три виняткові випадки не починалися з ділянки пухлини, яку можна було надійно вимірювати на сканах — у Р41 залишалося видиме захворювання, за яким лікарі могли стежити, тоді як Р35 і Р36 не можна було оцінити достатньо добре для класифікації відповіді; лабораторні дані не могли прямо пов'язати введені клітини з подальшими результатами; одна смертельна подія відповідала найсуворішому правилу токсичності дослідження.

Якою має бути впевненість звичайного читача? Високою щодо вузьких висновків про виготовлення й введення лікування та зафіксовані в цій групі проблеми зі здоров'ям. Високою в тому, що три задокументовані інтервали настали після інфузії. Низькою в тому, що їх спричинила експериментальна терапія Т-клітинами, бо дослідження не було створене для відповіді на це питання.

Джерела

Gomez et al., Multi-antigen-targeting T cells in pediatric central nervous system tumors: a phase 1 trial, *Nature Medicine* 32, 2481-2493 (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41591-026-04449-9>

Author Correction, *Nature Medicine* (22 July 2026), DOI 10.1038/s41591-026-04593-2

<https://www.nature.com/articles/s41591-026-04593-2>

ClinicalTrials.gov, NCT03652545

<https://clinicaltrials.gov/study/NCT03652545>