




The CLEAN PAPER

WHAT THE PAPER SAYS · WHAT IT DOESN'T · WHY IT MATTERS

Нова родина РНК-керованих систем націлювання на ДНК — відмінна від CRISPR і поки що не інструмент редагування генів

Досліджуючи мікробні геноми, науковці виявили TIGR-Tas — раніше невідому родину РНК-керованих систем, що розрізають ДНК, використовуючи двокомпонентний гід і не потребуючи «посадкового» сайту PAM, на відміну від CRISPR. Вони показали, що один варіант можна запрограмувати для редагування людських клітин, але лише з низькою ефективністю, і простежили глибокі еволюційні зв'язки цієї родини з іншими РНК-керованими машинами. Це справжнє розширення наших знань про РНК-керовану біологію й можлива нова відправна точка для майбутніх інструментів — фундаментальне відкриття та proof of concept, а не зрілий редактор генів чи терапія.


Written by Lucio Vaglio · Cross-checked by Laura Nesso · Edited by Michele Renda · Figures by Laura Nesso and Nova Vela · AI-assisted, human-reviewed

Paper: *TIGR-Tas: A Family of Modular RNA-Guided DNA-Targeting Systems in Prokaryotes and Their Viruses*, Guilhem Faure, Makoto Saito, Max E. Wilkinson et al.; Feng Zhang (corresponding author), Science 388, 6746, eadv9789 (2025) · DOI: 10.1126/science.adv9789

Нова гілка на дереві машин, керованих РНК

Час від часу виходить біологічна стаття, якій приписують заголовок, якого вона ніколи не просила. Цього разу це було «новий CRISPR». Робота, що стоїть за цим заголовком, цікавіша — і, як зазвичай, скромніша.

Почнімо з того, чим CRISPR став відомим: *системи, керованої РНК*. Її хитрість у тому, що білок не мусить бути жорстко «запрограмований» на розпізнавання однієї мішені. Натомість він несе короткий фрагмент РНК — гід — і прямує туди, де послідовність цього гіда збігається з мішенню. Змініть гід — зміниться й мішень. Саме ця програмованість і перетворила CRISPR на інструмент. Але CRISPR — не єдина в природі система, керована РНК, і ця робота ставить терпляче запитання: скільки *інших* типів таких систем існує і чого вони можуть нас навчити?



TIGR-Tas використовує гід із двома спейсерами, щоб зчитувати протилежні ланцюги ДНК. Це нова архітектура, а не готовий редактор генів.

Original diagram — The Clean Paper CC BY 4.0

Щоб їх шукати, автори не намагалися знаходити схожі генні послідовності — за еволюційний час вони змінюються надто сильно, щоб за ними можна було впевнено впізнати далеких родичів. Вони шукали *форми*. Взявши за відправну точку частину білка Cas9 системи CRISPR, яка утримує гідову РНК, дослідники прочесали бази даних передбачених білкових структур у пошуках чогось побудованого подібним чином. Цей слід — через бактеріальний «стрибаючий ген» і механізм, яким звичайні клітини хімічно модифікують власну РНК, — привів до справді нового об'єкта.

Що зробили автори

Структурний пошук виявив раніше нерозпізнану родину білків, закодованих переважно в бактеріофагах (вірусах, що інфікують бактерії), у вірусах архей та в крихітних паразитичних бактеріях. Поряд із кожним таким геном лежить характерна ділянка ДНК: довгий повторюваний масив, який автори назвали **масивом TIGR** (Tandem Interspaced Guide RNA). Самі білки вони назвали **Tas** (TIGR-associated). Деякі білки Tas — лише «затискач» для РНК; до інших приєднаний інструмент для розрізання ДНК — один із двох типів молекулярних ножиць, RuvC або HNH.

Знайшовши цю родину в базах даних, дослідники перенесли її до лабораторії: експресували системи в *E. coli* і секвенували утворені ними малі РНК, з'ясували правила, за якими ці РНК знаходять мішені у ДНК, перевірили, чи справді варіанти з нуклеазами ріжуть ДНК, спробували запрограмувати один із них для редагування людських клітин, а наприкінці заморозили працюючий комплекс і визначили його структуру з майже атомною роздільною здатністю.

Що вони виявили

Гід складається з двох частин. Масив TIGR обробляється до коротких РНК приблизно з 36 нуклеотидів, кожна з яких містить два окремі сегменти наведення. Один сегмент зчитує один ланцюг цільової ДНК, другий — протилежний. Разом вони фіксують комплекс на потрібній ділянці. Це справжня механістична відмінність від CRISPR, де гід відповідає одному ланцюгу одним безперервним відрізком.

І йому не потрібен «посадковий майданчик». Багато нуклеаз CRISPR можуть різати лише поруч із коротким специфічним мотивом ДНК («РАМ»), розташованим біля мішені, — це обмежує місця, на які їх можна націлити. Для систем TIGR такої вимоги не виявили: вони поклалися лише на саму послідовність мішені. Систему, якій не потрібен РАМ, у принципі можна націлювати на більше ділянок.

Варіанти з нуклеазами ріжуть — і роблять це точно. Спрямовані малою РНК, білки Tas із доменами RuvC або HNH створювали чисті, послідовність-специфічні розриви ДНК — і нічого не робили без гіда.

Один варіант вдалося запрограмувати для редагування людських клітин — ледве. Коли білок Tas перенесли в людські клітини в культурі й націлили на шість різних генів, він справді вніс зміни, підтвердивши, що систему можна програмувати й у наших клітинах. Але ефективність була низькою: у найкращому разі редагувалися кілька відсотків клітин. Для порівняння, сучасні оптимізовані інструменти CRISPR зазвичай редагують велику частку клітин, у які їх вводять. Це доказ того, що система може працювати, а не інструмент, який працює добре.

Структура пояснила механізм — і натякнула на походження. Візуалізований

комплекс складається з дзеркально-симетричної пари білків, що охоплюють гідову РНК у формі вісімки, тоді як цільова ДНК проходить крізь комплекс із різким вигином. Вражає те, що ця архітектура дуже нагадує механізм у клітинах споріднених із нами організмів — box C/D **snoRNP**, який спрямовує хімічні модифікації РНК, а не розрізає ДНК.

Її природна робота незрозуміла. Коли автори експресували одну з систем у *E. coli*, вона *не* захищала клітини від чужих вірусів або плазмід — тобто не виконувала звичайної роботи CRISPR. Натомість упродовж багатьох поколінь вона поступово витісняла плазмиду, на яку була націлена. Це натякає, що її справжня роль може бути пов'язана з повільною конкуренцією між мобільними елементами ДНК, а не з першою лінією імунного захисту. Але це був штучний експеримент у запозиченому клітинному контексті, тож чесна відповідь така: поки що ніхто не знає, що ці системи роблять у природі.

Що це, ймовірно, означає

Дві речі — з різним рівнем упевненості.

Перша, надійна: відомий світ систем, керованих РНК, більший і різноманітніший за CRISPR та його нещодавно знайдених родичів. TIGR-Tas — справді окрема гілка зі своїм двокомпонентним, незалежним від РАР способом розпізнавання ДНК. Це реальне доповнення до карти.

Друга, глибша й більш спекулятивна: оскільки механізм TIGR побудований подібно до snoRNP, що модифікує РНК у клітинах на кшталт наших, і подібно до відомого «стрибаючого гена», він може позначати еволюційний зв'язок між системами, керованими РНК і спрямованими на *модифікацію РНК*, та системами, керованими РНК і спрямованими на *ДНК* — можливо, це відсутня ланка в історії появи програмованих РНК-гідів у різних формах життя.

Чого це *не* доводить

- Це **не готовий інструмент для редагування генів**. Редагування людських клітин продемонстрували, але воно було слабким — у найкращому разі кілька відсотків. Це доказ програмованості, а не зрілий редактор, і до клінічного застосування дуже далеко.
- Це **не «CRISPR 2.0»**. Якщо оцінювати їх як інструменти сьогодні, CRISPR-Cas9 редагує незрівнянно ефективніше. TIGR-Tas — нова *архітектура* на стадії proof of concept, а не поліпшена версія готового продукту.
- Її **біологічна роль невідома**. В одному тесті цієї ідеї система не поводитися як противірусний імунний механізм; твердження про «нову бактеріальну імунну

систему» не підтверджене.

- Багато деталей **базового механізму залишаються відкритими** — зокрема, як гідова РНК обрізається до остаточної довжини і на що ці системи насправді націлюються в природі (більшість із них походить із мікробів, які ми майже не вміємо культивувати).
- Тут **немає нічого терапевтичного**. Це відкриття й характеристика систем у мікробах та клітинній культурі — без хвороби, лікування чи пацієнтів.

Наскільки сильні докази?

Саме відкриття стоїть на міцному фундаменті й досліджене незвично різнобічно: воно спирається на масштабний структурний пошук, лабораторне підтвердження того, як утворюється РНК і як вона знаходить та розрізає ДНК, структуру активного комплексу з майже атомною роздільною здатністю, а також тест у людських клітинах. Твердження «це нова, окрема родина систем, керованих РНК і спрямованих на ДНК» підтримується одразу кількома незалежними лініями доказів.

Раннім залишається все, що стосується корисності: редагування працює, але ледве, і вся оптимізація, яка перетворила CRISPR із біологічної дивини на інструмент, для TIGR ще попереду. А *висновковою* є решта історії: природна роль — обґрунтоване припущення з одного штучного експерименту, а еволюційний зв'язок, хоч і елегантний, — аргумент зі спільної структури, а не встановлена історія. Стаття ретельно розрізняє ці рівні впевненості.

Чому це важливо

Кілька попередніх розширень каталогу систем, керованих РНК, зрештою дали практичні плоди. Системи, що лежать в основі сучасних інструментів — Cas9, Cas12, Cas13, а нещодавно також менші білки IscB/OMEGA та еукаріотичні Fanzor, — спочатку були просто щойно описаною біологією. Жодна з них не з'явилася як готовий інструмент. Система з двокомпонентним гідом і без вимоги РАР — справді інша стартова точка, а можливість націлюватися без РАР — саме той тип гнучкості, який цінують розробники молекулярних інструментів.

Але тихіший результат може виявитися важливішим за перспективу нового інструмента. Пов'язуючи систему, що розрізає ДНК, із snoRNP-механізмом редагування РНК та зі «стрибаючим геном», робота окреслює можливу нитку, яка з'єднує дуже різні РНК-керовані системи на дереві життя. Такі знахідки перебудовують уявлення цілої галузі про походження її інструментів — і в довгій перспективі це цінніше за ще один гучний заголовок про молекулярні ножиці.

Короткий підсумок

Шукаючи не схожі послідовності, а *форми* білків, дослідники відкрили TIGR-Tas — раніше невідому родину систем, керованих РНК і спрямованих на ДНК, що трапляється переважно у вірусах бактерій та паразитичних бактеріях. Її гідова РНК незвична: приблизно 36 нуклеотидів із двома окремими сегментами наведення, які зчитують протилежні ланцюги ДНК; на відміну від CRISPR, їй не потрібен сусідній мотив «РАМ». Представники з нуклеазами точно розрізають ДНК, один із них вдалося запрограмувати для редагування людських клітин (хоча з ефективністю лише кілька відсотків), а структура з майже атомною роздільною здатністю показала комплекс, побудований подібно до snoRNP-механізму, який редагує РНК у наших клітинах, — це натякає на глибокий еволюційний зв'язок між РНК-керованими системами модифікації РНК і системами націлювання на ДНК. Це справжнє розширення відомої біології РНК-керованих систем і можливе нове шасі для майбутніх інструментів — фундаментальне відкриття та proof of concept, **не** зрілий редактор генів, не «CRISPR 2.0» і не терапія. Його природна роль у дикій природі залишається невідомою.

Твереза оцінка

Що показує стаття: Нову, окрему родину РНК-керованих систем націлювання на ДНК (TIGR-Tas) у прокаріотів та їхніх вірусів, знайдену за допомогою структурного пошуку; двосегментну гідову РНК без вимоги РАМ (~36 нт), яка послідовно націлюється на обидва ланцюги ДНК; точне РНК-кероване розщеплення ДНК представниками з нуклеазами; програмоване редагування людських клітин із низькою ефективністю (до кількох відсотків); кріо-ЕМ структуру з майже атомною роздільною здатністю; а також структурні та еволюційні зв'язки з box C/D snoRNP і транспозонами IS110.

Що правдоподібно, але не доведене: Природна біологічна роль цих систем (один штучний експеримент натякає на неімунну роль у конкуренції мобільних елементів); запропонований еволюційний міст між РНК-керованими системами модифікації РНК та націлювання на ДНК (аргумент зі структури).

Чого робота не показує: Зрілого або високоефективного інструмента редагування генів; переваги над CRISPR як інструментом; підтвердженої природної функції; механізму дозрівання гідової РНК; будь-якого терапевтичного застосування.

Основні обмеження: Ефективність редагування людських клітин низька (лише proof of concept); більшість систем походить із важкодоступних для дослідження метагеномів, тому їхні природні мішені переважно невідомі; твердження про біологічну роль та еволюційне походження мають висновковий характер; характеристику проведено в мікробах і клітинній культурі, а не в контексті будь-якого захворювання.

Скільки довіри варто мати звичайному читачеві? Високу щодо того, що це справді нова, окрема родина РНК-керованих систем націлювання на ДНК із новим двокомпонентним,

незалежним від РАР механізмом, і що структурні та еволюційні спостереження реальні. Так само високу щодо того, що це **не** готовий інструмент редагування генів, не «CRISPR 2.0» і не терапія. Низьку — щодо її природної ролі та того, наскільки далеко вона зайде як інструмент. Найдоречніша позиція: щирий інтерес до нової біології й можливої відсутньої еволюційної ланки — і терпіння щодо застосувань, які лише починаються.

Джерела

Science 388, eadv9789 (2025)

<https://doi.org/10.1126/science.adv9789>

PubMed Central (PMC12045711)

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC12045711/>